
Bollettino N°26
del 27 Ottobre 2026


MARE *IN* - FORMA

Struttura Oceanografica Daphne



Distribuzione delle stazioni costiere (0.5 km) divise per subarea.

VARIABILI	MEDIE ZONA A	Val. an.	MEDIE ZONA B	Val. an.	MEDIE ZONA C	Val an.
Temperatura °C	18.54		18.26			
Salinità psu	33.58		34.80			
O. D. super. mg/l	9.26		11.80			
O. D. fondo mg/l	5.35		8.44			
pH	8.23		8.32			
Trasparenza m	2.30		2.38			
Clorofilla a µg/l	4.62		9.80			



OSSERVAZIONI

I monitoraggi a bordo della M/n Daphne II si sono svolti nella sola giornata di martedì 27, interessando la fascia marina compresa tra 500 metri e 10 chilometri dalla costa, nel tratto tra Lido di Volano e Zadina.
Lungo la costa si registrano valori di salinità medio-alti, a conferma di un apporto ridotto di acque dolci sia dai bacini costieri sia dal Po.
Le concentrazioni di clorofilla "a" risultano generalmente basse, a eccezione di un'area circoscritta caratterizzata da una fioritura della microalga *Chattonella* sp. (Raphidophyceae). Il fenomeno ha determinato una marcata colorazione verdastra delle acque e un aumento della torbidità lungo l'intera colonna d'acqua.
I livelli di ossigeno disciolto permangono su valori ottimali, sia in superficie sia a livello del fondale, in costa e al largo.
In linea con il calo termico atmosferico, le temperature superficiali del mare mostrano una tendenza alla diminuzione, attestandosi lungo la costa intorno ai 18,5 °C.

NOTE:

OSSIGENO DISC.NELLE ACQUE DI FONDO
- da 0 - 1.0 mg/l Situazione tendente all'anossia
- da 1.0 - 3.0 mg/l Ipossia
- > 3.0 mg/l Condizione normale

CLOROFILLA "a" (indice di biomassa algale)
- > 10 ug/l Ambiente eutrofizzato