



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

SEZIONE DI PARMA · CORSO PRINCIPALE DEL PO E BACINI DEL VERSANTE APPENNINICO A VALLE DEL TANARO
DIRETTORE DELLA SEZIONE: ING. RENZO VEZZANI

ANNALI IDROLOGICI

ANNO 1929

PARTI II. · ELABORAZIONI E STUDI

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 · ANNO IX.

INDICE

Prefazione			
A) Termometria			
Segni convenzionali ed abbreviazioni. Contenuto delle tabelle.			pag. 81
TABELLA			
I. - Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	1		
II. - Valori medi, valori estremi, escursioni e frequenze della temperatura	3		
III. - Valori massimi, minimi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche	6		
B) Pluviometria			
Segni convenzionali e abbreviazioni. Contenuto delle tabelle.	8		
TABELLA			
I. - Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche	17		
II. - Totali mensili ed annui delle precipitazioni e dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media	19		
III. - Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.	25		
IV. - Durate delle precipitazioni mensili ed annue registrate ai pluviografi	38		
V. - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi	43		
VI. - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi rilevate in alcune stazioni tipiche	45		
VII. - Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa	46		
VIII. - Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche	50		
IX. - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata	52		
X. - Manto nevoso. Altezze giornaliere in centimetri	57		
XI. - Afflussi meteorici annui	61		
C) Idrometria			
Segni convenzionali e abbreviazioni. Contenuto delle tabelle.	75		
TABELLA			
I. - Stazioni di osservazione nel bacino del Po per l'anno 1929	79		
II. - Riassunto delle caratteristiche idrologiche del Po per l'anno 1929			
Precipitazioni			153
Piene e magre notevoli			154
Acque freatiche			155
			155
			160
D) Freatimetria			
Segni convenzionali e abbreviazioni. Contenuto delle tabelle.			
TABELLA			
I. - Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche.	93		
II. - Medie, massime e minime mensili, stagionali ed annue, escursioni mensili, stagionali ed annue delle profondità rilevate nei pozzi freatimetrici.	94		
E) Bilanci idrologici			
TABELLA			
I. - Terminologia	103		
II. - Trebbia a S. Salvatore	105		
III. - Taro a S. Quirico	109		
IV. - Parma a Baganzola	113		
V. - Enza a Lentigione	117		
VI. - Secchia a Ponte Bacchello	121		
VII. - Panaro a Bomporto	123		
VIII. - Po a Moncalieri	129		
IX. - Piacenza	133		
X. - Casalmaggiore	137		
XI. - Roncole Verdi	141		
XII. - Revere	145		
XIII. - Pontelagoscuro	149		
F) Caratteristiche generali e particolarità idrologiche per l'anno 1929			
TABELLA			
I. - Stazioni di osservazione nel bacino del Po per l'anno 1929			153
II. - Riassunto delle caratteristiche idrologiche del Po per l'anno 1929			154
Precipitazioni			155
Piene e magre notevoli			155
Acque freatiche			160

PREFAZIONE

Il presente volume degli Annali idrologici, Parte II^a, per l'anno 1929 comprende gli elementi e studi relativi all'intero corso principale del Po e quelli relativi agli affluenti del versante appenninico a valle del Tanaro - Bormida. Altri due volumi, elaborati, sotto la direzione di questo Ufficio, singolarmente dalle due Sezioni distaccate di Milano e di Torino, si occupano rispettivamente degli affluenti del versante alpino a sinistra della Sesia (Lombardia) e di quelli del versante alpino ed appenninico a monte della Scrivia (Piemonte).

Nel presente volume non si trovano innovazioni rispetto a quello dell'anno precedente poichè già in quello si era ottenuta la massima omogeneità con le analoghe pubblicazioni delle Sezioni Autonome idrografiche e la massima rispondenza alle disposizioni del Servizio Centrale.

Si sono tuttavia meglio curati alcuni particolari che dovrebbero rendere più utile ed agevole l'uso dei dati in esso volume contenuti; tra altro, si è fatto in modo che tutti i valori normali a cui si fa riferimento nei bilanci idrologici risultassero riferiti ad uno stesso periodo di tempo in modo che riesca omogeneo il raffronto di compor-

tamento fra i vari corsi d'acqua e fra le varie sezioni di uno stesso fiume.

Nel capitolo finale si sono date le caratteristiche principali dell'annata riferite in generale a tutto il bacino del Po e con maggiori particolari alla regione di cui si occupa il presente volume. L'anno 1929 fu scarso di precipitazioni e dal lato idrologico non presentò fenomeni di particolare rilievo, all'infuori della formazione dei ghiacci nel fiume Po avvenuta nel gennaio - febbraio e che aveva precedenti storici assai remoti. Di questa si è fatto cenno nel capitolo finale con riferimento a quanto in argomento è già stato pubblicato negli « Annali dei Lavori Pubblici - 1929 - Fasc. 9 » dal Sig. Ispettore Superiore per il Circolo del Po.

Parma, agosto 1931. IX.

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE DELL'UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
MARCO VISENTINI.

SEGNi CONVENZIONALI E ABBREVIAZIONI

Termometria a massima e minima	.	.	.	.	.	.	Tm
Termografo	.	.	.	.	.	.	Tr
R. Ufficio Idrografico del Po	.	.	.	.	.	.	R. U. I. Po
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica	.	.	.	.	.	.	U. C. M.
Dato incerto	.	.	.	.	.	.	?
Dato mancante	.	.	.	.	.	.	»
Dato interpolato	.	.	.	.	.	.	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tab. I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, e delle quali, negli « Annali idrologici » P. I^a, sono state pubblicate le osservazioni giornaliere.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna sono indicati: l'altitudine, il tipo dell'apparecchio, l'anno di istituzione, l'ente da cui esso dipende e che provvede al suo funzionamento; il cognome è il nome dell'osservatore.

Tab. II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. Sono stampati in **grassetto** i valori massimi della temperatura, ed in *corsivo* i minimi.

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, e il giorno nel quale esse sono state osservate:

c) i seguenti valori dell'escursione: massima diurna per ogni mese (ossia: massima differenza verificata nel mese, fra le temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno); massima per ogni mese (differenza tra le temperature estreme del mese); massima dell'anno;

d) le frequenze delle temperature giornaliere: dividendo il campo di escursione della temperatura diurna in sei intervalli, e indicando per i singoli mesi e per l'anno, i numeri dei giorni nei quali la temperatura fu compresa in ognuno dei detti intervalli.

Tab. III. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte come caratteristiche per i singoli bacini idrografici i valori estremi e medi della temperatura nei vari mesi.

Tutte le temperature riportate negli « Annali Idrologici » sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendo effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

Tab. I. **Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche.**

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	Quota sul mare	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Scivia	Torriglia	764	1913	R. U. I. Po	Carraro Eugenio	Ceno (Sinistra di Taro)	Casalporino	916	1923	R. U. I. Po	Ferretti D. Filippo
	Novi Plemonte	200	1879	U. C. M.	Daglio Maria		Tizzano	795	1914	id.	Pavarani D. Eufemio
	Tortona	120	1889	id.	Leidi Prof. D. Camillo		Moragnano	750	1923	id.	Bucci D. Lino
Staffora	Voghera	93	1914	U. C. M.	Senola Agraria	Parma	Bosco di Corniglio	742	1921	id.	Ghirardini Quinto
	Montaldo Pavese	466	1917	R. U. I. Po	Bottazzi D. Pietro		Petrignacola	630	1927	id.	Mazzini Giacomo
Scurovasso	S. Salvatore	343	1921	id.	Farina Luigi	Baganzola	S. Michelino del Gatti	240	1929	id.	Del Sante D. Eugenio
	Ponte Barberino	242	1921	id.	Mozzi Giovanni		Parma	52	1821	R. Università	Personale addetto
Trebbia	S. Lazzaro Alberoni	50	1872	U. C. M.	Collegio Alberoni	Baganzola	Baganzola	40	1921	R. U. I. Po	Cugini Desiderio
	Montebruno	657	1923	R. U. I. Po	Daglio D. Paolo		Cassio	813	1923	id.	Cavazzini D. Giovanni
Nure e Chiavenna	Rovigno	660	1923	id.	Campomenosi D. Franc.	Enza	Succiso	911	1917	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Macchi Venezia
	Fontanigorda	820	1913	id.	Ferretti Giovanni		Ramisetto	850	1914	R. U. I. Po	Canedoli Giuseppe
Nure	Pelli	910	1927	id.	Lambrini D. Angelo	Enza	Storlo	845	1917	id.	Zampolini Fiorina
	Bobbio	270	1913	id.	Boveri Clementina		Leguligno	645	1925	id.	Blizzari D. Giuseppe
Chiavenna	Grondone	1051	1923	id.	Bocciarelli D. Domenico	Cedra	Vedriano	590	1913	U. C. M.	Canedoli D. Domenico
	Gambaro	850	1928	id.	Rolleri D. Giuseppe		Ranzano	540	1919	R. U. I. Po	Spinabelli D. Lodovico
Arda	Castellana	434	1914	id.	Gherardi D. Alberto	Cedra	Neviano Arduini	422	1919	id.	Infanti D. Icilio
	Florenzuola	82	1917	id.	Graziano Luigi		Cazzola	296	1913	id.	Barilla D. Rodolfo
Taro	Berceto	800	1913	id.	Rossi D. Giov. Battista	Cedra	Marano	112	1923	id.	Bertacchini Pietro
Taro	Selva del Bocchetto	539	1923	id.	Ablondi D. Francesco		Selvanizza	600	1928	id.	Bogliani Tommaso
Taro	Borgo Val di Taro	411	1913	id.	Foschini Natale	Crostolo	Canossa	530	1913	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Tondelli D. Felice
	Neviano Rossi	401	1923	id.	Cavalli D. Alessandro		Casina	500	1917	R. U. I. Po	Campani Giacomo
Taro	Salsomaggiore	160	1913	id.	Popoli Giuseppe	Crostolo	Roncolo	275	1927	id.	Ferrari D. Adelmo
	S. Quirico di Tre Casali	35	1921	id.	Grassi Maria		Boschi di Vezzano	200	1921	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Valdesalici Luigi
							Reggio Emilia	60	1913	U. C. M.	Zanelli Ing. Dezio

(Segue) Tab. I. — Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche.

BACINI	STAZIONI	doll' apparecchio Tipo	Quota sul mare	Anno inizio osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	doll' apparecchio Tipo	Quota sul mare	Anno inizio osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Secchia	Vallico Cerreto . . .	Tm	1200	1910	Comis. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Artori Tito	Rossenna (Destra di Secchia)	Pavullo	Tm	682	1882	U. C. M.	Caselgrandi Rag. Carlo
	Sparavalle	Tm	970	1909	id.	Vanicelli Vittorio		Marola	Tm	717	1878	id.	Macchioni D. Francesco
	Bismantova	Tm	830	1910	id.	Dalla Porta Francesco	Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Viano	Tm	272	1922	Comis. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Simonazzi D. Aldo
	Sologno	Tm	805	1923	id.	Pasquini D. Leopoldo		Ca' de' Caroli	Tm	168	1920	id.	Ferrari Angelo
	Valestra	Tm	800	1914	R. U. I. Po	Bertolini D. Giuseppe	Bonifica destra Parmigiana-Moglia (Sinistra di Secchia)	Correggio	Tm	48	1920	U. C. M.	Meulli Dott. Giorgio
	Collagna	Tm	800	1909	Comis. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Lenzini Domenico							
	Carpinetti	Tm	780	1923	id.	Bonini D. Giuseppe							
	Castelnuovomonti . .	Tm	730	1909	id.	Ruffini Giovanni							
	Baiso	Tm	542	1910	id.	Bagnoli D. Contardo	Panaro Scoltenna	Sestola	Tm	1086	1871	id.	Burchi Oreste
	Salcava	Tm	530	1910	id.	Lauretti Narciso		Pievepelago	Tm	761	1922	id.	Ferrari Maddalena
Ozola (Destra di Secchia)	Levizzano	Tm	189	1922	id.	Rocchi Carlo	Panaro	Montombraro	Tm	729	1910	id.	Boselli D. Giuseppe
	Ponte Bacchello . . .	Tm	25	1923	R. U. I. Po	Previdi Guido		Gulglia	Tm	483	1891	id.	Ceretti Costantino
	Concordia	Tm	20	1923	id.	Baraldi Antonio		Vignola	Tm	125	1925	R. U. I. Po	Leonelli Paolo
	Ospedaletto	Tm	1100	1920	Comis. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Bertagni Pietro		Spilamberto	Tm	70	1900	id.	Muratori Leopoldo
	Ligonchio	Tm	928	1921	id.	Bigoi Silvio		Modena	Tm	35	1881	U. C. M.	Bonacini Prof. Carlo
	Presà d'Ozola	Tm	920	1925	id.	Soc. Idroelettrica Ozola		Bomporto	Tm	25	1923	R. U. I. Po	Pignatari Noè
	Piolo	Tm	773	1911	id.	Ganassini D. Silvestro		Nonantola	Tm	24	1913	U. C. M.	Alessandrini Cesarina
	Cinqueterri	Tm	697	1920	id.	Soc. Idroelettrica Ozola		Navicello	Tm	21	1923	R. U. I. Po	Pederzoli Umberto
								Camposanto	Tm	20	1923	id.	Tommasini Giuseppe
								S. Felice	Tm	19	1910	U. C. M.	Bergamini Barberina
Secchiello (Destra di Secchia)	Castione d'Asta . . .	Tm	920	1921	id.	Sillari Michele	Po	Cavour	Tm	360	1913	U. C. M.	Magnano Rosalia
	Quara	Tm	720	1921	id.	Bonicelli Marino		Moncalleri	Tm	241	1866	id.	Boddaert D. Domenico
	Razzolo	Tm	610	1910	id.	Azzolini Clemente		Torino	Tm	238	1866	R. Università	Bo Augusto
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Piandelagotti	Tm	1209	1910	R. U. I. Po	Lunardi D. Adolfo		Chivasso	Tm	183	1912	U. C. M.	Marchese Giovanni
	Civago	Tm	1024	1921	Comis. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Musiari D. Gerardo		Casal Monferrato . .	Tm	113	1913	R. U. I. Po	Robione Prof. D. Cesare
	Ceredolo	Tm	300	1910	id.	Lanzotti Ernesto		Valenza	Tm	85	1924	id.	Giuliano Serafino

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche.*

BACINI	STAZIONI	dell'apparecchio	Quota sul mare	Anno inizio osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	dell'apparecchio	Quota sul mare	Anno inizio osser- vazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Po	Pieve del Cairo	Tm	79	1894	U. C. M.	Dott. D. G. Avanza	Fiumi Racino Destra di Po	Quistello	Tm	17	1910	U. C. M.	Ruberti Cav. Amedeo
	Pavia	Tm	77	1812	id.	Gamba Prof. Pericle		Sermide	Tm	12	1897	id.	Belfanti Luciano
	Codogno	Tm	58	1887	id.	Toja Biagio		Pontelagoscuro	Tm	10	1923	R. U. I. Po	Zucchelli Massimiliano
	Casalmaggiore	Tm	25	1907	R. U. I. Po	Bianchi Ercole		S. Martino in Spino	Tm	10	1911	U. C. M.	Baraldi Paolo
	Viadana	Tm	25	1884	U. C. M.	Gradella Giovanni		Ferrara	Tm	4	1884	id.	Direttore Osser. Met.
	Gazzuolo	Tm	20	1913	id.	Bernini Prof. Ottorino		Ficarolo	Tm	10	1884	id.	Monesi Giuseppe
	Suzzara	Tm	20	1910	id.	Villani Dino							
							Sinistra di Po						

Valori medi, valori estremi, escursioni e frequenze della temperatura.

Tab. II.

MESE	ALESSANDRIA (m. 95 s/m)										NOVI PIEMONTE (m. 200 s/m)										
	MEDIA DELLE TEMPERATURE					TEMPERATURE ESTREME					ESCURSIONE					NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	max.		minima		diurna	max.	giorno	minima	giorno	max.	diurna	max.	media	max. nel mese	max. nel mese	max.	min.	da 10 a 19	da 20 a 29	da 30 a 31	da 32 a 31
	max.	minima	max.	minima	diurna	max.	giorno	minima	giorno	max.	diurna	max.	media	max. nel mese	max. nel mese	max.	min.	da 10 a 19	da 20 a 29	da 30 a 31	da 32 a 31
Gennaio	0.2	-6.0	-2.7	-10.3	10.2	4.0	5	-10.3	18	10.2	6.2	14.3	6.2	14.3	14.3	24	7	—	—	—	—
Febbraio	0.6	-6.9	-3.4	-16.7	12.0	6.0	27	-16.7	15	12.0	7.5	22.7	7.5	22.7	22.7	21	5	—	—	—	—
Marzo	13.4	1.7	7.2	-4.1	21.0	22.8	31	-4.1	4	21.0	11.7	26.9	9.3	22.6	22.6	1	22	8	—	—	—
Aprile	15.8	6.5	10.7	1.0	18.5	21.6	1	1.0	7	18.5	10.3	22.1	10.3	22.1	22.1	10	20	—	—	—	—
Maggio	22.8	12.5	17.5	7.2	14.0	29.3	30	7.2	3	14.0	13.8	20.1	13.8	20.1	20.1	—	—	—	—	—	—
Giugno	27.9	14.1	22.5	11.0	14.5	31.1	18	11.0	27	14.5	11.3	21.6	11.3	21.6	21.6	—	—	—	—	—	—
Luglio	30.9	19.6	24.7	14.1	13.6	35.7	24	14.1	9	13.6	9.7	16.5	9.7	16.5	16.5	—	—	—	—	—	—
Agosto	28.0	18.3	22.6	13.9	13.1	30.4	8	13.9	20	13.1	10.3	24.4	10.3	24.4	24.4	—	—	—	—	—	—
Settembre	25.7	15.4	20.3	7.8	14.1	32.2	7	7.8	27	14.1	7.3	20.8	7.3	20.8	20.8	—	—	—	—	—	—
Ottobre	16.5	9.2	12.5	3.0	10.6	23.8	3	3.0	31	10.6	5.8	15.1	5.8	15.1	15.1	—	—	—	—	—	—
Novembre	10.3	5.0	7.4	-0.9	12.7	14.2	1	-0.9	17	12.7	5.7	19.3	5.7	19.3	19.3	—	—	—	—	—	—
Dicembre	6.4	0.7	3.3	-6.0	13.3	13.3	16	-6.0	24	13.3	5.7	19.3	5.7	19.3	19.3	—	—	—	—	—	—
Valori annui	16.5	7.5	8.1	-16.7	21.0	35.7	24 VIII	-16.7	15 II	21.0	9.0	52.4	9.0	52.4	52.4	2	52	100	103	108	—
PARMA (m. 52 s/m)																					
Gennaio	0.2	-4.4	-2.6	-11.6	19	4.2	19	-11.6	11	19	4.2	19	4.2	19	19	23	8	—	—	—	—
Febbraio	-0.6	-7.7	-5.9	-14.9	27	6.2	27	-14.9	16	27	6.2	27	6.2	27	27	4	4	—	—	—	—
Marzo	13.2	3.4	6.1	-5.2	31	23.2	31	-5.2	3	31	23.2	31	23.2	31	31	4	23	4	—	—	—
Aprile	15.8	6.8	8.5	-2.0	1	22.8	1	-2.0	7	1	22.8	1	22.8	1	22.8	—	—	—	—	—	—
Maggio	23.5	13.6	15.4	8.2	30	30.4	30	8.2	4	30	30.4	30	30.4	30	30	—	—	—	—	—	—
Giugno	28.3	18.4	20.2	12.6	10	32.2	10	12.6	27	10	32.2	10	32.2	10	32.2	—	—	—	—	—	—
Luglio	31.1	19.9	25.6	14.0	23	36.5	23	14.0	9	23	36.5	23	36.5	23	36.5	—	—	—	—	—	—
Agosto	29.0	18.9	24.2	15.2	17	34.2	17	15.2	22	17	34.2	17	34.2	17	34.2	—	—	—	—	—	—
Settembre	26.6	17.1	21.7	9.8	7	33.6	7	9.8	25	7	33.6	7	33.6	7	33.6	—	—	—	—	—	—
Ottobre	18.0	10.7	14.5	4.8	4	25.2	4	4.8	29	4	25.2	4	25.2	4	25.2	—	—	—	—	—	—
Novembre	10.1	6.6	8.0	2.0	11	13.0	11	2.0	16	11	13.0	11	13.0	11	13.0	—	—	—	—	—	—
Dicembre	7.0	2.4	4.3	-4.0	13	14.2	13	-4.0	25	13	14.2	13	14.2	13	14.2	—	—	—	—	—	—
Valori annui	16.8	8.8	11.7	-14.9	23 VIII	36.5	23 VIII	-14.9	16 II	23 VIII	36.5	23 VIII	36.5	23 VIII	36.5	4	49	112	103	96	1

(Segue) Tab. II. — Valori medi, valori estremi, escursioni e frequenze della temperatura.

MESE	MEDIA DELLE TEMPERATURE			TEMPERATURE ESTREME			ESCURSIONE		NUMERO DEI GIORNI CON TEMPERATURA DIURNA					
	max.	minima	diurna	max.	minima	giorno	diurna	max. media	max.	min.	giorno	max.	min.	giorno
CORREGGIO (m. 48 s/m)														
Gennaio	-0.1	-5.1	-3.1	4.0	-11.7	30	13.5	5.0	15.7	—	23	8	—	—
Febbraio	-0.5	-9.9	-5.5	4.8	-22.0	16	17.0	9.4	20.8	5	20	3	—	—
Marzo	12.2	0.9	5.4	20.5	-8.0	4	15.2	11.3	28.5	—	5	24	2	—
Aprile	16.6	5.1	9.7	21.0	-3.7	7	17.9	11.5	24.7	—	13	17	—	—
Maggio	23.2	12.3	17.2	30.0	7.2	5	15.8	10.9	22.8	—	—	25	6	—
Giugno	28.6	17.6	22.6	31.2	13.2	7	16.6	11.0	18.0	—	—	3	27	—
Luglio	30.8	19.7	24.7	35.0	13.7	10	15.0	11.1	21.3	—	—	1	30	—
Agosto	29.1	18.7	23.7	33.0	15.5	24	14.1	10.4	17.5	—	—	1	30	—
Settembre	27.5	14.7	20.4	33.2	7.0	27	15.4	12.8	20.2	—	—	13	17	—
Ottobre	19.6	9.1	13.8	25.5	3.0	29	14.3	10.5	23.5	—	—	4	27	—
Novembre	10.7	5.7	7.7	14.3	-0.2	20	11.0	6.0	15.5	—	—	27	3	—
Dicembre	6.4	1.3	3.4	11.5	-5.0	25	11.2	5.1	16.5	—	4	27	—	—
Valori annui	17.0	7.5	11.7	35.0	-22.0	16 II	17.9	9.5	57.0	5	52	106	92	110
MODENA (m. 35 s/m)														
Gennaio	0.9	-4.1	-1.7	3.9	-12.8	13	10.2	5.0	16.7	—	20	11	—	—
Febbraio	0.4	-7.1	-3.8	8.0	-14.0	16	12.8	7.5	22.0	—	22	6	—	—
Marzo	12.3	3.1	7.5	21.0	-6.1	4	13.2	9.2	27.1	—	3	16	12	—
Aprile	15.7	6.3	11.0	20.4	-0.7	7	13.1	9.4	21.1	—	—	10	20	—
Maggio	23.0	13.4	18.6	29.8	8.5	1	11.9	9.6	21.3	—	—	—	22	9
Giugno	27.5	17.9	22.9	31.0	12.9	29	12.1	9.6	18.1	—	—	6	24	—
Luglio	30.1	19.1	24.9	35.0	12.2	9	15.1	11.0	22.8	—	—	3	28	—
Agosto	28.5	18.8	24.1	32.5	12.0	6	12.7	9.7	20.5	—	—	1	30	—
Settembre	26.4	16.7	21.5	32.8	8.9	27	11.4	9.7	23.9	—	—	11	19	—
Ottobre	18.8	11.1	14.4	26.4	4.8	29	12.3	7.7	21.6	—	—	4	26	—
Novembre	10.7	6.9	8.6	14.0	1.8	15	7.7	6.8	12.2	—	—	24	6	—
Dicembre	7.0	2.3	4.3	13.0	-4.8	25	10.2	4.7	17.8	—	1	30	—	—
Valori annui	16.8	8.7	12.7	35.0	-14.0	16 II	15.1	8.1	49.0	—	46	101	107	111
FERRARA (m. 40 s/m)														
Gennaio	1.3	-3.3	-1.3	5.2	-9.2	29	9.0	4.6	14.4	—	23	8	—	—
Febbraio	-1.2	-8.0	-4.7	4.6	-17.6	16	11.6	6.8	22.2	5	19	4	—	—
Marzo	11.9	2.5	6.8	21.2	-5.5	4	14.4	9.4	26.7	—	3	21	7	—
Aprile	15.0	6.2	10.5	20.2	-1.0	7	13.4	8.8	21.2	—	—	11	19	—
Maggio	24.5	10.9	18.2	29.8	9.4	4	11.4	20.4	—	—	—	24	7	—
Giugno	27.2	17.4	22.6	30.4	13.0	22	12.7	9.8	17.4	—	—	—	7	23
Luglio	29.3	19.0	24.7	34.6	13.2	8	13.0	10.3	21.4	—	—	—	3	28
Agosto	28.7	19.0	24.1	33.0	15.5	4	13.2	9.7	17.5	—	—	2	29	—
Settembre	26.1	16.4	21.1	32.4	9.6	25	11.8	9.7	22.8	—	—	10	20	—
Ottobre	18.8	10.9	14.6	26.0	4.0	29	12.0	7.9	22.0	—	—	4	25	—
Novembre	10.6	6.7	8.5	13.0	0.6	15	7.6	8.9	12.4	—	—	24	6	—
Dicembre	6.8	2.3	4.4	13.4	-3.2	25	9.7	4.5	16.6	—	1	30	—	—
Valori annui	16.6	8.3	12.5	34.6	-17.6	16 II	14.4	8.2	52.2	5	46	102	103	109

Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche.

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche.

MESI	PO																								
	Pieve del Cairo (79)				Pavia (77)				Codogno (58)				Casalmaggiore (25)												
	Valori estremi		Valori medi		Valori estremi		Valori medi		Valori estremi		Valori medi		Valori estremi		Valori medi										
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.									
Gennaio	5.5	-8.5	1.5	-2.6	-0.9	7.2	-11.3	2.3	-4.0	-0.9	5.8	-9.8	2.0	-3.8	-1.3	6.0	-10.0	3.6	-4.0	-0.6	8.5	-9.5	1.5	-2.8	-0.9
Febbraio	7.5	-12.5	1.3	-5.2	-2.1	6.9	-15.7	2.0	-8.2	-3.8	4.7	-17.0	0.4	-3.9	-2.0	9.0	-16.0	0.8	-8.4	-1.4	9.5	-16.0	1.6	-5.7	-2.6
Marzo	23.0	-2.0	12.5	4.6	8.4	25.0	-5.9	14.9	0.9	7.2	20.5	-6.5	11.6	2.0	6.7	21.0	-5.0	10.5	2.2	5.8	19.5	-5.0	14.0	2.4	7.6
Aprile	22.0	1.0	16.0	8.4	12.0	24.8	-2.1	17.5	5.2	11.1	20.0	-1.0	15.4	5.9	10.8	21.0	-1.0	16.0	5.7	10.4	19.0	-4.0	15.4	6.2	10.6
Maggio	27.5	10.0	22.8	14.6	18.4	32.2	4.4	25.0	11.0	17.4	28.8	7.5	23.3	12.7	18.3	30.0	8.0	24.2	12.1	17.9	26.5	6.5	22.0	12.0	16.9
Giugno	31.5	13.5	27.8	19.5	23.5	33.9	9.1	29.5	15.5	21.9	30.5	11.9	27.5	14.2	21.2	33.0	11.0	29.8	17.0	22.9	30.5	13.0	26.8	18.3	22.4
Luglio	34.0	16.0	29.8	20.8	25.0	36.3	12.4	31.7	16.5	23.5	33.5	13.0	29.5	15.3	22.7	36.0	14.0	31.4	19.4	24.9	34.5	14.5	29.5	19.9	24.5
Agosto	31.0	18.0	27.6	20.7	23.9	33.5	11.5	29.6	15.8	22.1	30.3	15.0	27.5	17.9	22.8	33.0	14.0	29.4	17.0	22.9	30.5	15.5	28.4	19.6	23.9
Settembre	31.5	10.0	25.3	17.7	21.0	34.5	5.0	27.6	13.8	19.7	30.5	8.7	25.7	15.8	20.7	33.0	8.0	26.6	14.8	20.1	30.5	10.5	25.4	16.5	21.0
Ottobre	24.0	5.5	17.3	7.9	12.1	26.5	2.1	18.3	8.0	12.4	24.5	6.0	17.4	11.6	14.3	25.0	4.0	17.7	8.9	13.3	20.5	3.5	17.8	10.1	13.6
Novembre	14.5	1.0	10.7	6.5	8.4	15.4	-2.6	11.2	4.8	7.5	14.5	-1.0	11.2	5.3	8.1	14.0	0.0	9.9	5.0	7.0	15.5	-1.0	12.6	5.8	8.6
Dicembre	13.5	-5.5	7.2	1.6	4.1	15.8	-3.6	6.9	1.1	3.5	12.3	-3.0	7.3	1.3	4.1	11.0	0.0	6.2	2.5	4.1	14.5	-5.0	9.0	2.0	4.8
Valori annui estremi o medi	34.0	-12.5	16.6	9.5	12.8	36.3	-15.7	18.0	6.7	11.8	33.5	-1.7	16.6	7.9	12.2	36.0	-16.0	17.2	7.7	12.3	34.5	-16.0	17.1	8.7	12.5

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche.

MESI	SCRIVIA												STAFFORA										TREBBIA													
	Torriglia (764)						Tortona (420)						Voghera (108)						Peli (910)						Fontanigorda (820)											
	Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi		
	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.	medi	max.	min.	medi
Gennaio	5.5	-6.0	1.8	-2.2	-0.4		5.6	-9.4	1.6	-4.2	-1.8		8.2	-13.4	1.8	-5.3	-2.3		4.0	-10.9	0.9	-4.0	-1.8		12.0	-10.0	5.4	-2.1	1.3							
Febbraio	6.0	-12.5	0.7	-4.2	-2.0		6.0	-13.2	0.1	-6.2	-3.2		6.6	-20.5	0.8	-9.7	-5.2		6.0	-14.0	0.1	-5.9	-2.5		10.0	-12.0	4.7	-3.7	0.1							
Marzo	15.0	-6.0	8.2	2.9	5.2		21.4	-4.0	12.0	3.6	7.6		25.5	-6.5	14.7	0.9	7.1		14.0	-8.5	9.2	1.7	5.0		18.0	-4.0	11.2	3.5	6.9							
Aprile	13.5	-2.0	9.5	4.8	6.9		19.8	-0.4	15.2	7.1	10.9		24.2	-2.8	16.8	4.5	10.4		15.0	-5.0	10.2	4.0	6.8		19.0	-4.0	13.6	3.9	8.3							
Maggio	22.0	4.0	15.1	9.1	11.9		28.6	8.2	21.8	13.3	17.3		30.4	3.8	23.5	10.3	16.4		26.0	4.0	18.2	9.4	13.5		25.0	4.0	17.2	10.4	13.6							
Giugno	26.0	10.5	21.4	13.9	17.3		30.4	13.1	27.2	18.3	22.7		32.5	9.7	28.8	15.2	21.4		29.0	13.0	24.2	15.0	19.1		28.0	13.0	22.7	16.4	19.2							
Luglio	29.0	11.5	23.8	16.0	19.4		34.0	13.0	29.1	17.7	23.0		36.5	10.8	31.7	16.3	23.4		34.0	11.0	27.0	16.8	21.3		30.0	15.0	25.3	18.6	21.5							
Agosto	27.0	12.5	22.7	15.6	18.6		29.4	13.4	27.3	16.0	21.2		32.1	12.0	28.6	15.8	21.7		27.0	12.0	24.6	15.7	19.4		32.0	15.0	25.4	17.0	20.5							
Settembre	26.7	10.0	21.5	14.9	17.7		30.0	5.2	24.8	14.1	18.8		34.5	5.0	27.1	13.5	19.3		27.0	8.0	22.2	14.2	17.6		29.0	10.0	24.5	15.9	19.6							
Ottobre	18.5	4.0	13.6	9.1	11.0		22.3	3.4	15.9	8.9	12.0		26.0	1.9	17.0	8.6	12.2		17.0	2.0	12.8	8.9	10.5		25.0	3.0	15.9	9.5	12.2							
Novembre	11.0	2.5	8.6	6.1	7.2		13.2	1.4	10.2	6.0	7.9		14.4	-2.0	10.1	4.8	7.1		9.0	0.0	6.3	3.7	4.9		15.0	2.0	10.0	4.9	7.2							
Dicembre	11.0	-3.5	6.6	3.0	4.6		13.6	-5.0	7.4	2.2	4.5		14.5	-7.0	6.8	-0.4	2.6		12.0	-5.0	4.6	1.3	2.8		15.0	-3.0	8.0	2.4	4.9							
Valori annui estremi o medi	29.0	-12.0	12.8	7.4	9.8		34.0	-13.2	16.0	8.1	11.7		36.5	-20.5	17.3	6.2	11.2		34.0	-14.0	13.4	6.7	9.7		32.0	12.0	15.3	8.1	11.3							

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche.

MESI	CROSTOLO												SECCHIA																	
	Casina (500)						Boschi di Vezzano (200)						Valico Cerreto (1200)						Ligonchio (928)						Asta (920)					
	Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi			Valori estremi			Valori medi		
	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi	max.	min.		max.	min.	medi
Gennaio	7.0	-12.0	3.7	-5.5	-1.3		6.0	-12.0	2.7	-6.1	-2.1		7.0	-14.0	2.0	-4.2	-1.4	6.5	-11.0	3.3	-4.1	-0.7		5.0	-9.0	1.6	-3.8	-1.3		
Febbraio	9.0	-16.0	2.4	-8.8	-3.6		8.0	-16.0	2.4	-9.0	-2.7		13.0	-19.0	5.5	-10.8	-3.5	10.0	-14.5	2.9	-6.1	-2.1		6.5	-5.5	0.1	-6.3	-3.4		
Marzo	20.0	-9.0	11.2	0.0	5.0		20.0	-9.0	11.2	0.6	5.4		15.0	-14.0	6.0	-1.1	2.0	16.0	-7.4	9.2	0.3	4.2		17.0	-9.0	8.2	2.0	4.7		
Aprile	20.0	-8.0	15.2	4.3	9.5		19.0	-7.0	13.9	4.1	8.8		19.0	-12.0	9.3	1.0	4.7	18.8	-7.5	13.9	3.0	7.9		18.0	-6.0	10.7	4.5	7.3		
Maggio	27.0	6.0	22.4	11.0	16.8		27.0	6.0	20.6	10.5	15.6		23.0	1.0	16.4	7.4	11.6	27.0	3.5	21.0	8.4	14.3		23.0	5.0	16.7	11.0	13.7		
Giugno	30.0	12.0	26.5	15.7	21.3		29.0	11.0	25.4	15.4	20.6		26.0	10.0	20.9	13.3	16.7	29.5	9.0	25.4	13.5	18.8		25.0	10.0	21.1	16.1	18.3		
Luglio	33.0	11.0	28.6	16.6	22.7		34.0	11.0	28.3	17.0	22.8		27.0	11.0	23.7	14.0	18.3	31.8	9.5	27.3	15.6	20.7		28.0	12.0	23.9	18.4	20.8		
Agosto	30.0	12.0	26.4	16.0	21.1		30.0	12.0	26.2	15.9	20.9		27.0	7.0	22.0	15.5	18.2	29.0	10.2	25.0	12.9	18.0		26.0	12.0	21.7	16.8	18.8		
Settembre	30.0	6.0	23.9	13.7	18.5		30.0	6.0	24.0	13.3	18.3		27.0	3.0	18.5	10.9	14.0	28.0	5.5	22.4	12.6	16.8		26.0	8.0	20.3	15.3	17.4		
Ottobre	23.0	2.0	17.1	8.2	12.1		24.0	3.0	17.1	8.6	12.3		16.0	-2.0	11.0	5.1	7.6	20.5	1.0	15.3	7.5	10.8		18.0	2.0	14.0	9.5	11.5		
Novembre	14.0	-1.0	9.7	5.3	7.4		12.0	-1.0	9.1	5.0	6.9		14.0	-3.0	8.5	2.8	5.4	13.0	-1.5	8.8	3.6	6.0		10.0	-0.5	7.2	4.3	5.6		
Dicembre	12.0	-4.0	7.4	0.4	3.5		13.0	-4.0	6.9	0.7	3.5		11.0	-9.0	4.5	0.4	2.3	16.5	-6.5	7.9	0.8	4.1		17.0	-6.0	6.4	2.1	4.1		
Valori annui estremi e medi	33.0	-16.0	16.2	7.6	11.1		34.0	-16.0	15.6	7.6	10.9		27.0	-19.0	12.4	4.5	8.0	31.8	-14.5	14.9	5.7	9.9		28.0	15.5	12.7	7.5	9.8		

(Segue) Tab. III. — Valori estremi e medi della temperatura in alcune stazioni tipiche

4

4

1

1

2.

at

1

34

11

eseguite a tutto il 1928. L'ultima colonna contiene, infine, lo scostamento fra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

In base ai dati della tabella è stata tracciata la carta delle isoiete.

Tab. III. — Riporta per poche stazioni opportunamente scelte, la ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

I giorni piovosi sono ripartiti in sei categorie, rispettivamente per precipitazioni: da 1 a 10 *mm*; da 10.1 a 20 *mm*; da 20.1 a 30.0 *mm*; da 30.1 a 40 *mm*; da 40.1 a 50 *mm*; oltre 50 *mm*. Sono inoltre indicati in apposita colonna i giorni con precipitazioni inferiori ad un millimetro.

Tab. IV. — Riporta per le stazioni fornite di pluviografo, le durate (in ore e in minuti primi) delle precipitazioni registrate per ogni mese e per l'anno.

Per ciascuna stazione è stampato in **grassetto** il più elevato dei valori mensili ed in *corsivo* il più basso.

Tab. V. — Riporta, per le medesime stazioni considerate nella tabella precedente, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di un'ora, e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le 24 ore del 31 dicembre.

Tab. VI. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese.

Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

Tab. VII. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, le durate in giorni, dei tre periodi di tempo più lunghi dell'anno nei quali non sono state misurate precipitazioni, e le durate delle due coppie di periodi più lunghi in cui le precipitazioni non hanno superato rispettivamente *mm.* 15 e *mm.* 45.

Per quanto concerne l'inizio e la fine dei periodi presi in considerazione, vale il criterio esposto in merito alla precedente tabella.

Tab. VIII. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte e che hanno funzionato regolarmente nel corso dell'anno, le precipitazioni giornaliere più elevate osservate ogni mese.

Per ogni stazione è stampato in **grassetto** il massimo valore giornaliero dell'anno.

Tab. IX. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata, registrate dai pluviografi o segnalate dagli osservatori pluviometrici più diligenti.

Tab. X. — Contiene breve indicazioni sulle precipitazioni nevose. L'equivalente in acqua è dedotto fondendo la neve raccolta nel pluviometro o pluviometro.

Tab. XI. — Riporta per ognuno dei bacini imbriferi indicati, i volumi di afflusso meteorico annuo, dedotti dalla carte delle piogge, mediante planimetrazione delle superficie comprese fra successive isoiete, assegnando ad ogni elemento di area un'altezza pari alla media delle piogge corrispondenti alle due isoiete che la limitano; nella tabella stessa si riportano altezze di afflusso meteorico annuo, in *mm.* ed i corrispondenti contributi il $l/sec./Kmq.$

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Scrivia	Montebano	935	1.20	1907	Municipio di Genova	Bologna Ing. Edoardo	Staffora e Tidone	Pizzocorno	478	1.40	1917	R. U. I. Po	Robbiati D. Carlo
	Noci	776	1.20	1907	id.	idem		Varzi	409	1.40	1916	id.	Negri D. Giuseppe
	Torriglia	764	1.40	1914	R. U. I. Po	Carraro Eugenio		Montesegale	384	1.45	1916	id.	Canegallo D. Attilio
	Crocefleschi	742	1.35	1914	id.	Mareta Egisto		Rivanazzano	157	1.40	1922	id.	Massone D. Giovanni
	Frassinello	724	1.50	1927	id.	Priano D. Battista		Voghera	93	1.50	1914	U. C. M.	Direttore Scuola Agraria
	Sanguinetto	560	1.40	1907	Municipio di Genova	Bologna Ing. Edoardo		Montaldo Pavese	466	1.40	1915	R. U. I. Po	Bottazzi D. Pietro
	Castagnola	560	1.40	1916	R. U. I. Po	Perusso Giovanni		S. Gioietta	250	1.45	1916	id.	Lorenzini D. Emilio
	Montoggio	450	1.30	1916	id.	Perusso Guglielmina		Canevino	510	1.50	1920	id.	Grassi D. Antonio
	S. Agata Fossili	425	1.50	1917	id.	Molinari D. Lorenzo		S. Maria della Versa	216	1.50	1921	id.	Zanaldi D. Innocenzo
	Sarissola	400	0.50	1920	id.	Rolandelli Giuseppe		Luzzano	220	1.60	1916	id.	Dellachà D. Pietro
	Variana	300	1.35	1925	id.	Percivalle D. Enrico		Colle Penice	1146	1.40	1913	id.	Piazza Ernesto
	Stazzano	219	1.30	1921	id.	Rettore Seminario		Zavattarello	560	1.50	1914	id.	Valle Luigi
	Novi Piemonte	200	1.30	1879	U. C. M.	Daglio Maria		Pecorara	479	1.50	1916	id.	Albanesi D. Antonio
Borbera (Dextra di Scrivia)	Tortona	120	1.30	1889	id.	Leidi Prof. D. Camillo	Tidone	Pianello	185	1.60	1913	id.	Caupari D. Edmondo
	Carrega Ligure	955	1.40	1914	R. U. I. Po	Maccarini D. Domenico		Agazzano	184	1.45	1917	id.	Boselli Dott. Pietro
	Cabella Ligure	515	1.40	1917	id.	Torre D. Paolo		Sarmato (Zuccherificio)	70	1.50	1914	id.	Gualle Giacomo
	Zebedassi	492	1.35	1917	id.	Massone D. Giuseppe		Rondanina	1000	1.60	1914	id.	Scrivani Antonio
Turone	Borghetto	295	1.50	1914	id.	Grassi Claudina	Trebbia	Propata	996	1.55	1923	id.	Traverso L. Gio. Battista
	Foretondo	840	1.40	1914	id.	Tosi Margherita		Pradovera	937	1.45	1917	id.	Repetti Pacifico
	Fabbrica	480	1.30	1922	id.	Panigazzi D. Francesco		Alpe di Gorraio	918	1.50	1923	id.	Gneco D. Erminio
	Montemarzino	468	1.30	1916	id.	Ghezzi D. Alessandro		Pell	910	1.50	1927	id.	Lambrini D. Angelo
Staffora	S. Sebastiano	336	1.45	1914	id.	Azzoretti Antonio		Zerba	906	1.60	1923	id.	Rebolini Giovanni
	Casale Staffora	1070	1.40	1915	id.	Marenzi Natale		Fontanigorda	820	1.40	1914	id.	Ferretti Giovanni
	Pregola	1005	1.50	1914	id.	Buscaglia D. Carlo							
	S. Albano	604	1.30	1923	id.	Pagni D. Giacinto							

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.*

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno iniziale osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno iniziale osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Aveto (Destra di Trebbia)	Barchi	800	1.40	1923	R. U. I. Po	Pernigotti D. Pietro	Chiavenna	Gambaro	850	1.50	1928	R. U. I. Po	Rolleri D. Giuseppe
	Cerignale	730	1.50	1914	id.	Castelli Emilia		Reforto	824	1.60	1929	id.	Gogni Giovanni
	Rovigno	660	1.50	1923	id.	Campomenosi D. Franco		Cassimoreno	800	1.50	1914	id.	Ratti Agostino
	Montebruno	657	1.35	1923	id.	Daglio D. Paolo		Centenaro	790	1.50	1928	id.	Boldini D. Luigi
	Ottone	510	1.50	1914	id.	Raggi Carlo		Rompeggio	755	1.50	1928	id.	Ferraroni D. Giovanni
	Brugnello	468	1.45	1923	id.	Brignoli D. Nicola		Cerreto Rossi	700	1.50	1924	id.	Bruni D. Antonio
	Ponte Organasco	450	1.50	1923	id.	Pernigotti Giulietta		Rigolo	700	1.60	1914	id.	Callegari Maria
	Losso	416	5.00	1928	id.	Devoti Nicola		Cassano	379	2.15	1917	id.	Ricci D. Giuseppe
	Bobbio	270	1.60	1913	id.	Boveri Clementina		Bettola	309	1.20	1914	id.	Bongiorno Mario
	Perino	200	1.50	1915	id.	Torre Amilcare		Villò	200	1.80	1927	id.	Amedei D. Carlo
	Statto	174	1.40	1914	id.	Orlandi Giuseppina							
	S. Lazzaro (Attribuita)	50	1.50	1837	U. C. M.	Direttore Osservatorio							
	Monte Penna	1430	3.10	1926	R. U. I. Po	Focacci Ernesto	Arla	Obolo	901	1.60	1926	id.	Merli D. Benvenuto
	Casa For. A. Stella	1304	3.10	1926	id.	id.		Padri di Bettola	556	1.50	1929	id.	Agazzi D. Antonio
	Barbagelata	1122	1.50	1913	id.	Lastreto D. Angelo		Castellana	434	1.50	1914	id.	Gherardi D. Alberto
	S. Stefano	1014	1.30	1913	id.	Ferretti D. Ambrogio		S. Maria del Rivo	393	1.50	1920	id.	Villa D. Giovanni
	Alpeiana	934	1.45	1923	id.	Biggi D. Luigi		Rezzano	200	1.50	1927	id.	Peretti D. Amelio
	Brugnato	903	1.50	1923	id.	Bertazzieri D. Paolo		S. Giorgio Piacent.	104	1.80	1928	id.	Peroncini Giacomo
	Priosia	900	1.40	1923	id.	Cella D. Giuseppe		S. Nazzaro	41	1.50	1928	id.	Domeneghetti Archim.
	Castagnola	840	1.30	1915	id.	Paganini D. Luigi							
	Magnasco	817	1.20	1917	id.	Caprini D. Natale		Pelizzone	1022	1.70	1913	id.	Casali Giuseppe
	Cabanne	812	1.50	1913	id.	Cella Fortunato		Morfasso	650	1.50	1923	id.	Saccomani Giuseppe
	Boschi	630	5.00	1928	id.	Soc. Forze Idr. Liguria		Vernasca	495	5.50	1916	id.	Bianchi D. Vincenzo
Mare e Chiavenna Mure	Selva Ferriere	1110	0.90	1917	id.	Pareti Tommaso		Villa Alheroni	205	1.00	1880	id.	Bottarelli Beatrice
	Grondone	1051	1.50	1924	id.	Bocciarrelli Domenico		Fierenzuola	82	1.70	1917	id.	Graziano Luigi
	Mareto	980	1.50	1926	id.	Po D. Antonio		Villanova d'Arda	43	1.50	1928	id.	Madre Sup. Ospedale
	Cogno S. Bassano	860	1.50	1927	id.	Musi D. Luigi		Busseto	40	1.50	1928	id.	Convento Frati Minori
							Taro	Centocroci	1053	1.40	1922	id.	Forni Emilio
								Cisa (Roncazz)	970	1.50	1917	id.	Molinari Roberto

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche*

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza della docca dell'apparecchio sull'altitudine	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della docca dell'apparecchio sull'altitudine	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
	Bratello	924	1,50	1928	R. U. I. Po	Terroni D. Luigi	Ceno (Sinistra di Taro)	Cornolo	Pn	950	1,50	1928	R. U. I. Po	Rivalta D. Luigi
	Glarette	900	2,00	1925	id.	Lagorio Giovanni		Casalporino	Pn	915	1,30	1923	id.	Ferretti D. Filippo
	Berceto	800	1,10	1910	id.	Rossi D. Giov. Battista		Spora	Pn	900	1,40	1926	id.	Moglia Gioacchino
	Porcigatone	800	0,90	1914	id.	Delnevo D. Francesco		Nociviglia	Pn	900	1,50	1914	id.	Mutti Rinaldo
	Strinabecco	800	1,50	1927	id.	Brizzolara Lorenzo		S. Giustina	Pn	800	1,30	1922	id.	Nestori D. Giuseppe
	Montegrosso	750	1,80	1921	id.	Sabini Antonio		Bore di Metti	Pn	800	1,50	1920	id.	Brugnolotti Teodoro
	S. Maria del Taro	744	4,00	1913	id.	Govoni Vittorio		Cereseto	Pn	760	1,60	1922	id.	Negri Giovanni
	S. Maria Valderna	731	1,50	1926	id.	Grilli D. Tarquinio		Pione	P	673	1,50	1924	id.	Tinelli D. Pietro
	Preleria	724	1,50	1917	id.	Lupi Norberto		Bardi	P	625	1,65	1917	id.	Basini Francesco
	Valdena (Centrale)	720	9,00	1927	id.	Barioglio Romolo		Varsi	P	412	1,50	1917	id.	Scala D. Riccardo
	Tornolo	620	1,50	1927	id.	Scarsella Luigi		Vlanino	P	300	2,30	1919	id.	Marchini D. Luigi
	Boschi di Bardone	608	1,55	1919	id.	Tommasini Giuseppe		Varano Melegari	P	190	1,50	1913	id.	Leonardi Enrico
	Baselica	600	1,60	1919	id.	Molinari D. Andrea	Parma Parma	Lago Santo	Pt	1520	3,50	1915	id.	Ghirardini Quinto
	Casale di Parma	600	1,40	1926	id.	Truffelli Davide		Muslara Superiore	Pn	1050	1,45	1920	id.	Marasini D. Ettore
	Careno	581	1,50	1913	id.	Cenci Augusto		Ballone	P	825	1,50	1917	id.	Buratti D. Guido
	Albareto	550	1,35	1925	id.	Caldi D. Romeo		Tizzano	Pn	795	1,50	1914	id.	Pavarani D. Enfemio
	Bedonia	544	1,30	1913	id.	Ferrari D. Silvio		Marra (Bacino)	Pn	776	1,50	1928	id.	Michelotti Luigi
	Selva del Bocchetto	539	2,00	1923	id.	Ablondi D. Francesco		Moragnano	P	750	2,00	1919	id.	Bucci D. Lino
	Bergotto	500	1,50	1926	id.	Grassi Emilio		Bosco di Corniglio	Pn	742	1,70	1915	id.	Ghirardini Quinto
	Borgo Val di Taro	411	1,60	1913	id.	Foschini Natale		Bosco di Corniglio (Centrale)	Pr	730	1,40	1926	id.	Carra Leandro
	Neviano Rossi	407	1,10	1917	id.	Cavalli D. Alessandro		Cozzano	P	730	1,30	1925	id.	Branchi Secondo
	S. Lucia	400	0,90	1916	id.	Lucchi D. Angelo		Marra (Centrale)	Pr	635	1,60	1928	id.	Zucchellini Giuseppe
	S. Vittore	360	1,50	1927	id.	Masini D. Luigi		Petrignacola	P	630	1,60	1927	id.	Mazzini Giacomo
	Orlano	260	1,50	1928	id.	Maselli D. Enrico		Autreola	P	600	2,20	1925	id.	Ravanetti D. Giovanni
	Salsomaggiore	160	1,40	1913	id.	Popoli Giuseppe		Antesica	P	450	1,20	1913	id.	Landi D. Vittorio
	Gavazzoli di Noceto	95	1,50	1928	id.	Azzolini Giuseppe		Pannocchia	P	175	1,00	1921	id.	Vitoli D. Giuseppe
	Fontanellato	50	1,50	1928	id.	Cozzani Alessandro		Parma	vari	52	18,00	1913	id.	Personale R. U. I. Po
	Roccabianca	32	1,50	1928	id.	Pizzuto Antonio		Colorno	P	26	1,50	1928	id.	Occhialini Giuseppe

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.*

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazione	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazione	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Baganza (Sinistra di Parma)	Casaselvatica	850	1.35	1919	R. U. I. Po	Raschi Domenico	Crosetolo Crosetolo	Canossa	530	1.45	1912	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Tondelli D. Felice
	Cassio	813	1.55	1914	id.	Cavazzini D. Giovanni		Casina (Cantoniera)	500	1.50	1923	id.	Cantoniere Provinciale
	Vallerano	513	1.50	1918	id.	Pelosi Pietro		Regnano	415	1.65	1918	R. U. I. Po	Motti Adelmo
	Calestano	417	1.40	1912	id.	Cavagni Torquato		Roncolo	275	1.40	1926	id.	Ferrari D. Adelmo
	S. Michele del Gatti	240	1.50	1929	id.	Del Sante D. Eugenio		Boschi di Vezzano	200	1.50	1921	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Valdesalici Luigi
	S. Martino Sinzano	127	1.55	1914	id.	Tanzi Prof. D. Felice		Reggio Emilia	60	19.50	1867	U. C. M.	Zanelli Ing. Dezio
Enza Enza	Lagastrello	1200	1.50	1910	Società Idr. Ligure	Personale della Società	Secchia Secchia	Valico Cerreto	1200	1.50	1910	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Artoni Tito
	Paduli	1160	1.50	1910	id.	Idroelettrica Ligure		Sparavalle	970	1.50	1910	id.	Vanicelli Vittorio
	Rigoso	1131	4.00	1920	R. U. I. Po	Cortesi Luigi		Blsmantova	830	1.50	1910	id.	Dalla Porta Francesco
	Succiso	911	1.50	1910	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Macci Venezia		Sologno	805	1.50	1923	id.	Pasquini D. Leopoldo
	Ramisetto	850	1.60	1914	id.	Canedoli Giuseppe		Valestra	800	1.80	1914	R. U. I. Po	Bartolini D. Giuseppe
	Storlo	845	1.50	1913	id.	Zampolini Fiorina		Collagna	800	1.50	1909	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Lenzini Domenico
	Leguigno	645	1.30	1913	id.	Bizzarri D. Giuseppe		Carpinetti	780	1.50	1923	id.	Bonini D. Giuseppe
	Campora di Sasso	620	1.40	1918	R. U. I. Po	Altamura D. Aristide		Castelnuovo Monti	730	1.33	1909	id.	Ruffini Giovanni
	Vedriano	590	1.00	1910	U. C. M.	Canedoli D. Domenico		Baiso	512	1.40	1913	id.	Bagnoli D. Contardo
	Ranzano	540	1.35	1919	R. U. I. Po	Spinabelli D. Lodovico		Salcava	530	1.50	1910	id.	Lametti Narciso
	Neviano Arduini	422	1.50	1917	id.	Infanti D. Icilio		Montebanzzone	500	2.20	1921	R. U. I. Po	Bernardoni D. Antonio
	Vetto	330	1.30	1896	id.	Santi D. Alberio		Cavola di Toano	484	1.60	1923	id.	Berrettini D. Marcelino
	Cazzola	296	2.20	1910	id.	Barilla D. Rodolfo		Levizzano	189	1.50	1922	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Boechi Carlo
	Marano	112	4.80	1898	id.	Bertacchini Pietro		Sassuolo	121	1.23	1924	R. U. I. Po	Vivi Mario
	Montecchio	98	14.30	1914	id.	Martini Antonio		Bastiglia	21	1.40	1928	Boll. Parm. Meglia	Pivetti Virginio
	S. Harlo	64	8.00	1907	id.	Bonazzi Giovanni							
							Ozola (Destra di Secchia)	Praderena	1550	1.50	1922	Commiss. Prov. Pro Seve - Reggio E.	Società Idroelett. Ozola
								Colle Belfiore	1350	1.50	1922	id.	idem
								Ospedaletto	1100	1.50	1920	id.	Bertogni Pietro
								Ligonchio	928	1.30	1920	id.	Società Idroelett. Ozola
								Presa d'Ozola	920	0.90	1921	id.	idem
Cedra (Sinistra d'Enza)	Rimagna	1001	2.10	1917	R. U. I. Po	Gnattori Vincenzo							
	Selvanizza	600	10.00	1928	id.	Bogliani Tomaso							
	Isola di Palanzano	575	2.10	1926	id.	Grassi Giacomo							

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.*

BACINI	STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore	BACINI	STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell' Osservatore
Secchiello (Destra di Secchia)	Piolo	P	773	1.50	1911	Comiss. Prov. Pro Selve - Reggio E.	Gaasassini D. Silvestro	Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)	Campegine	P	34	13.00	1907	Bonifica Bentivoglio	Anna Monari
	Cinquecerri	P	697	2.00	1926	id.	Società Idroel. dell'Ozola		Ponte Alto	P	26	13.00	1907	id.	Seardova Francesco
	Castione d' Asta	P	920	1.42	1921	id.	Sillari Michele		S. Vittoria	P	22	3.00	1907	id.	Gabbi Enrico
	Quara	P	720	1.44	1921	id.	Bonicelli Marino		Torrlone	P	22	4.50	1907	id.	Villani Umberto
	Razzolo	P	610	1.50	1920	id.	Azzolini Clemente		Gualtieri	P	22	3.50	1907	id.	Re Guglielmo
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Radici	Pn	1520	1.50	1918	R. U. I. Po	Lunardi Angolina	Bonifica in destra di Parnigiana Moglia (Sinistra di Secchia)	Boretto	P	20	12.00	1907	id.	Manghi Luigi
	Piandelagotti	Pn	1209	1.50	1910	id.	Lunardi D. Adolfo		Capanna	P	20	12.00	1907	id.	Soncini Roberto
	Frassinoro	Pn	1097	1.60	1919	id.	Fiori D. Francesco		Correggio	P	48	14.00	1885	U. C. M.	Meulli Dott. Giorgio
	Clivago	Pn	1024	1.30	1921	Comiss. Prov. Pro Selve - Reggio E.	Munari D. Francesco		Campogalliano	P	43	12.50	1907	id.	Ruozì Guido
	Toano	Pn	944	1.40	1923	R. U. I. Po	Lunardi D. Celso		S. Martino in Rto	P	36	1.60	1924	Basil. Parm. Moglia	Suetta Florindo
Rossenna (Destra di Secchia)	Montefiorino	Pn	797	1.00	1919	id.	Tazzioli Manlio	Panaro Scoltenna	Bagnolo in Piano	P	32	1.60	1924	id.	Penazzi Tomaso
	Ceredolo	P	300	1.50	1910	Comiss. Prov. Pro Selve - Reggio E.	Lanzotti Ernesto		Carpi	P	28	21.25	1871	U. C. M.	Forti Danilo
	Lama Mocogno	Pn	812	1.59	1923	R. U. I. Po	Ladanza Michele		Ponticelli di Carpi	P	25	1.60	1924	Basil. Parm. Moglia	Capelli Telesforo
	Polinago	Pn	810	1.60	1923	id.	Croci D. Primo		Novellara	Pr	24	1.60	1924	id.	Rebecchi Giuseppe
	Pavullo	P	682	10.00	1882	U. C. M.	Casalgrandi Carlo		Campagnola	P	23	1.60	1924	id.	Iotti Enrico
Tresinaro (Sinistra di Secchia)	Prignano	P	497	1.70	1918	R. U. I. Po	Marzani D. Adolfo	Panaro Scoltenna	Ponte Rosso	P	22	1.60	1927	id.	Marcagnossi Angelo
	Gombola	P	450	1.50	1922	id.	Baroni Giuseppe		Ponte Testa	P	21	1.60	1927	id.	Ascarei Giovanni
	Marola	P	717	1.30	1878	U. C. M.	Macchioni D. Francesco		Ponte Pietra	P	21	1.60	1924	id.	Berni Adriano
	S. Valentino	P	300	2.00	1922	R. U. I. Po	Ienmi D. Luigi		Mondine	Pr	19	1.60	1924	id.	Benaglia Giovanni
	Viano	P	272	1.50	1922	Comiss. Prov. Pro Selve - Reggio E.	Simonazzi D. Aldo		S. Siro	P	18	1.60	1927	id.	Bottazzi Eugenio
	Ca' de' Caroli	P	168	11.00	1920	id.	R. Scuola Zanella		Botte S. Prospero	P	18	1.60	1927	id.	Saracchi Luciano
	Bagno	P	54	1.40	1925	Basil. Parm. Moglia	Tondelli D. Adelchi		Monte Cimone	Pn	2163	3.10	1925	R. U. I. Po	Burchi Oreste
									Cervarola	Pn	1500	3.10	1925	id.	Burchi Oreste
									Boscolungo	Pn	1340	2.00	1920	Sez. Idr. Pisa	Porciani Silvio
									Barigazzo	Pn	1224	1.05	1914	R. U. I. Po	Tagliani D. Giuseppe
									Tagliole	Pn	1150	1.44	1924	id.	Gimorri D. Alfredo
									Sestola	Pn	1086	1.30	1871	U. C. M.	Burchi Oreste

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche.*

BACINI	STAZIONI	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	BACINI	STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno inizio osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Leo	S. Anna Pelago	1069	1.50	1924	R. U. I. Po	Cav. Santi D. Luigi	Bacino sciolto in Po tra Crostolo Secchia e Panaro							
	Fiuralbo	943	4.50	1885	U. C. M.	Riva Mario								
	Montecreto	868	1.40	1919	R. U. I. Po	Ferrari D. Alcide		Botte Sotto Secchia	P	29	12.20	1908	Bonif. Mant. Reg.	Mazzola Giuseppe
	Galato	800	1.25	1925	id.	Maccari D. Giuseppe		Quastalla	P	25	14.00	1913	R. U. I. Po	Manzini Giuseppe
	Pievepelago	761	1.70	1922	U. C. M.	Ferrari Maddalena		Due Ponti	P	23	5.89	1908	Bonif. Mant. Reg.	Garò Giuseppe
	Strettara	570	10.00	1928	R. U. I. Po	Gioanetti Ludovico		Pegognaga	P	22	8.00	1910	id.	Guerra Tranquillo
								Reggiolo	P	20	8.75	1908	id.	Gandini Umberto
	Madonna dell'Acero	1180	1.80	1918	id.	Pasquali Raffaele		Suzzara	P	20	1.00	1913	U. C. M.	Villani Dino
	Ospitale Fanano	936	1.50	1912	id.	Seghi Gioacchino		Quistello	P	17	6.50	1910	id.	Ruberti Cav. Amedeo
	Fellicarolo	935	1.80	1924	id.	Biondi Rita		Maglia	P	12	15.00	1912	Bonif. Mant. Reg.	Verone Adriano
Panaro	Fanano	640	1.50	1927	id.	Ferrari Giuseppe	Fuori Bacino	Sermide	P	12	3.00	1896	U. C. M.	Belfanti Luciano
	Recca Corneta	604	1.60	1924	id.	Carboni Celestino								
	Montese	841	14.00	1898	U. C. M.	Manzini Lino		Cavezzo	P	24	1.80	1913	R. U. I. Po	Malavasi Ernesto
	Ligorzano	737	1.60	1915	R. U. I. Po	Orlandi Giuseppe		Concordia	P	22	1.60	1908	id.	Baraldi Antonio
	Montombraro	729	8.00	1910	U. C. M.	Boselli D. Giuseppe		Stellata	P	16	18.00	1923	id.	Gadda Giuseppe
	Rosola	690	1.35	1925	R. U. I. Po	Leonello D. Pio		S. Martino in Spino	P	10	10.00	1911	U. C. M.	Baraldi Paolo
	Verica	580	1.10	1926	id.	Zanni D. Arcangelo								
	Coscogno	536	1.20	1925	id.	Galantini D. Primo		Casteldario	P	23	1.50	1909	id.	Mozzi Imelda
	Guiglia	483	8.80	1891	U. C. M.	Ceretti Costantino		Ostiglia	P	13	2.00	1909	id.	Coppini Aelsio
	S. Venanzio	281	7.90	1919	R. U. I. Po	Teggi D. Saturnino	Sinistra di Po	Ficarelo	P	10	1.60	1909	id.	Monesi Giuseppe
	Savignano	194	1.50	1925	id.	Enbiani D. Cleto								
	Vignola	125	15.00	1925	id.	Leonelli Paolo								
	Spilamberto	70	1.05	1900	id.	Muratori Leopoldo								
	Modena	35	8.20	1881	U. C. M.	Bonacini Prof. Carlo								
	Nonantola	24	1.70	1871	id.	Alessandrini Cesarina								
	S. Felice	19	2.00	1910	id.	Bergamini Prof. Alberto								
	Finale	15	10.00	1894	R. U. I. Po	Leonardi Aurelio								
	Bondeno	11	10.50	1914	id.	Lafranchi Adriano								

Tab. II. - Totali mensili e annui delle precipitazioni e dei giorni piovosi, medie di 14 anni dei totali annui e scostamenti dalla media

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Bacino della Scrivia																														
Montebano	935	77	5	61	7	16	3	293	10	382	17	172	11	28	3	299	9	197	5	466	18	452	13	442	11	2835	112	2621		+ 264
Noel	776	50	3	31	4	—	—	87	4	274	11	145	6	—	—	232	5	92	3	165	7	319	12	152	8	1547	63	2359		— 812
Terriglia	764	118	6	34	7	10	2	296	12	374	14	162	10	31	4	169	9	53	5	245	16	214	15	335	8	2042	108	2397		— 355
Crocefieschi	742	49	2	29	4	8	1	98	8	133	10	69	5	21	2	109	5	14	2	175	7	118	9	185	8	1008	63	1535		— 527
Frassinello	724	56	6	23	7	5	1	127	9	257	15	85	7	19	3	216	4	76	8	209	10	136	13	188	9	1427	92	*		—
Sanguinetto	566	69	6	38	6	4	1	216	8	214	19	79	5	32	3	209	7	136	5	219	15	195	14	272	10	1683	99	2144		— 461
Castagnola	560	47	4	22	4	—	—	108	5	173	10	41	1	66	4	259	3	36	2	355	14	274	17	154	9	1535	73	1646		— 111
Monteggio	450	59	4	31	5	6	2	209	9	277	14	71	7	11	2	203	7	83	5	259	9	185	10	304	9	1698	83	2082		— 384
S. Agata Fossili	425	41	2	17	2	2	1	40	5	130	9	28	5	27	3	152	6	29	3	159	9	99	12	90	6	814	63	924		— 110
Sarissola	400	38	7	28	3	6	2	161	10	147	12	12	3	—	—	240	5	21	4	261	12	262	13	158	11	1334	82	1729		— 395
Variana	300	49	4	14	3	21	2	66	4	73	5	82	5	31	2	223	5	45	4	152	10	161	10	90	8	1009	62	*		—
Stazzano	219	50	3	27	4	7	2	79	4	80	7	19	4	15	3	215	5	65	5	237	8	92	9	96	6	1002	60	1438		— 436
Novi Piemonte	200	58	5	18	3	—	—	69	7	50	7	24	3	12	2	135	5	19	3	233	11	81	11	107	10	806	67	950		— 144
Tortona	120	38	4	10	4	13	3	45	6	63	8	20	1	12	3	80	4	2	1	79	9	66	11	79	9	507	63	654		— 47
Borbera																														
(Destra di Scrivia)																														
Carrega Ligure	955	44	3	2	2	—	—	170	8	230	13	68	6	21	4	170	5	15	2	142	8	207	9	152	6	1221	66	1782		— 561
Cabella Ligure	515	15	2	2	1	—	—	40	2	60	3	23	2	25	1	302	6	—	—	122	5	130	8	86	3	806	33	1182		— 376
Zebadassi	492	43	2	5	1	—	—	59	4	81	7	101	4	30	2	195	3	31	2	126	6	105	8	100	4	876	43	1022		— 146
Borghetto	295	5	2	10	1	4	2	15	3	25	2	10	1	—	—	375	3	27	3	106	2	156	6	91	4	824	29	1095		— 271
Bacino del Curone																														
Forotondo	840	12	3	21	4	—	—	56	3	191	6	86	5	84	7	176	5	29	2	134	10	81	7	40	4	910	56	960		— 50
Fabbrica	480	54	4	30	2	7	1	30	7	120	10	48	8	22	2	181	3	25	3	106	8	124	8	40	5	787	61	816		— 29
Montemarzino	468	51	2	9	2	4	2	23	5	91	9	12	2	12	1	121	4	13	3	151	8	75	11	54	7	616	56	755		— 139
S. Sebastiano Curone	336	45	3	15	3	—	—	28	4	113	7	27	5	5	2	—	—	32	2	100	6	89	6	110	6	564	44	1085		— 521

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	mm.	giorni	mm.	
Racino della Staffora																														
Casale Staffora	1070	145	5	30	3	24	2	39	9	237	10	115	7	6	2	120	3	35	1	180	8	225	11	40	5	1196	66	1459	—	263
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	2	20	2	11	2	18	4	39	8	—	—	—	—	—
S. Albano	604	30	4	90	6	20	1	90	8	125	6	40	3	35	4	75	3	—	—	[164]	7	70	7	55	7	794	56	897	—	103
Pizzocorno	478	85	4	81	4	6	2	54	7	89	10	69	7	27	2	141	5	37	3	193	9	123	10	65	7	970	70	848	+	122
Varzi	409	38	3	10	3	6	3	31	7	102	12	59	7	53	3	176	4	10	3	94	7	91	8	56	7	726	67	790	—	64
Montesagale	384	56	5	22	3	6	2	28	6	43	6	58	6	31	3	101	5	17	2	86	8	89	12	81	8	618	66	796	—	178
Rivanazzano	157	90	2	15	2	—	—	42	4	42	5	75	4	30	2	124	5	14	2	165	8	71	7	73	8	741	49	703	+	38
Voghera	93	55	5	17	5	11	2	37	7	40	7	12	2	31	3	116	7	14	2	167	11	63	11	64	10	627	74	712	—	85
Racino compreso tra Staffora e Tidone Scuorpasso																														
Montaldo Pavese	466	48	6	19	4	6	2	43	5	39	5	50	6	34	4	123	5	10	1	96	7	112	12	76	6	656	63	852	—	196
S. Giulietta	250	32	2	24	6	—	—	40	4	56	4	61	2	12	2	117	4	30	4	116	11	217	12	82	6	787	58	783	+	4
Versa																														
Canevino	510	47	5	19	1	—	—	33	4	47	7	24	5	46	4	88	4	7	2	83	7	70	12	47	8	511	59	779	—	268
S. Maria della Versa	216	102	5	14	1	—	—	67	3	31	5	53	3	17	3	121	5	—	—	118	6	103	10	68	7	694	48	862	—	168
Bardonezza																														
Luzzano	220	51	6	14	3	1	1	37	4	33	6	25	3	24	2	83	4	—	—	98	7	81	10	60	8	507	54	773	—	266
Racino del Tidone																														
Colle Penice	1146	56	7	18	3	10	1	98	5	138	5	50	2	35	2	120	3	—	—	110	5	145	9	113	7	893	49	1265	—	372
Zavattarello	560	61	5	16	3	2	1	57	6	90	7	26	5	18	1	151	4	40	1	97	7	104	9	52	6	714	55	837	—	123
Pianello	185	93	10	36	6	15	1	50	7	69	7	34	5	5	1	100	2	—	—	65	3	100	5	25	2	592	49	836	—	244
Agazzano	184	83	6	17	4	6	3	58	8	63	9	24	4	25	3	103	5	—	—	54	8	94	16	63	9	590	75	827	—	237
Sarmato (Zuccherificio)	70	54	8	17	4	9	2	33	6	35	7	19	2	14	2	90	6	—	—	55	9	82	12	50	8	458	66	693	—	235

(Segue) Tab. II. — Totali mensili e annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
Barino della Trebbia																														
Rondanina	1000	89	11	34	6	7	3	206	10	281	14	141	3	26	4	138	5	39	6	235	18	182	16	340	14	1718	110	2123	—	405
Propata	996	63	5	38	3	—	—	55	2	285	8	70	4	15	2	147	4	10	1	181	3	210	8	215	8	1289	48	1836	—	547
Pradovera	937	91	7	18	3	2	1	67	5	124	8	37	5	22	2	110	6	26	2	73	8	114	12	102	7	786	66	1264	—	478
Alpe di Gorreto	918	88	5	30	6	2	1	177	6	285	15	68	8	40	4	124	6	30	5	215	11	197	12	317	10	1573	89	1804	—	231
Pell	910	87	6	29	4	5	1	66	7	188	12	50	6	32	3	124	4	22	3	67	6	112	10	125	8	907	70	—	—	—
Zerba	906	76	3	26	2	5	1	161	8	362	3	59	4	27	2	106	4	5	1	129	5	183	9	162	6	1301	48	1478	—	177
Fontanigorda	820	49	5	8	4	—	—	198	5	248	14	63	5	13	1	152	4	16	4	196	10	111	11	184	5	1238	68	1347	—	109
Barchi	800	70	3	17	5	—	—	138	7	268	11	138	6	40	3	125	5	11	3	200	11	170	15	141	9	1318	78	1789	—	471
Cerignale	730	73	5	45	3	10	1	123	6	128	4	43	2	50	2	78	4	8	1	95	6	130	8	95	4	878	46	1184	—	306
Rovegno	660	59	6	8	3	—	—	178	7	253	16	78	8	46	4	166	5	32	3	174	9	163	16	226	9	1378	86	1556	—	178
Montebruno	657	69	4	21	4	10	2	266	7	248	11	154	7	24	2	190	5	41	5	249	13	182	9	359	10	1813	79	1922	—	109
Ottone	510	86	4	8	1	—	—	87	6	214	12	99	6	26	2	185	4	—	—	96	9	74	13	194	5	1069	62	1389	—	320
Brugnello	468	70	4	30	2	—	—	46	6	63	12	34	5	9	3	41	3	4	1	73	7	57	10	17	4	444	57	989	—	485
Ponte Organasco	450	[76]	5	11	1	—	—	61	4	178	14	21	1	21	2	46	3	—	—	76	7	301	20	150	3	941	60	1379	—	438
Losso	416	40	6	15	5	—	—	121	9	241	14	44	7	24	3	109	6	2	2	80	9	141	16	97	13	914	90	—	—	—
Bobbio	270	47	6	8	2	10	1	21	4	147	9	11	2	26	3	140	4	—	—	92	9	74	7	108	8	684	55	1027	—	343
Perino	200	22	2	21	3	2	1	22	5	84	7	[25]	4	8	2	[54]	4	5	1	30	8	78	15	59	7	410	59	931	—	523
Statto	174	89	4	30	4	6	1	52	9	60	7	11	2	23	3	69	4	—	—	56	7	116	13	56	7	508	61	784	—	216
S. Lazzaro (Attribuita)	50	66	8	33	4	2	2	36	6	49	10	18	4	7	2	57	6	1	1	50	10	85	13	63	9	467	75	760	—	293
Aveto																														
(Destra di Trebbia)																														
Foreste Monte Penna (1)	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1645	—	—	—	—
Casa Forestale a Stella (1)	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1726	—	—	—	—
Barbagelata	1122	137	5	28	3	10	1	247	8	269	10	135	6	69	4	90	5	156	8	255	15	271	11	115	10	1782	86	2912	—	1130
S. Stefano	1014	68	7	9	3	2	2	118	10	[164]	12	[124]	7	29	3	129	8	43	5	226	12	156	17	192	9	1260	95	1559	—	299
Alpeiana	934	77	7	7	4	1	1	128	11	245	14	130	7	37	3	220	7	39	4	203	11	135	15	189	9	1411	93	1752	—	341

(1) Totalizzatore a lettura annuale.

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	mm.	
Brugnato	903	65	6	22	4	—	—	70	6	109	9	82	6	32	4	161	4	30	4	70	9	107	14	121	9	864	75	1213	—	344
Prìosa	900	83	7	10	5	—	—	330	7	404	11	105	9	33	3	115	7	38	4	220	9	349	12	333	8	2010	82	2419	—	409
Castagnola	840	51	5	21	4	2	1	104	10	235	15	131	10	22	2	154	6	21	3	149	10	187	12	147	10	1244	88	1655	—	411
Magiasco	817	82	5	16	4	1	1	84	8	242	15	99	6	42	6	80	8	26	1	121	9	146	13	145	8	1084	84	2342	—	1258
Cabanne	812	36	8	16	5	1	1	345	13	297	12	102	11	25	4	149	7	56	4	420	15	243	16	480	11	2170	107	3141	—	971
Boschi	650	176	6	8	4	5	2	99	12	231	15	83	4	24	3	200	7	14	4	[356]	12	122	14	[348]	12	1537	95	—	—	—
Bacino del Nure e del Chiavenna																														
Nure																														
Selva Ferriere	1110	57	5	26	3	5	1	102	8	276	15	137	7	44	3	177	4	40	2	85	6	153	11	173	7	1275	72	1633	—	358
Grondone	1051	52	4	16	2	—	—	47	6	129	10	32	5	30	3	135	3	15	2	52	5	73	8	106	6	687	54	1050	—	363
Maretò di Farini d'Olmo	980	115	7	35	3	5	1	54	5	189	9	62	6	22	3	129	5	13	3	67	9	96	13	109	8	896	72	—	—	—
Cogno S. Bassano	860	50	7	20	4	8	2	42	5	109	13	49	5	12	2	103	3	3	1	69	6	96	14	84	6	645	68	—	—	—
Gambaro	850	79	7	39	4	6	2	80	6	162	7	82	4	34	4	144	2	10	2	117	7	162	14	115	11	1030	70	—	—	—
Retorto	824	64	6	54	5	5	2	105	6	262	12	103	7	58	6	133	4	7	1	143	7	215	15	81	5	1230	76	—	—	—
Cassimoreno	800	119	8	25	3	8	2	110	8	158	15	107	9	72	4	76	3	7	2	88	8	93	13	153	8	1016	83	1453	—	437
Centenaro	790	94	5	22	3	3	2	68	10	127	10	34	5	86	3	97	3	36	2	[106]	8	154	11	99	8	926	70	—	—	—
Rempeggio	755	60	6	52	6	2	—	86	6	212	13	113	8	58	6	157	8	5	1	107	7	168	9	69	7	1089	77	—	—	—
Cerreto Rossi	700	59	5	30	3	—	—	48	6	113	11	109	8	31	4	170	3	8	2	43	7	191	10	107	10	969	69	1158	—	189
Rigoso	700	115	7	20	5	12	2	66	10	114	13	52	7	30	4	89	4	—	—	64	10	147	14	76	7	785	83	1263	—	478
Cassano	379	89	5	41	4	8	1	47	6	52	9	34	4	20	3	120	5	8	1	57	10	124	13	65	4	665	65	1054	—	389
Bettola	309	73	4	42	3	12	1	101	7	182	11	126	5	46	3	150	6	26	2	138	7	162	7	74	5	1132	61	1140	—	8
Villò	200	77	4	41	3	—	—	45	7	39	8	32	3	21	3	73	3	—	—	40	6	114	10	43	5	535	52	—	—	—
Chiavenna																														
Obolo	901	97	7	20	2	5	1	53	7	129	8	42	3	28	3	79	3	—	—	69	7	118	10	73	5	713	56	—	—	—
Padri di Bettola	556	[86]	6	[24]	3	2	2	42	5	89	12	42	4	18	3	81	4	25	1	61	9	116	15	87	10	673	74	—	—	—
Castellana	434	79	5	32	4	2	1	30	4	69	8	31	3	16	3	62	4	37	1	60	7	130	11	79	7	627	58	1019	—	392
S. Maria del Rivo	393	49	2	34	3	—	—	35	3	51	3	31	2	20	3	61	3	—	—	26	3	145	8	69	4	521	34	940	—	419

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	mm.	
S. Giorgio Piacentino . . .	104	53	6	15	2	7	2	37	4	50	10	36	4	18	3	72	5	1	1	49	7	92	10	64	7	494	61	—	—	—
S. Nazzaro . . .	41	49	6	40	4	8	2	43	5	34	5	29	4	22	3	96	6	—	—	82	6	87	9	55	6	545	56	—	—	—
Bacino dell' Arda																														
Pellizzano . . .	1022	151	8	81	3	22	1	85	6	90	13	57	6	38	3	34	3	11	1	88	9	165	12	160	12	982	77	1363	—	—381
Morfasco . . .	650	122	8	34	3	6	3	49	8	113	11	42	5	30	3	71	4	11	2	81	10	125	13	123	9	806	79	1221	—	—415
Vernasca . . .	495	67	4	15	3	—	—	6	2	68	5	60	2	12	1	48	4	20	1	62	6	115	8	60	6	533	42	1013	—	—480
Villa Alberoni . . .	205	112	5	25	4	—	—	36	3	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	3	42	4	107	5	—	—	—	—	—
Fiorenzuola . . .	82	46	6	25	4	—	—	26	5	39	4	8	3	13	3	35	3	—	—	71	7	95	7	34	4	392	46	808	—	—416
Villanova d'Arda . . .	43	78	4	20	2	—	—	64	6	41	5	20	2	18	3	105	5	26	1	76	7	106	11	101	6	655	52	—	—	—
Busseto . . .	40	90	7	21	4	3	1	49	5	47	8	25	4	34	4	114	6	26	2	95	9	111	16	80	9	695	75	—	—	—
Bacino del Taro																														
Taro . . .																														
Centocroci . . .	1023	126	6	19	3	—	—	135	11	170	11	44	5	6	1	50	3	014	3	219	11	200	13	135	6	1118	73	1933	—	—815
Cisa (Roncazzani) . . .	970	65	7	23	6	10	1	169	13	147	15	58	5	8	2	75	5	36	3	196	11	196	21	351	13	1329	102	1990	—	—661
Bratello . . .	924	132	10	48	7	9	1	138	11	172	14	29	4	11	2	67	6	26	2	171	14	140	14	254	11	1197	96	—	—	—
Glariette . . .	900	34	5	16	7	5	1	141	7	132	6	37	5	17	4	179	6	30	5	238	9	216	14	323	9	1368	78	—	—	—
Berceto . . .	800	78	8	22	4	8	1	72	9	115	13	46	5	7	2	64	4	19	2	144	9	137	16	215	7	922	80	1615	—	—693
Porcigatone . . .	800	70	6	23	4	8	1	33	6	56	6	23	2	—	—	61	6	46	3	75	6	69	14	90	9	549	63	1216	—	—667
Strinabecco . . .	800	35	5	47	5	8	1	182	9	211	13	90	10	17	2	135	5	59	6	232	13	176	15	302	11	1489	95	—	—	—
Montegrosso . . .	750	59	7	16	3	—	—	157	7	234	13	40	3	14	3	89	5	23	3	129	8	189	10	184	7	1134	69	1946	—	—812
S. Maria del Taro . . .	744	85	6	18	2	—	—	112	8	275	11	100	9	23	3	114	5	21	2	222	11	201	12	306	8	1477	77	2138	—	—661
S. Maria Valderna . . .	731	124	6	45	4	1	1	107	9	129	12	26	2	13	2	60	5	24	3	127	8	103	13	178	7	937	72	—	—	—
Prelerina . . .	724	70	5	18	4	—	—	19	3	38	5	46	4	—	—	[45]	5	—	—	91	6	25	3	152	7	504	42	1076	—	—572
Valdena (Centrale) . . .	720	89	7	26	4	—	—	149	12	190	16	40	5	11	2	43	5	19	4	148	17	172	20	153	9	1040	101	—	—	—
Tornolo . . .	620	103	5	11	1	—	—	143	10	225	11	117	4	—	—	108	4	40	2	197	12	117	13	149	11	1210	73	—	—	—
Boschi di Bardone . . .	608	68	7	17	5	2	1	63	6	59	8	37	4	12	2	47	5	11	1	61	9	141	16	108	9	626	73	1112	—	—486
Baselica . . .	600	84	5	32	4	—	—	53	3	83	3	40	2	16	2	88	2	4	1	53	2	104	3	138	6	695	33	1357	—	—662

(Segue) Tab. II. — Totali mensili e annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	mm.	
Casale di Parma	600	105	5	11	1	—	—	162	11	217	15	44	5	48	4	86	4	14	4	150	11	142	13	276	10	1255	83	*	—	
Careno	581	121	8	25	4	8	3	58	6	52	10	30	4	22	3	72	7	16	4	87	10	106	14	135	11	732	84	1083	— 351	
Albareto	550	43	5	[32]	4	—	—	105	4	117	3	41	2	28	1	51	2	—	—	105	3	147	5	123	9	787	38	*	—	
Bedonia	544	90	7	23	4	—	—	72	10	142	11	74	4	7	2	45	5	18	4	114	10	94	10	168	8	847	75	1456	— 610	
Selva del Bocchetto	539	126	8	35	3	10	1	52	5	52	6	40	5	13	1	48	4	—	—	79	10	129	14	145	9	729	66	1153	— 424	
Bergotto	500	91	8	23	6	1	1	141	11	138	15	48	6	10	2	64	5	23	3	149	8	122	15	349	11	1160	91	*	—	
Borgotaro	411	72	5	62	5	—	—	94	6	83	8	39	4	5	2	49	5	30	3	95	7	132	7	106	4	767	56	996	— 229	
Neviano Rossi	401	48	3	17	3	6	2	79	6	56	8	15	2	10	2	63	5	21	2	62	9	132	14	69	9	578	65	1071	— 493	
S. Lucia	400	72	4	30	3	—	—	79	5	59	8	30	4	9	2	71	4	49	1	99	6	145	9	87	5	730	51	931	— 201	
S. Vittore	360	111	4	24	3	8	1	58	4	68	9	29	5	14	2	77	5	34	3	73	5	125	13	102	8	723	61	*	—	
Orlano	260	126	8	22	4	2	1	79	9	60	10	29	5	13	3	39	3	—	—	57	6	119	12	71	8	617	66	*	—	
Salsomaggiore	160	121	6	50	4	4	1	74	5	32	10	19	4	6	3	44	7	14	1	38	9	101	13	63	6	566	69	1187	— 621	
Gavazzoli di Noceto	95	101	7	25	5	—	—	61	6	49	8	13	4	27	2	39	6	7	2	81	9	110	15	67	11	580	75	*	—	
Fontanellato	50	124	8	29	4	10	1	54	5	33	9	63	6	16	3	86	7	29	2	101	8	102	11	71	7	712	71	*	—	
Roccabianca	32	106	7	22	5	1	1	61	9	70	10	49	4	21	3	41	4	11	3	83	12	119	18	85	9	669	85	*	—	
Ceno (Sinistra di Taro)																														
Cornolo	950	117	7	59	4	—	—	158	10	194	12	143	9	30	4	114	7	40	2	158	9	147	15	192	10	1352	89	*	—	
Casalporino	915	122	6	29	4	16	2	103	8	192	13	135	8	32	5	91	6	35	6	178	14	167	18	194	13	1294	103	1705	— 411	
Spora	900	113	5	27	2	—	—	62	7	134	7	15	4	30	2	101	6	6	2	187	7	143	8	214	6	1052	56	*	—	
Nocivaglia	900	162	7	53	5	1	1	128	12	187	15	54	9	42	4	71	5	60	5	164	13	200	18	170	11	1292	105	1570	— 278	
Bore di Metti	800	106	7	17	3	4	1	57	5	60	7	33	5	23	2	48	3	8	1	86	7	136	9	126	8	704	60	1264	— 560	
Cereseto	760	123	7	48	6	3	2	118	10	121	16	39	8	17	3	60	7	16	3	117	12	190	21	162	13	1014	108	1282	— 268	
Pione	673	104	9	39	4	—	—	50	6	102	16	80	6	27	3	74	5	34	2	111	10	113	14	181	10	1005	85	1449	— 444	
Bardi	625	[102]	8	15	5	—	—	47	6	100	15	81	9	31	3	33	4	6	1	53	9	118	13	111	10	697	83	1088	— 391	
Varsi	412	113	3	26	5	6	1	61	8	59	7	8	3	—	—	29	4	10	4	59	8	225	15	68	4	663	62	1281	— 618	
Vianino	300	105	4	40	3	6	1	76	6	94	10	15	4	5	3	45	5	9	2	26	5	164	22	115	7	700	72	993	— 293	
Varano Melegari	190	[102]	4	27	3	10	1	81	4	47	3	25	1	25	1	46	3	—	—	224	8	127	13	116	8	832	51	1024	— 192	

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	mm.	Giorni	mm.	mm.	Giorni	mm.		
Bacino del Parma																														
Parma																														
Lago Santo (1)	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1041	—	2335	—1294	
Muslaro Superiore	1050	81	5	32	3	16	1	90	8	77	10	53	6	7	2	169	5	55	3	131	7	182	9	89	6	982	65	1409	—427	
Ballone	823	81	6	15	3	—	—	24	6	102	10	32	4	9	3	47	4	11	1	80	9	72	11	48	7	521	64	1160	—639	
Tizzano	795	105	7	28	3	6	1	44	9	52	6	[40]	5	23	3	68	6	8	1	81	10	112	13	66	8	633	72	1070	—437	
Marra Bacino	776	99	8	26	4	6	1	147	11	122	13	56	6	—	—	79	7	36	3	146	7	116	18	167	10	1000	88	*	—	
Moragnano	750	100	6	[24]	4	[7]	2	31	4	230	9	40	4	3	1	40	2	15	1	120	7	175	8	45	3	830	51	834	—	
Bosco di Corniglio	742	113	8	46	6	—	—	241	8	250	10	50	4	8	2	78	6	36	4	286	13	326	12	226	9	1660	82	1982	—322	
Bosco di Corniglio (Centrale)	730	88	7	20	5	2	1	139	13	90	15	20	6	9	3	45	6	12	4	172	13	144	17	177	10	918	100	*	—	
Cozzano	730	96	6	32	5	—	—	63	8	65	7	12	1	19	2	29	3	8	1	98	9	248	14	79	8	649	64	*	—	
Petrignacola	630	121	5	33	2	—	—	100	3	98	6	43	3	—	—	75	5	22	1	97	9	185	12	67	4	841	50	*	—	
Antreola	600	116	8	33	7	6	1	77	6	77	6	27	3	21	2	71	6	15	3	108	7	206	14	110	10	867	73	940	—73	
Antesica	450	92	8	71	8	3	1	72	7	78	9	6	3	14	3	81	5	15	1	92	8	140	13	62	7	726	73	1098	—372	
Pannocchia	175	57	7	24	4	—	—	41	3	100	6	30	3	19	3	54	5	7	2	65	9	87	8	55	8	539	58	817	—278	
Parma	52	107	8	17	4	1	1	76	7	57	9	18	4	16	3	60	5	1	1	51	9	119	14	65	8	588	73	883	—295	
Colorno	26	45	3	[15]	4	—	—	46	6	51	5	15	1	36	3	56	6	12	1	162	11	86	14	58	8	582	62	*	—	
Baganza (Sinistra di Parma)																														
Casaselvatica	850	79	7	25	4	—	—	41	9	85	14	71	6	3	1	48	6	3	1	110	5	141	12	146	8	732	73	1187	—435	
Cassio	813	111	7	18	5	11	3	68	6	73	9	57	7	9	3	43	4	13	2	80	8	154	16	130	9	767	79	1158	—391	
Vellerano	513	101	7	54	8	—	—	97	9	118	10	14	3	14	3	112	7	31	3	81	9	189	13	88	8	899	80	1132	—233	
Calestano	417	99	5	31	2	—	—	57	4	128	7	66	5	—	—	[116]	7	—	—	94	5	124	9	114	7	829	51	1150	—321	
S. Michele del Gatti	240	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40	2	25	1	83	8	55	5	40	2	*	*	*	*	—
S. Martino Sinzano	127	49	4	40	3	—	—	34	3	47	4	10	1	10	1	29	4	4	1	41	5	106	16	47	6	417	48	770	—353	
Bacino dell'Enza																														
Enza																														
Lagastrello	1200	146	12	36	7	2	1	200	15	170	15	166	11	30	7	118	7	196	7	361	16	362	24	319	19	2106	141	2556	—450	

(1) Totalizzatore a lettura annuale.

(Segue) Tab. II. - Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Rigoso	1131	145	4	49	3	—	—	256	9	248	12	102	8	6	2	151	7	190	2	370	10	291	17	397	12	2205	86	2695	—	490
Succiso	911	141	7	30	5	1	1	191	11	348	13	142	4	12	2	106	6	77	4	279	9	161	11	288	9	1776	82	1611	+	165
Ramiseto	850	127	7	23	5	9	1	112	10	86	7	62	8	14	3	73	8	54	2	133	11	188	18	109	11	990	91	1275	—	285
Storlo	845	146	8	30	4	—	—	193	8	172	14	[86]	8	2	1	52	7	43	4	222	14	270	17	123	10	1339	95	1630	—	291
Legugno	643	115	3	34	3	—	—	51	3	50	2	34	2	—	—	102	6	27	2	81	2	183	5	61	6	738	34	1033	—	295
Campora di Sasso	620	45	3	27	2	—	—	[50]	3	134	8	36	3	14	2	72	4	9	1	137	12	162	16	53	5	739	59	1202	—	463
Vedriano	580	136	8	30	5	—	—	68	7	72	7	38	5	8	4	112	7	10	1	65	5	150	11	61	8	750	68	923	—	173
Ranzano	540	100	6	42	3	10	2	28	6	115	6	50	3	16	2	37	6	16	2	111	8	127	12	105	8	757	64	1075	—	318
Neviano Arquini	422	104	5	70	3	37	1	86	3	152	4	54	3	22	2	75	5	15	1	65	3	257	8	75	4	1012	42	929	+	83
Vetto	330	*	*	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	9	1	38	4	22	1	*	*	125	4	*	*	*	*	956	—	—
Cazzola	296	101	7	16	5	7	1	60	8	70	8	46	4	16	1	46	6	5	2	56	8	120	15	52	10	595	75	847	—	253
Marano	112	25	4	40	5	—	—	27	6	66	7	21	4	46	3	44	2	5	1	35	7	143	16	90	7	542	62	994	—	452
Montecchio	98	84	8	18	5	—	—	58	8	40	8	26	4	16	2	27	5	5	2	49	10	77	13	44	7	444	72	654	—	210
S. Ilario	64	93	8	12	4	7	1	56	6	48	7	24	4	42	3	42	6	4	1	55	9	111	12	58	8	552	69	753	—	201
Cedra (Sinistra di Enza)																														
Rimagna	1001	114	7	40	3	5	1	216	13	252	12	97	6	6	1	167	6	115	4	351	10	266	16	367	10	1995	89	2391	—	306
Selvanizza	600	53	7	19	7	—	—	80	9	81	11	51	7	16	2	69	7	59	4	128	10	137	11	60	7	753	82	*	—	—
Isola di Palanzano	575	64	8	10	5	18	11	62	13	57	14	41	17	4	3	22	7	39	7	151	14	121	17	77	12	673	128	*	—	—
Racino del Crostolo																														
Canossa	530	91	7	46	5	—	—	31	9	111	9	29	5	21	3	79	5	16	2	121	10	248	13	113	11	906	79	1439	—	533
Casina (Cantoniera)	500	99	8	34	5	6	1	83	5	35	7	30	3	13	2	89	6	20	3	74	10	190	15	68	10	741	75	1080	—	339
Regnano	415	125	4	60	4	3	1	55	3	46	7	2	1	15	1	40	2	[14]	3	105	13	31	6	33	4	529	49	1055	—	526
Roncolo	275	114	6	28	5	10	1	78	4	78	6	34	4	33	2	43	7	9	1	68	9	146	12	57	8	698	65	*	—	—
Boschi di Vezzano	200	109	8	34	7	6	1	62	5	78	6	14	3	22	2	40	6	12	3	64	10	158	15	48	8	647	74	961	—	314
Reggio Emilia	60	95	6	35	4	—	—	62	4	65	8	23	4	2	1	17	6	8	1	62	1	132	8	44	5	545	54	732	—	187

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.	Giorni	mm.		
Bacino della Secchia																														
Secchia																														
Valico Cerreto	1200	84	8	65	5	23	2	146	11	137	10	99	8	25	3	81	6	102	7	335	13	264	15	219	13	1580	101	2746	—1166	
Sparavalle	970	65	7	43	5	—	—	94	11	86	11	74	6	17	3	110	8	37	4	156	13	234	19	82	12	998	99	1460	—462	
Bismantova	830	74	5	25	4	14	1	57	8	66	9	50	8	10	3	73	6	29	3	98	10	151	13	25	7	672	77	1152	—480	
Sologno	803	67	5	13	3	—	—	22	3	37	5	28	4	3	1	97	5	32	2	128	7	124	7	53	7	604	49	1034	—430	
Valestra	800	130	9	36	7	20	4	60	7	97	10	20	2	12	2	69	6	33	3	80	9	184	18	52	11	793	88	1040	—247	
Collagna	800	131	6	50	3	—	—	104	7	114	7	59	5	—	—	63	8	64	3	221	7	160	11	195	7	1161	64	1836	—675	
Carpiuetti	780	109	7	51	7	—	—	78	5	96	10	27	3	9	2	95	7	52	2	101	5	235	10	54	9	907	67	1062	—155	
Castelnuovo Monti	730	120	6	33	4	—	—	89	6	80	6	81	4	11	1	103	5	33	4	157	8	246	11	80	6	1033	61	1142	—109	
Baiso	542	90	6	89	5	—	—	57	3	138	8	45	4	13	2	89	6	69	3	96	7	190	11	59	9	935	64	985	—50	
Salcava	530	123	9	35	8	1	1	80	10	92	12	60	7	20	3	145	8	35	5	100	10	193	20	49	9	933	102	1135	—202	
Montebaranzone	500	93	7	32	7	11	1	60	3	47	7	23	2	9	2	43	7	13	1	75	10	199	11	57	12	662	70	976	—314	
Cavola di Toano	487	123	6	45	5	—	—	49	3	51	5	16	4	13	2	109	5	10	2	97	8	183	11	43	7	739	58	946	—207	
Levizzano	189	153	9	59	5	5	1	82	6	46	8	25	3	7	2	39	7	27	3	[72]	7	183	13	51	11	749	75	1183	—434	
Sassuolo	121	95	5	39	6	1	1	55	3	47	6	5	3	2	1	19	5	17	4	55	11	169	13	42	9	546	67	1098	—552	
Bastiglia	21	129	7	37	3	[4]	2	41	3	52	5	36	3	7	2	32	3	[24]	4	62	9	175	14	38	7	637	63	*	—	
Ozola (Destra di Secchia)																														
Praderena (1)	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Colle Belfiore (1)	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—
Ospedaletto	1100	144	7	35	4	—	—	225	9	177	12	70	5	5	1	85	7	61	6	192	13	263	9	301	13	1558	86	2452	—894	
Ligonchio	928	116	8	55	5	2	1	130	12	105	18	64	9	3	1	85	8	69	5	229	10	162	15	181	12	1201	104	1809	—608	
Presa d'Ozola	920	127	10	44	6	2	2	163	16	154	18	147	7	12	3	83	9	112	6	300	13	264	18	253	17	1661	125	*	—	—
Piolo	773	95	6	30	3	7	1	88	9	87	14	35	5	—	—	74	6	[62]	4	186	10	208	15	130	9	1002	82	1804	—802	
Cinquecerri	697	104	8	63	6	—	—	115	11	73	14	29	3	—	—	65	5	40	3	176	8	144	15	144	12	953	85	1393	—440	
Secchiello (Destra di Secchia)																														
Castione d'Asta	920	124	9	42	6	6	2	126	11	105	17	124	8	43	3	98	9	91	6	234	12	244	20	173	12	1410	115	1810	—400	

(1) Totalizzatore a lettura annuale.

(Segue) Tab. II. — Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, media di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Quara	720	99	7	40	4	7	1	45	4	44	4	39	6	7	3	37	5	25	2	185	8	118	8	32	5	678	57	1017	—	339
Razzolo	610	163	9	43	7	7	4	94	10	83	11	93	4	28	4	170	8	79	3	144	12	216	20	101	15	1231	107	1450	—	229
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																														
Radici	1520	136	8	111	9	47	3	209	15	63	7	196	9	39	5	57	4	32	4	292	10	424	18	217	12	1823	104	2292	—	469
Piandelagotti	1209	101	8	53	4	8	2	186	10	109	10	59	6	12	4	76	7	46	3	291	11	272	15	109	7	1322	87	2094	—	772
Frassinero	1097	114	9	48	6	16	2	81	12	90	14	80	6	21	4	84	9	31	4	152	11	166	15	113	10	986	102	1483	—	497
Civago	1024	108	11	52	6	[4#]	2	210	16	171	16	56	4	59	6	84	9	52	4	273	14	334	18	135	8	1548	114	1974	—	426
Toano	944	112	6	37	3	10	1	79	3	64	5	26	2	8	1	96	7	11	1	125	6	165	7	77	7	810	49	1066	—	256
Montefiorino	797	66	5	78	7	—	—	45	7	98	10	56	5	—	—	98	6	86	5	86	7	125	11	48	5	736	68	947	—	211
Ceredolo	300	53	6	38	5	2	1	46	4	74	10	22	3	2	2	64	5	6	1	93	8	162	12	67	6	629	63	961	—	332
Rossenna (Destra di Secchia)																														
Lama Mocogno	812	115	7	57	8	5	1	72	8	61	8	32	4	34	3	79	8	38	3	85	9	159	14	64	8	801	81	1044	—	243
Pollnago	810	126	10	89	6	—	—	69	3	68	12	25	5	7	1	116	10	64	5	68	8	179	13	45	6	856	79	1145	—	289
Pavullo	682	75	10	50	6	2	2	58	7	79	4	10	3	7	3	78	7	42	4	68	6	163	12	59	7	692	71	1057	—	365
Prignano	497	98	3	26	4	15	1	60	3	43	5	43	3	4	1	52	3	30	2	54	4	178	5	56	6	659	40	948	—	289
Gombola	450	81	9	41	5	10	1	55	4	54	8	20	2	8	2	132	7	31	3	68	7	174	9	40	8	714	65	960	—	246
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																														
Marola	717	110	3	40	1	15	1	80	3	77	3	43	2	18	2	40	5	15	3	41	3	82	9	29	7	585	48	959	—	374
S. Valentino	300	104	8	34	6	—	—	36	2	62	5	8	3	6	1	19	3	23	2	64	7	157	7	34	6	547	50	913	—	366
Viano	272	108	5	35	2	—	—	88	4	69	5	35	4	8	1	38	3	26	2	67	3	160	9	34	3	668	41	1053	—	385
Ca' de' Caroli	168	101	5	26	3	—	—	77	4	65	9	19	3	5	1	16	3	19	3	46	7	131	8	40	6	545	52	924	—	379
Bagno	54	104	5	35	1	11	1	74	4	129	6	31	2	5	3	25	5	13	3	40	9	139	12	53	7	659	57	876	—	217
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																														
Campegine	34	55	7	[34]	4	8	1	52	6	32	5	25	5	7	1	13	3	13	2	43	9	90	12	38	6	410	61	662	—	252
Ponte Alto	26	70	6	38	3	—	—	35	7	40	6	17	1	26	3	19	4	—	—	42	7	101	9	45	7	433	53	673	—	240
S. Vittoria	22	71	7	69	4	2	2	49	8	66	10	26	6	13	3	56	6	8	1	89	7	182	16	54	7	651	77	633	—	18
Torrione	22	63	7	44	4	1	1	56	7	37	7	33	4	25	3	37	6	2	2	69	9	138	13	45	9	550	72	673	—	123

(Segue) Tab. II. - Totali mensili ed annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Gualtieri	22	71	7	47	4	8	2	44	7	33	7	26	4	34	2	34	5	31	5	66	9	142	13	52	8	583	73	487	+	94
Boretto	20	48	9	42	4	4	1	44	7	49	5	23	6	20	2	47	5	6	2	66	9	139	12	49	7	537	69	641	-	104
Capanna	20	59	6	38	4	2	2	55	7	45	7	22	5	16	2	33	6	11	4	72	9	128	13	46	8	527	73	717	-	190
Bonifica in destra di Parmigiana - Moglia (Sinistra di Secchia)																														
Correggio	48	124	7	29	4	2	1	68	7	131	8	56	3	5	3	51	2	7	2	50	9	106	13	48	9	727	68	800	-	73
Campogalliano	43	79	6	72	4	8	4	10	1	59	5	20	2	20	1	10	2	-	-	66	5	126	6	35	3	505	39	687	-	182
S. Martino in Rio	36	66	6	42	5	-	-	57	4	97	8	19	3	12	3	29	6	6	1	70	10	133	11	40	4	571	61	777	-	206
Bagnolo in Piano	32	101	4	97	6	1	1	60	5	47	7	15	3	16	4	21	4	7	2	[74]	10	164	15	40	7	643	68	795	-	152
Carpi	28	75	7	37	3	8	1	49	3	42	2	36	2	8	1	41	5	6	2	53	9	106	10	34	6	485	51	618	-	133
Ponticelli di Carpi	25	115	8	27	4	4	1	44	4	37	5	19	2	30	2	53	4	2	1	49	8	166	15	35	6	581	60	*	-	-
Novellara	24	96	8	18	4	4	2	61	5	85	8	23	4	14	3	37	5	-	-	79	10	151	15	48	8	616	72	*	-	-
Campagnola	23	100	8	28	4	5	1	83	8	76	8	13	2	18	4	33	4	-	-	72	10	163	17	47	7	638	73	*	-	-
Ponte Rosso	22	111	7	22	4	-	-	59	7	61	10	44	5	40	3	29	4	31	3	62	8	158	16	37	8	644	75	*	-	-
Ponte Testa	21	84	7	19	5	-	-	58	7	66	8	32	3	39	3	39	6	8	2	72	9	165	13	50	8	627	71	*	-	-
Ponte Pietra	21	122	8	24	4	-	-	[54]	7	64	9	29	3	66	3	41	3	56	3	57	7	165	13	36	6	714	66	*	-	-
Mondine	19	84	7	15	3	2	2	52	8	45	9	24	4	15	4	31	6	26	2	55	10	113	14	47	9	509	78	*	-	-
S. Siro	18	[74]	7	62	2	2	1	43	7	55	8	12	2	10	3	46	5	1	1	56	9	120	14	38	3	519	62	*	-	-
Botte S. Prospero	18	89	7	10	3	4	1	52	6	55	7	22	4	14	2	25	6	60	1	61	9	120	12	45	7	557	65	*	-	-
Bacino del Panaro Scotenna																														
Monte Cimone (1)	2163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2579	-	-	-	-
Cervarola (1)	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1638	-	-	-	-
Boscolungo	1340	345	10	71	5	-	-	169	11	126	8	64	7	106	8	56	8	137	5	311	16	242	22	256	8	1883	108	2109	-	226
Barigazzo	1224	230	9	100	9	32	3	41	8	74	15	15	7	17	3	32	8	34	5	145	11	255	17	134	11	1109	106	1256	-	147
Tagliole	1150	105	9	38	4	20	1	187	9	144	6	63	4	46	5	45	7	81	3	341	9	248	14	250	14	1370	85	2110	-	540
Sestola	1086	141	7	55	5	7	3	84	13	50	9	24	5	26	5	79	7	61	5	116	9	126	19	106	11	875	98	1331	-	456

(1) Totalizzatore a lettura annuale.

(Segue) Tab. II. — Totali mensili e annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
S. Anna Pelago	1069	107	8	61	7	1	1	179	11	148	8	52	6	46	7	76	9	91	4	290	11	225	18	185	12	1461	102	*	—	
Fiumalbo	943	127	7	58	5	1	1	112	5	96	2	[50]	6	13	3	40	7	39	3	202	11	[203]	9	132	7	1073	73	1244	— 171	
Montecreto	868	112	9	52	8	1	1	53	12	172	10	63	7	18	3	62	7	50	4	100	15	199	19	45	9	927	104	1332	— 405	
Galato	800	[106]	8	[50]	7	—	—	61	5	53	7	37	5	9	2	56	5	21	4	47	8	129	13	24	5	593	69	1087	— 494	
Pievepelago	766	121	7	95	4	—	—	[150]	6	114	7	130	5	102	5	92	4	76	2	280	7	165	5	155	5	1480	57	1552	— 72	
Strettara	570	[108]	7	30	7	1	1	28	8	44	9	47	6	39	5	54	10	28	3	73	11	121	13	41	7	614	87	*	—	
Leo																													*	—
Madonna dell'Acero	1180	114	8	77	5	37	4	248	9	322	9	104	8	58	3	225	5	184	6	542	16	560	14	400	10	2871	97	*	—	
Ospitale Fanano	936	153	9	85	6	26	4	173	15	134	10	54	7	33	6	102	10	83	7	290	16	394	20	233	13	1760	123	2408	— 648	
Fellicarolo	935	156	5	60	5	33	2	112	9	156	10	27	6	39	4	112	9	76	4	189	9	221	12	139	8	1320	83	2214	— 894	
Fanano	640	112	12	61	5	3	1	89	14	69	9	28	6	34	3	117	8	23	2	138	11	221	18	130	12	1025	101	*	—	
Rocca Corneta	604	101	8	71	6	20	2	55	3	52	5	85	2	16	1	74	6	8	1	117	8	228	14	61	6	883	62	1507	— 624	
Panaro																														—
Montese	841	85	4	70	4	4	1	54	8	79	5	54	3	2	1	54	5	36	2	88	8	209	11	77	8	812	60	979	— 167	
Ligornano	737	42	2	49	4	—	—	33	2	30	1	15	2	10	1	34	3	38	2	52	4	179	7	21	2	503	30	848	— 345	
Montombraro	729	91	8	41	5	5	1	87	8	66	8	47	3	12	2	45	5	7	4	81	12	161	10	45	9	688	75	879	— 191	
Rosola	690	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49	3	—	—	32	2	16	3	76	9	205	10	53	8	*	*	*	—	—
Verica	580	121	8	47	4	5	2	127	4	56	4	58	3	2	1	20	1	5	1	64	6	113	6	[44]	7	662	47	*	—	
Coscogno	536	61	6	34	5	1	1	49	3	89	7	21	2	16	1	55	1	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—
Guiglia	483	65	6	57	4	—	—	33	3	55	6	34	4	23	4	15	5	50	3	27	7	142	12	42	6	543	57	850	— 307	
S. Venanzio	281	69	3	38	5	—	—	64	3	56	4	2	1	1	1	50	3	15	1	54	5	87	7	57	4	493	37	700	— 207	
Savignano	194	106	2	68	5	7	2	82	3	65	10	44	4	12	2	25	5	48	3	52	8	215	12	58	10	782	66	*	—	
Vignola	125	89	8	41	6	11	3	78	6	50	7	41	4	2	1	18	3	38	3	45	9	162	12	44	9	619	71	*	—	
Spilamberto	70	145	6	84	6	—	—	36	4	101	3	45	5	10	1	43	4	8	2	31	4	166	9	57	8	726	52	683	+ 43	
Modena	35	82	6	34	6	—	—	30	4	61	6	23	3	16	2	24	3	9	2	41	7	138	8	25	5	483	52	602	— 119	
Nonantola	24	91	5	25	4	—	—	50	4	85	5	55	3	10	2	35	3	20	2	60	5	185	8	50	3	666	44	738	— 72	
S. Felice	19	[86]	5	15	4	—	—	[42]	5	[74]	6	14	2	5	1	57	3	—	—	70	4	191	8	17	3	571	41	518	+ 53	

(Segue) Tab. II. — Totali mensili e annui delle precipitazioni, numero dei giorni piovosi, medie di quattordici anni dei totali annui e scostamenti dalla media.

STAZIONI	Altezza sul mare	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Totale annuo		Media di 14 anni dei totali annui		Scosta- mento dalla media
		mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Finale	15	74	9	13	5	4	2	32	5	52	6	15	3	36	2	18	2	2	1	44	8	110	12	34	8	434	63	645	—	211
Bondeno	11	43	6	33	6	—	—	39	9	89	6	5	2	14	1	25	3	15	3	55	9	84	9	43	6	445	60	644	—	199
Racino scalande in Po																														
fra Crostolo - Serchia - Panaro																														
Bonifica Agro Mantovano - Reggiano																														
Botte Sotto Secchia	29	87	7	23	3	1	1	48	7	65	11	16	3	10	2	42	4	13	2	66	10	120	13	58	7	549	70	717	—	168
Guastalla	25	47	7	[26]	3	[8]	2	65	6	38	9	38	3	55	4	39	6	—	—	68	8	155	10	56	6	590	64	690	—	100
Due Ponti	23	103	7	33	6	7	2	64	9	108	11	54	5	28	3	69	10	11	3	104	11	223	15	53	7	857	89	1004	—	147
Pegognaga	22	40	4	26	4	—	—	53	5	80	9	53	5	9	1	20	2	9	1	81	6	185	12	65	8	621	57	599	+	22
Reggiolo	20	85	3	17	4	—	—	67	8	68	8	58	3	28	3	33	2	15	2	79	7	185	12	47	7	682	59	776	—	94
Suzzara	20	54	6	[21]	4	3	1	[54]	7	42	8	24	2	30	2	30	4	1	1	63	5	136	11	55	5	513	56	799	—	286
Quistello	17	67	6	56	3	—	—	75	8	87	8	28	3	15	2	75	4	27	2	92	6	172	13	51	8	745	63	807	—	62
Moglia	12	76	8	27	5	—	—	32	4	58	6	14	3	23	2	43	2	25	1	30	5	99	10	35	4	462	50	675	—	213
Sermide	12	79	8	37	4	—	—	56	9	84	11	18	7	28	1	45	2	53	2	41	8	99	12	44	7	584	71	760	—	177
Fuori Racino																														
Destra di Po																														
(Po di Volano)																														
Cavezzo	24	103	6	34	2	2	1	46	4	34	6	34	4	8	2	43	5	3	3	58	11	131	13	36	9	532	66	740	—	208
Concordia	22	90	6	33	5	2	1	53	6	21	3	36	3	14	2	30	1	29	1	60	6	112	7	58	5	538	46	726	—	188
Stellata	16	43	5	16	3	—	—	35	7	60	5	7	4	14	2	13	2	—	—	36	9	84	10	40	6	348	53	636	—	288
S. Martino in Spino	10	41	6	38	2	—	—	10	3	17	6	3	1	2	1	[10]	2	2	1	17	5	21	6	9	3	170	36	635	—	465
Sinistra di Po																														
Casteldario	23	63	7	34	5	—	—	65	8	116	14	24	6	12	5	11	3	—	—	40	6	112	15	48	7	525	76	767	—	212
Ostiglia	13	57	7	7	2	—	—	36	5	67	7	16	5	18	2	13	2	17	2	45	6	92	11	46	9	414	58	618	—	204
Ficarolo	10	63	8	22	5	—	—	44	6	83	6	6	1	14	1	6	2	—	—	44	10	96	14	40	9	418	62	725	—	307

Tab. III.

Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

MESI	Colle Penice (Tidone)						Rondanina (Trebbia)						Cerrignate (Trebbia)						Bobbio (Trebbia)						S. Lazzaro (Trebbia)							
	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.		
Gennaio	7	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—
Febbraio	3	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	
Marzo	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
Aprile	2	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
Maggio	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	2	—	8	2	—	—	—	—	
Giugno	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	
Luglio	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Agosto	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Settembre	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ottobre	—	—	—	—	—	—	11	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	—	4	9	1	—	—	—	
Novembre	2	—	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	6	10	2	1	—	—	
Dicembre	4	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	7	6	3	—	—	—	
TOTALI	19	16	8	3	1	1	4	75	22	3	5	3	10	26	17	6	2	—	3	36	11	4	2	1	1	26	58	13	2	—	—	
MESI	Barbagelata (Avevo)						Cabanne (Avevo)						Selva Ferriere (Nure)						Bettola (Nure)						Castellana (Chiavenna)							
	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.		
Gennaio	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—
Febbraio	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	
Marzo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Aprile	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maggio	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Giugno	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luglio	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agosto	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Settembre	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ottobre	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Novembre	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre	6	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALI	24	27	14	13	7	1	4	56	24	4	5	6	12	28	30	7	2	2	3	20	18	15	4	3	1	12	31	19	5	3	—	

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

MESI	Murlara Superiore (Parma)												Bosco di Corniglio (Parma)												Antesica (Parma)												Parma (Parma)												Cassio (Baganزا)											
	infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.																					
	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.																		
Gennaio	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Febbraio	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Marzo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Aprile	—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Maggio	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Giugno	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Luglio	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Agosto	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Settembre	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
Ottobre	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
Novembre	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
Dicembre	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
TOTALI	—	33	16	9	4	1	1	5	—	20	29	16	6	4	5	—	53	5	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
MESI	S. Martino Sinzano (Baganزا)												Rigoso (Enza)												Sterlo (Enza)												Cazzola (Enza)												Rimagna (Cedra)											
	infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.		infer.		da 10 a 101 mm.		da 201 a 301 mm.		da 401 a 501 mm.		oltre 501 mm.																					
	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.	ad 1	mm.																
Gennaio	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Febbraio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Marzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Aprile	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Maggio	—	2	2	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Giugno	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Luglio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Agosto	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Settembre	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Ottobre	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Novembre	—	15	1	—	—	—	—	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
Dicembre	—	5	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
TOTALI	—	38	9	1	—	—	—	13	—	28	21	17	2	5	13	—	53	5	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

M E S I	Canossa (Crostolo)					Regnano (Crostolo)					Reggio Emilia (Crostolo)					Valico Cerreto (Secchia)					Castelnuovomonti (Secchia)						
	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	da oltre 50 mm.	
Gennaio	—	3	4	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	—	3	2	—	—	—	1	2	1	—	—	1	3	1	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	6	1	2	—	—	2	—	—	1	—	3	2	1	—	—	—	7	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Maggio	—	7	—	—	1	—	6	1	—	—	—	2	5	1	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Giugno	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Luglio	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	4	4	1	—	—	—	—	—	—
Ottobre	—	7	2	—	—	—	9	4	—	—	—	2	5	1	—	—	—	4	6	4	1	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	8	1	1	—	—	5	1	—	—	—	5	4	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Dicembre	—	7	3	—	—	—	4	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—
TOTALI	—	52	15	4	3	2	3	—	—	—	—	23	35	10	6	3	—	43	30	20	5	2	2	—	—	—	—
M E S I	Cavola di Toano (Secchia)					Sassuolo (Secchia)					Polo (Ozola)					Razzolo (Secchiello)					Radici (Dragone)						
	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 10 a 20 mm.	da 20,1 a 30 mm.	da 30,1 a 40 mm.	da 40,1 a 50 mm.	da oltre 50 mm.	
Gennaio	—	3	1	1	—	—	3	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—	—
Febbraio	—	3	2	—	—	—	6	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aprile	—	1	2	—	—	—	2	—	—	1	—	6	2	1	—	—	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Maggio	—	4	—	1	—	—	5	—	—	—	—	12	2	—	—	—	—	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Giugno	—	4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	1	1	2	—	5	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ottobre	—	5	1	2	—	—	11	—	—	—	—	4	2	2	1	—	—	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	4	3	—	—	—	7	2	3	1	—	11	1	—	—	—	—	14	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	—	7	—	—	—	—	8	1	—	—	—	5	1	2	1	—	—	11	3	1	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	—	35	11	7	4	—	56	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	72	19	8	—	3	6	—	—	—	—

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

[illegible]

(Segue) Tab. III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

MESI	Montese (Panaro)							Coscogno (Panaro)							Modena (Panaro)							Concordia (Canale di Burana)							Ficarolo (Tartaro)						
	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.							
Gennaio	—	3	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Febbraio	—	2	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Marzo	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Aprile	—	6	2	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
Maggio	—	2	2	—	1	—	—	1	4	1	2	—	—	—	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Giugno	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Luglio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Agosto	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Settembre	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Ottobre	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Novembre	—	3	3	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	6	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Dicembre	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALI	—	34	14	5	5	1	1	—	30	37	7	6	2	—	—	27	11	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
MESI	Torlone (Bonifica Bentivoglio)							Correggio (di Parnigiana-Moglia)							S. Siro (di Parnigiana-Moglia)							Guastalla (Bonifica Agro Mantovano-Reggiano)							Moglia (Bonifica Agro Mantovano-Reggiano)						
	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.	infer. ad 1 mm.	da 1.0 a 10 mm.	da 10.1 a 20 mm.	da 20.1 a 30 mm.	da 30.1 a 40 mm.	da 40.1 a 50 mm.	oltre i 50 mm.							
Gennaio	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Febbraio	1	2	1	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Marzo	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Aprile	—	5	2	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Maggio	—	6	1	—	—	—	—	1	4	—	3	1	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Giugno	—	2	2	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Luglio	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Agosto	—	5	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Settembre	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Ottobre	—	7	1	1	—	—	—	2	8	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Novembre	—	9	3	—	—	—	—	1	7	1	2	3	—	—	1	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Dicembre	—	8	1	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALI	1	54	13	2	—	—	—	1	9	46	5	12	4	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						

Tab. IV. — Durate delle precipitazioni mensili ed annue registrate ai pluviografi.

STAZIONI	ORE DI PRECIPITAZIONE											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Torriglia (Bacino della Scrivia)	22	4	7	78	65	12	4	17	8	65	10	40
Losso (Bacino della Trebbia)	*	23	0	64	55	7	*	*	*	24	94	*
Boschi (Bacino dell'Aveto)	8	10	5	59	68	12	2	21	12	64	71	38
Strinabecco (Bacino del Taro)	22	1	0	70	82	18	1	19	12	92	130	94
S. Maria Valderna (Bacino del Taro)	24	9	0	93	66	2	2	14	8	54	103	64
Bosco di Corniglio (Bacino del Parma)	36	4	1	100	46	14	2	12	4	84	108	72
Marra (Bacino del Parma)	0	0	0	71	27	0	0	2	0	0	83	76
Isola di Palanzano (Bacino dell'Enza - Cedra)	22	1	2	48	68	3	0	12	9	86	69	31
Reggio Emilia (Bacino del Crostolo)	32	21	1	27	2	7	0	0	0	12	40	17
Ligonchio (Bacino del Secchia-Ozola)	9	23	0	61	27	12	2	38	18	91	40	30
Sestola (Bacino dello Scoltenna)	30	2	0	18	19	18	9	22	7	88	96	39
Stretara (Bacino dello Scoltenna)	0	17	0	23	28	10	9	17	11	70	64	25

Tab. V. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi.

STAZIONI	INTERVALLO DI ORE											
	1			3			6			12		
	Inizio			Inizio			Inizio			Inizio		
	mm.	giorno	ora	mm.	giorno	ora	mm.	giorno	ora	mm.	giorno	ora
Torriglia (Bacino Scrivia)	36	24 VI	13.30	59	12 VIII	23'	74	12 VIII	23.20	95	11 VIII	21'
Losso (Bacino Trebbia)	37	23 V	14'	67	23 V	14'	67	23 V	14'	68	2 V	7'
Boschi (Bacino Aveto)	40	8 VIII	1.25	62	8 VIII	1.25	78	8 VIII	22.40	83	8 VIII	18.15
Strinabecco (Bacino Taro)	71	9 VIII	0.35	86	9 VIII	0.35	89	9 VIII	24'	96	9 VIII	17'
S. Maria Valderna (Bacino Taro)	18	2 I	6.35	21	30 XI	2'	42	25 X	17.15	56	3 V	12'
Bosco di Corniglio (Bacino Parma)	20	19 VIII	18.15	25	19 X	8.40	38	26 XII	18'	51	18 X	22.35
Marra (Bacino Parma)	12	6 IV	18.45	21	11 XI	5'	25	11 XI	2.15	40	26 XII	17'
Isola di Palanzano (Bacino Enza-Cedra)	14	19 X	9.15	23	18 X	8'	35	4 I	15.45	41	4 I	14.30
Reggio Emilia (Bacino Crostolo)	17	15 V	10.45	20	22 IV	9.45	21	22 IV	9.45	23	1 I	11'
Ligonchio (Bacino Secchia-Ozola)	30	11 IX	16.10	32	11 IX	15.15	35	19 X	17.40	41	1 XI	9.45
Sestola (Bacino Scoltenna)	11	16 XI	7.40	18	24 XII	8.30	23	16 XI	7'	36	3 I	10'
Stretara (Bacino Scoltenna)	18	22 VII	14.45	22	22 VII	14.30	22	22 VII	14.30	36	18 X	1'

Tab. VI. Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Numero dei giorni del periodo																							
	1			2			3			4			5			10			20			30		
	mm.	data	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	
Bacino della Scrivia																								
Montebano	108.0	26 X	138.0	26 X	27 X	204.0	7 X	9 X	208.0	6 X	9 X	238.0	4 XII	8 XII	376.0	29 XI	8 XII	546.0	19 XI	8 XII	689.0	9 XI	8 XII	
Monteggio	145.0	10 VIII	148.0	9 VIII	10 VIII	151.0	9 VIII	11 VIII	161.0	9 VIII	12 VIII	167.0	9 VIII	13 VIII	196.0	10 VIII	19 VIII	294.0	23 XI	12 XII	320.0	9 XI	8 XII	
Stazzano	160.0	18 X	160.0	18 X	19 X	160.0	17 X	19 X	168.0	18 X	21 X	168.0	18 X	22 X	197.0	18 X	27 X	233.0	4 X	23 X	262.0	4 X	2 XI	
Borbera (Destra di Scrivia)																								
Carrega Ligure.	84.0	10 VIII	98.0	10 VIII	11 VIII	112.0	2 V	4 V	126.0	1 V	4 V	166.0	30 IV	4 V	191.0	29 IV	8 V	214.0	21 IV	10 V	302.0	12 IV	11 V	
Borghetto	255.0	10 VIII	327.0	10 VIII	11 VIII	327.0	10 VIII	12 VIII	327.0	10 VIII	13 VIII	327.0	10 VIII	14 VIII	327.0	10 VIII	19 VIII	375.0	1 VIII	20 VIII	378.0	10 VIII	8 IX	
Bacino del Curone																								
Montemarzino	81.8	10 VIII	93.7	9 VIII	10 VIII	93.7	9 VIII	11 VIII	93.7	8 VIII	11 VIII	93.7	7 VIII	11 VIII	115.7	18 X	27 X	121.6	6 X	25 X	166.4	6 X	4 XI	
Bacino della Staffora																								
Casale Staffora	93.0	1 I	105.0	9 VIII	10 VIII	120.0	9 VIII	11 VIII	120.0	8 VIII	11 VIII	120.0	7 VIII	11 VIII	131.0	11 V	20 V	102.0	12 V	31 V	227.0	2 V	31 V	
Pizzocorno	77.8	9 VIII	104.4	9 VIII	10 VIII	106.5	8 VIII	10 VIII	108.6	8 VIII	11 VIII	108.6	7 VIII	11 VIII	108.6	8 VIII	17 VIII	140.6	1 VIII	20 VIII	140.6	1 VIII	30 VIII	
Bacino fra Staffora e Tidone																								
Scurupasso																								
Montaldo Pavese	58.0	2 VIII	61.0	1 VIII	2 VIII	61.0	1 VIII	3 VIII	61.0	1 VIII	4 VIII	71.0	29 VII	2 VIII	99.0	2 VIII	11 VIII	122.7	1 VIII	20 VIII	132.7	29 VII	27 VIII	
Bacino del Tidone																								
Colle Penice	65.0	10 VIII	85.0	10 VIII	11 VIII	85.0	10 VIII	12 VIII	93.0	1 XI	4 XI	93.0	1 XI	5 XI	128.0	26 X	4 XI	148.0	19 X	7 XI	203.0	7 X	5 XI	
Pianello	85.0	12 VIII	85.0	12 VIII	13 VIII	85.0	12 VIII	14 VIII	85.0	12 VIII	15 VIII	85.0	12 VIII	16 VIII	85.0	12 VIII	22 VIII	100.0	12 VIII	31 VIII	130.0	8 X	6 XI	
Bacino della Trebbia																								
Trebbia																								
Rondanina	82.0	6 XII	117.5	6 XII	7 XII	247.5	6 XII	8 XII	152.5	5 XII	8 XII	156.0	5 XII	9 XII	264.7	30 XI	9 XII	348.5	23 XI	12 XII	387.2	10 XI	9 XII	
Fontanigorda	81.0	4 V	103.0	3 V	4 V	160.0	2 V	4 V	165.0	1 V	4 V	231.0	31 IV	4 V	242.5	30 IV	9 V	295.0	30 IV	19 V	321.0	23 IV	22 V	
Statto	51.0	2 I	54.0	2 I	3 I	58.0	2 I	4 I	68.0	2 I	5 I	68.0	1 I	5 I	81.5	1 XI	10 XI	89.0	1 XI	20 XI	116.5	1 XI	30 XI	

(Segue) Tab. VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Numero dei giorni del periodo																	
	1		2		3		4		5		10		20		30			
	mm.	data	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	
Aveto (Destra di Trebbia)																		
Barbagelata	75.0	2 I	100.0	1 I	2 I	127.0	1 V	3 V	195.0	29 IV	3 V	210.0	29 IV	8 V	409.0	11 IV	10 V	
Cabanne	112.0	26 X	160.0	29 IV	30 IV	240.0	29 IV	1 V	350.0	29 IV	3 V	387.0	29 XI	8 XII	533.4	29 XI	27 XII	
Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																		
Cassimoreno	58.0	2 I	68.0	2 I	3 I	74.2	2 I -	4 I	85.9	1 I	5 I	103.3	30 IV	9 V	167.7	30 IV	19 V	
Cassano	56.0	10 VIII	89.0	10 VIII	11 VIII	92.0	10 VIII	12 VIII	92.0	10 VIII	14 VIII	95.0	6 VIII	15 VIII	114.0	22 X	10 XI	
Chiavenna																		
Castellana	36.2	12 IX	41.0	2 XI	3 XI	61.5	1 XI	3 XI	93.2	31 X	4 XI	115.8	31 X	9 XI	140.2	27 X	15 XI	
Bacino dell'Arda																		
Vernasca	40.0	2 VI	40.0	2 VI	3 VI	67.0	3 XI	5 XI	75.0	2 XI	6 XI	94.0	31 X	9 XI	105.0	31 X	19 XI	
Bacino del Taro Taro																		
Cisa	70.0	19 X	86.0	19 X	20 X	105.0	19 X	21 X	107.0	19 X	23 X	179.0	19 X	28 X	234.5	19 X	7 XI	
Montegrosso	47.0	3 V	93.0	2 V	3 V	136.0	1 V	3 V	136.0	1 V	5 V	172.0	2 XII	11 XII	182.0	26 X	14 XI	
Neviano Rossi	40.0	7 IV	46.0	1 XI	2 XI	50.0	10 VIII	12 VIII	85.0	1 XI	5 XI	116.0	26 X	4 XI	140.0	19 X	7 XI	
Ceno (Sinistra di Taro)																		
Nociveglia	85.0	1 I	101.0	1 I	2 I	115.0	1 I	3 I	120.0	1 I	5 I	127.0	28 XI	7 XII	168.0	25 X	13 XI	
Varsi	83.0	2 I	83.0	2 I	3 I	83.0	2 I	4 I	93.0	2 I	6 I	128.0	23 XI	2 XII	179.0	20 XI	9 XII	
Bacino del Parma Parma																		
Bosco di Corniglio	84.0	16 X	145.0	15 X	16 X	182.0	15 X	17 X	202.0	15 X	19 X	226.0	15 X	24 X	357.0	15 X	3 XI	
Baganza (Sinistra di Parma)																		
Casaselvatica	48.0	27 XII	70.0	2 XI	3 XI	7.5	2 XI	4 XI	75.0	2 XI	6 XI	90.0	29 XI	8 XII	159.0	26 X	15 XI	
Valterano	49.0	1 XI	70.0	1 XI	2 XI	92.0	1 XI	3 XI	92.0	1 XI	5 XI	128.0	25 X	3 XI	168.0	19 X	7 XI	
															201.0	19 X	17 XI	

(Segue) Tab. VI. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Numero dei giorni del periodo																						
	1		2		3		4		5		10		20		30								
	mm.	data	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al						
Racino dell'Enza																							
Rigoso	185.0	21 IX	185.0	21 IX	2 IX	191.0	19 X	21 X	191.0	19 X	22 X	222.0	30 IV	4 V	235.0	30 XI	9 XII	360.0	22 XI	11 XII	488.0	12 XI	11 XII
Storlo	60.0	19 X	85.0	2 V	3 V	92.0	1 V	3 V	118.0	30 IV	3 V	130.0	29 IV	3 V	169.0	18 X	27 X	273.0	18 X	7 XI	376.0	18 X	16 XI
S. Ilario	40.0	1 XI	46.0	1 XI	2 XI	62.0	1 XI	3 XI	67.0	1 XI	4 XI	70.0	31 X	4 XI	88.0	26 X	4 XI	116.0	19 X	7 XI	142.5	19 X	17 XI
Cedra (Sinistra d'Enza)																							
Rimagna	135.0	19 X	185.0	19 X	20 X	210.0	19 X	21 X	210.0	19 X	22 X	210.0	19 X	23 X	329.0	19 X	28 X	410.0	19 X	7 XI	521.0	19 X	7 XI
Racino del Crostolo																							
Canossa	75.0	2 XI	120.0	2 XI	3 XI	129.0	2 XI	4 XI	137.0	1 XI	4 XI	139.0	31 X	4 XI	188.0	26 X	5 XI	246.0	31 X	19 XI	315.0	19 X	17 XI
Racino della Secchia																							
Secchia																							
Valico Carreto	58.0	10 XII	107.0	20 X	21 X	129.0	19 X	21 X	148.0	18 X	21 X	166.0	18 X	22 X	220.0	18 X	27 X	383.0	18 X	6 XI	470.0	18 X	16 XI
Carpinetti	48.0	1 XI	60.0	1 I	2 I	85.0	1 XI	3 XI	87.0	1 XI	4 XI	104.0	10 XI	14 XI	144.0	9 XI	18 XI	235.0	1 XI	18 XI	397.0	25 X	23 XI
Levizzano	67.0	2 I	69.0	1 I	2 I	87.0	1 XI	3 XI	87.0	1 XI	4 XI	97.0	1 I	5 I	111.0	2 XI	11 XI	181.0	1 XI	20 XI	183.0	1 XI	30 XI
Ozola (Destra di Secchia)																							
Piolo	58.0	2 XI	92.0	2 XI	3 XI	98.0	1 XI	3 XI	98.0	1 XI	4 XI	103.0	1 XI	5 XI	188.0	25 X	3 XI	246.0	21 X	9 XI	352.0	19 X	17 XI
Secchiello (Destra di Secchia)																							
Razzolo	65.0	11 IX	88.0	13 VIII	14 VIII	92.0	12 VIII	14 VIII	109.0	11 VIII	14 VIII	115.0	10 VIII	14 VIII	132.0	19 X	28 X	214.0	31 X	19 XI	312.0	19 X	17 XI
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																							
Plandelagotti	77.2	18 X	124.1	18 X	19 X	170.0	18 X	20 X	170.8	18 X	21 X	170.8	18 X	22 X	266.0	18 X	27 X	357.8	18 X	6 XI	457.2	18 X	16 XI
Montefiorino	48.0	2 I	56.0	1 I	2 I	64.0	13 II	15 II	66.5	13 II	16 II	68.0	12 II	16 II	78.0	11 II	20 II	123.0	19 X	7 XI	174.0	19 X	17 XI
Rossenna (Destra di Secchia)																							
Pavullo	60.0	18 XI	63.5	17 XI	18 XI	63.5	17 XI	19 XI	67.0	15 XI	18 XI	70.0	14 XI	18 XI	110.5	9 XI	18 XI	159.5	1 XI	20 XI	199.0	20 X	18 XI

STAZIONI	Numero dei giorni del periodo																							
	1		2			3			4			5			10			20			30			
	mm.	data	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	mm.	dal	al	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																								
Marola	50.0	2 I	50.0	2 I	3 I	70.0	2 I	4 I	70.0	2 I	5 I	70.0	2 I	6 I	70.0	1 I	10 I	85.5	30 X	18 XI	113.5	19 X	17 XI	
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																								
S. Vittoria	58.0	1 XI	70.0	1 XI	2 XI	83.0	1 XI	3 XI	92.0	31 X	3 XI	102.0	30 X	3 XI	103.0	1 XI	10 XI	159.5	30 X	18 XI	203.5	18 X	16 XI	
Bonifica in destra di Parmigiana - Moglia (Sinistra di Secchia)																								
S. Martino in Rio	39.0	12 V	47.0	2 XI	3 XI	57.0	1 XI	3 XI	65.0	1 XI	4 XI	67.0	12 V	16 V	91.0	11 V	20 V	129.0	19 X	7 XI	154.0	30 X	18 XI	
Carpi	26.0	21 VIII	34.3	1 XI	2 XI	47.6	1 XI	3 XI	56.4	31 X	3 XI	60.4	30 X	3 XI	67.6	1 XI	10 XI	114.8	31 X	19 XI	130.8	21 X	19 XI	
Racino del Panaro Scotenna																								
Boscolungo	140.0	4 I	180.0	3 I	4 I	260.0	2 I	4 I	274.0	2 I	5 I	278.0	1 I	5 I	278.0	1 I	10 I	312.0	19 X	7 XI	385.0	19 X	17 XI	
Sestola	64.2	1 I	103.0	1 I	2 I	105.0	1 I	3 I	112.5	1 I	4 I	112.5	1 I	5 I	112.5	1 I	10 I	120.0	1 XI	20 XI	228.2	19 X	17 XI	
Pievepelago	62.0	1 I	82.0	1 XI	2 XI	132.0	18 X	20 X	132.0	18 X	21 X	132.0	18 X	22 X	225.0	25 X	3 XI	357.0	18 X	6 XI	387.0	18 X	16 XI	
Leo																								
Fellicarolo	85.0	4 V	115.0	1 I	2 I	135.0	1 I	3 I	135.0	1 I	4 I	135.0	1 I	5 I	177.0	20 X	29 X	258.0	20 X	8 XI	367.0	20 X	18 XI	
Rocca Corneta	73.0	1 VI	76.0	31 V	1 VI	81.0	1 XI	3 XI	81.0	1 XI	4 XI	111.0	1 XI	5 XI	128.0	1 XI	10 XI	226.0	1 XI	20 XI	285.0	20 X	18 XI	
Panaro																								
Ligorzano	54.0	2 XI	84.0	2 XI	3 XI	84.0	2 XI	4 XI	84.0	2 XI	5 XI	84.0	2 XI	6 XI	129.0	2 XI	11 XI	179.0	1 XI	20 XI	227.0	20 X	18 XI	
Coscogno	55.0	3 VIII	55.0	3 VIII	4 VIII	55.0	3 VIII	5 VIII	55.0	3 VIII	6 VIII	67.5	12 V	16 V	71.0	12 V	21 V	89.0	11 V	30 V	89.0	1 V	30 V	
Spilamberto	63.8	16 V	63.8	16 V	17 V	79.9	2 I	4 I	79.9	2 I	5 I	79.9	2 I	6 I	105.9	10 XI	19 XI	177.2	31 X	19 XI	180.3	27 X	25 XI	
Racino sciolante in Po fra Costola - Secchia - Panaro																								
Due Ponti	52.0	20 X	57.0	20 X	21 X	89.0	1 XI	3 XI	95.0	1 XI	4 XI	101.0	31 X	4 XI	132.0	1 XI	10 XI	211.0	30 X	18 XI	286.0	20 X	18 XI	
Fuori Racino (Destra di Po)																								
S. Martino Spino	20.0	12 II	38.0	12 II	13 II	38.0	12 II	14 II	38.0	12 II	15 II	38.0	12 II	16 II	38.0	12 II	21 II	65.0	25 I	13 II	65.0	25 I	23 II	
Sinistra di Po																								
Casteldario	30.5	20 V	45.5	19 V	20 V	66.0	18 V	20 V	66.0	18 V	21 V	71.0	16 V	20 V	101.0	13 V	22 V	111.6	1 V	20 V	143.6	23 IV	22 V	

Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa.

BACINO		STAZIONE		ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																			
				nulla								minore od eguale a 15 mm				minore od eguale a 45 mm							
Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al			
Staffera	25	1 VI	25 VI	22	1 III	22 III	19	10 VII	28 VIII			32	26 I	27 II	23	20 VIII	12 IX	27	27 X	22 XI	26	1 XII	26 XII
Tidone	45	20 VIII	3 X	22	2 III	23 III	19	7 VII	25 VII			37	20 V	25 VI	19	7 XII	25 XII	32	4 XI	5 XII	28	5 XI	1 XII
Trebbia	25	27 II	23 III	20	9 VII	28 VII	18	6 I	23 I			48	20 VIII	6 X	37	20 V	25 VI	26	6 XII	31 XII	25	8 X	1 XI
Nure	47	21 VIII	6 X	37	1 III	6 IV	22	3 I	24 I			32	9 VII	9 VIII	17	19 XI	5 XII	38	25 IV	1 VI	31	29 I	28 II
Arda	47	21 VIII	6 X	41	24 II	5 IV	19	10 VII	28 VII			43	16 V	27 VI	32	9 VII	9 VIII	33	6 IV	8 V	33	29 XI	31 XII
Taro	36	2 III	6 IV	24	3 VI	26 VI	20	9 VII	28 VII			37	13 IX	19 X	30	13 VIII	11 IX	40	24 IV	2 VI	31	5 XI	6 XII
id.	35	2 III	5 IV	22	3 VI	24 VI	20	9 VII	28 VII			25	13 IX	7 X	22	3 I	24 I	38	24 IV	31 V	27	9 XI	7 XII
id.	35	2 III	5 IV	24	3 VI	26 VI	20	9 VII	28 VII			46	23 VIII	7 IX	19	6 I	24 I	34	27 I	1 III	25	2 XII	26 XII
Parma	50	15 II	5 IV	29	23 VIII	20 IX	24	29 V	21 VI			33	9 VII	10 VIII	28	21 LX	18 X	39	3 I	10 II	39	7 IV	15 V
id.	31	6 III	5 IV	25	2 VI	26 VI	22	22 VIII	12 IX			36	13 IX	18 X	31	28 VI	28 VII	23	3 I	25 I	23	29 VII	20 VIII
id.	37	1 III	6 IV	37	20 V	25 VI	27	5 I	31 I			33	9 VII	10 VIII	26	11 LX	6 X	25	12 XI	6 XII	23	23 IV	15 V
Enza	28	5 III	1 IV	28	23 VIII	19 IX	24	28 V	20 VI			31	28 I	27 II	31	27 VI	27 VII	42	11 XI	2 XII	38	20 IX	27 X
Castello	27	1 VII	27 VII	25	28 V	21 VI	24	28 II	23 III			47	22 VIII	7 X	34	19 XI	22 XII	39	7 IV	15 V	24	28 VII	21 VIII

(Segue) Tab. VII. — Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa.

BACINO	STAZIONE	ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																				
		nulla						minore od eguale a 15 mm						minore od eguale a 45 mm								
		Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al	Numero dei giorni	dal	al			
Secchia	Sassuolo	32	9 VII	9 VIII	23	1 III	23 III	20	4 I	23 I	86	27 V	20 VIII	51	14 II	5 IV	126	17 V	19 IX	70	26 I	5 IV
	Bonifica Bentivoglio (Secchia)	35	2 III	5 IV	21	8 VII	28 VII	19	7 I	25 I	55	15 II	10 IV	46	23 VIII	7 X	63	27 V	28 VII	44	13 XI	26 XII
Bonifica in destra Parmigiana Moglia (Secchia)	Correggio	33	9 VII	10 VIII	24	28 V	20 VI	22	22 VIII	12 IX	51	14 II	5 IV	36	13 IX	18 X	38	19 XI	26 XII	30	13 IV	12 V
	id.	Novellara	47	22 VIII	7 X	25	2 VI	26 VI	22	2 III	23 III	36	30 VII	4 VIII	17	12 II	28 II	41	13 XI	23 XII	37	6 I
Panaro	Modena	23	9 VII	31 VIII	19	6 I	24 I	19	23 VIII	10 IX	51	14 II	5 IV	42	17 V	27 VI	50	11 IX	30 X	44	18 XI	31 XII
id.	Nonantola	36	1 III	5 IV	24	28 V	20 VI	20	5 I	24 I	34	19 XI	22 XII	29	12 VIII	9 IX	23	23 IV	8 V	17	12 II	28 II
id.	Bondeno	41	17 V	26 VI	32	2 III	2 IV	25	9 VII	2 VIII	37	6 I	11 II	33	16 IX	18 X	38	19 XI	26 XII	36	3 IV	8 V
Bacino fra Crostolo- Secchia - Panaro Agro Mantov. Reggiano	Suzzara	32	22 VIII	22 IX	29	28 V	25 VI	23	1 III	23 III	21	29 VII	18 VIII	20	6 I	25 I	31	23 IX	18 X	26	1 XII	26 XII
	id.	Quistello	51	14 II	5 IV	34	15 IX	18 X	32	9 VII	9 VIII	22	22 VIII	13 IX	18	6 I	23 I	25	11 XI	5 XII	25	7 XII
id.	Sermide	48	15 II	3 IV	34	15 IX	18 X	25	9 VII	2 VIII	40	17 V	25 VI	25	2 XII	26 XII	21	24 IV	14 V	20	6 I	25 I
Canale di Burana (Po di Volano)	Concordia	45	9 VII	22 VIII	36	16 II	23 III	24	3 VI	26 VI	34	16 IX	19 X	26	24 IV	19 V	38	6 I	12 II	30	2 XII	31 XII

Tab. VIII. Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.
Bacino della Scrivia																								
Montebano	7	15.0	2	49.0	25	8.0	13	97.0	2	79.0	2	48.0	7	15.0	10	89.0	5	93.0	26	108.0	27	80.0	8	98.0
Sanguinetto	13	12.0	1	36.0	25	3.2	13	75.8	4	49.0	27	43.3	7	22.3	10	150.8	5	58.4	7	58.4	23	52.5	1	67.3
Sarissola	25	14.0	2	10.0	23	5.0	12	44.0	3	41.0	20	6.0	—	—	9	120.0	11	12.0	6	88.0	30	86.0	3	33.0
Tortona	11	4.0	25	17.0	24	10.2	12	20.0	28	30.5	26	11.0	7	7.0	9	30.0	11	1.5	6	20.6	23	19.0	6	22.5
Borbera (Destra di Scrivia)																								
Carrega Ligure	6	1.0	1	20.0	—	—	13	44.0	3	55.0	16	35.0	20	9.0	10	84.0	13	11.5	25	40.0	30	67.0	26	65.0
Zebedassi	12	5.0	2	25.0	—	—	13	25.0	4	38.0	16	50.0	7	20.5	20	100.0	17	25.5	8	35.0	24	25.0	6	35.0
Forotondo	3	15.0	1	5.0	—	—	12	27.0	16	28.0	1	28.0	20	20.0	19	82.0	16	28.0	2	31.0	30	31.0	2	31.0
S. Sebastiano	11	7.0	2	24.0	—	—	23	12.0	4	34.0	1	20.0	7	4.0	—	—	17	30.0	7	30.0	23	20.0	1	34.0
Bacino della Staffora																								
Casale Staffora	13	15.0	1	93.0	1	9.0	6	9.0	12	50.0	16	30.0	18	4.0	9	85.0	16	35.0	25	55.0	23	35.0	22	16.0
Rivanazzano	12	8.0	2	50.0	—	—	23	15.0	4	20.0	20	28.0	7	20.0	10	85.0	11	10.0	7	52.0	23	22.0	2	22.0
Voghera	13	5.0	2	21.6	24	8.8	22	9.8	3	20.0	26	8.5	29	14.3	10	41.5	11	13.2	6	48.5	23	10.3	27	20.0
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																								
Montalto Pavese	11	12.0	2	22.0	25	5.0	13	15.0	5	19.0	27	19.5	7	19.0	2	58.0	11	10.0	7	32.5	1	20.0	27	35.0
Versa																								
Canevino	11	18.8	2	27.6	24	0.2	23	13.0	4	25.4	21	9.4	25	20.6	10	54.7	12	6.5	7	45.7	8	24.4	27	17.5
S. Maria della Versa	14	14.0	1	42.0	25	0.5	15	32.0	4	21.0	20	25.0	7	14.0	10	70.0	—	—	8	70.0	7	26.0	27	20.0
Bardonezza																								
Luzzano	13	7.0	2	27.0	24	1.0	13	7.0	4	10.0	26	20.0	29	15.0	11	30.0	—	—	7	65.0	3	20.0	27	15.5
Bacino del Tidone																								
Colle Penice	13	8.0	3	10.0	1	10.0	13	40.0	4	50.0	27	30.0	7	20.0	10	65.0	—	—	7	30.0	2	30.0	1	30.0
Sarmato (Zuccherificio)	12	7.5	1	15.5	24	5.5	22	10.0	3	10.0	26	13.0	28	9.0	9	30.0	—	—	4	27.0	3	18.0	6	21.5

(Seque) Tab. VIII. — Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.
Racino della Trebbia																								
Rondanina	11	10.0	2	50.0	25	3.5	13	70.0	3	75.0	21	60.0	7	15.0	10	60.0	11	11.0	26	50.5	23	45.0	6	82.0
Cerignale	1	20.0	2	52.0	2	10.0	14	60.0	4	80.0	27	28.0	8	30.0	10	30.0	15	8.0	19	20.0	28	25.0	2	40.0
Bobbio	11	5.0	26	20.0	1	10.0	23	10.0	24	35.0	27	8.0	7	10.0	16	60.0	—	—	7	30.0	9	17.0	27	30.0
S. Lazzaro Alberoni	13	17.0	25	17.0	25	1.2	6	9.8	15	14.5	26	9.7	29	4.5	19	21.2	11	0.8	7	15.0	3	20.9	8	13.0
Aveleto (Destra di Trebbia)																								
Barbagelata	25	20.0	2	75.0	17	10.0	15	50.0	1	50.0	26	31.0	25	23.0	9	45.0	13	34.0	8	41.0	28	42.0	5	30.0
Cabanne	25	7.0	2	15.0	23	1.0	29	100.0	3	110.0	26	28.0	7	13.0	10	55.0	21	27.0	8	26.0	8	43.0	1	110.0
Racino del Nure e del Chiavenna																								
Nure																								
Grondone	11	9.0	2	38.1	—	—	23	13.6	4	44.0	20	12.1	7	15.1	10	99.8	17	13.3	20	17.9	8	19.0	27	29.6
Bettola	13	25.0	26	30.0	23	1.2	23	32.0	16	48.0	2	36.0	7	26.0	20	56.0	12	18.0	8	28.0	8	36.0	1	42.0
Chiavenna																								
Obelo	13	10.0	2	32.0	1	5.0	16	15.0	16	42.0	27	17.0	7	21.0	10	48.0	—	—	8	20.0	3	25.0	1	41.0
S. Giorgio Placentino	11	8.0	25	15.0	1	5.0	23	17.0	4	15.0	2	12.0	29	8.0	20	26.0	24	0.6	8	13.0	2	25.0	27	20.0
Racino dell'Arda																								
Pellizzone	14	30.0	25	35.0	1	22.0	7	21.0	4	20.0	27	29.0	29	25.0	10	16.0	21	11.0	19	30.0	2	40.0	27	33.0
Florenzuola	11	10.0	26	20.0	—	—	23	8.0	9	18.0	13	4.0	9	7.0	20	17.0	—	—	8	36.0	2	30.0	9	20.0
Racino del Taro																								
Taro																								
Centocroci	11	11.0	2	87.0	—	—	29	22.0	4	41.0	24	17.0	1	6.0	20	26.0	13	7.0	27	51.0	29	32.0	8	41.0
S. Maria del Taro	12	16.3	2	25.0	—	—	15	30.0	1	80.0	27	35.0	1	10.0	10	70.2	21	12.1	26	51.3	27	42.4	27	110.6
S. Vittore	12	10.0	2	50.0	1	8.0	7	25.0	4	14.0	27	15.0	8	8.0	20	25.0	12	28.0	27	24.0	2	27.0	27	30.0
Salsomaggiore	11	22.0	2	60.0	1	4.0	23	51.0	20	7.0	27	10.0	8	3.0	12	16.0	12	14.0	27	8.0	1	24.0	7	24.0
Ceno (Sinistra di Taro)																								
Drusco	11	11.0	2	60.0	1	11.0	30	21.0	4	53.0	13	60.0	7	17.0	10	42.0	21	22.0	22	26.0	30	45.0	26	58.0
Plone	11	27.0	3	65.0	—	—	22	29.0	15	74.0	28	33.0	7	23.0	12	41.0	17	31.0	7	35.0	4	28.0	27	41.0
Vianino	13	20.0	2	40.0	25	6.0	23	23.0	3	18.0	15	5.0	4	2.0	21	13.0	12	6.0	27	9.0	3	13.0	23	36.0

(Segue) Tab. VIII. — Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.
Bacino del Parma																								
Parma																								
Muslaro Superiore	1	16.0	23	20.0	3	39.0	26	29.0	9	5.0	9	95.0	11	29.0	19	40.0	2	40.0	27	29.0				
Bosco di Corniglio	14	12.0	2	49.0	24	47.0	13	21.0	6	5.0	12	25.0	14	14.0	16	84.0	30	50.0	6	45.0				
Antesica	2	23.0	7	33.0	13	26.0	29	4.0	29	7.0	20	32.0	21	15.2	19	35.0	3	41.0	27	21.0				
Parma	11	7.5	2	35.0	5	1.0	23	25.0	16	22.8	1	7.0	29	8.0	21	35.1	25	1.0	19	18.2	2	35.0	27	25.5
Baganza																								
(Sinistra di Parma)																								
Casaselvatica	11	12.0	2	25.0	—	—	23	12.5	4	24.0	16	35.0	7	2.5	10	19.0	21	3.0	26	45.0	2	40.0	27	48.0
Vallerano	3	10.0	1	25.0	—	—	6	21.0	13	35.0	26	11.0	27	7.0	20	20.0	11	20.0	28	17.0	1	49.0	25	18.0
S. Martino Sinsano	13	20.0	26	25.0	—	—	22	17.0	13	15.0	26	10.0	6	10.0	11	10.0	11	4.0	28	12.0	1	15.0	27	20.0
Bacino dell'Enza																								
Rigoso	12	22.0	2	65.0	—	—	30	65.0	4	82.0	21	45.0	14	5.0	22	61.0	21	185.0	19	105.0	7	41.0	27	96.0
Storlo	12	8.0	2	45.0	—	—	22	48.0	3	45.0	8	15.0	8	2.0	12	15.0	20	37.0	19	60.0	1	40.0	6	32.0
Cazzola	13	7.0	2	49.0	1	7.0	7	23.0	13	37.0	22	30.0	29	16.0	22	16.0	21	3.0	19	25.0	3	34.0	27	21.0
S. Ilario	8	8.0	27	25.0	1	7.0	23	22.5	13	21.0	22	10.0	29	36.0	21	15.0	21	4.0	20	16.0	1	40.0	27	20.5
Bacino del Crostolo																								
Canossa	13	18.0	2	17.0	—	—	23	26.0	15	51.0	27	15.0	8	8.0	21	35.0	10	13.0	19	51.0	2	75.0	26	35.0
Reggio Emilia	13	11.0	1	26.0	24	0.4	6	27.2	12	21.8	28	10.0	28	2.0	21	7.0	20	7.0	19	38.3	1	35.4	27	19.7
Bacino della Secchia																								
Secchia																								
Valico Cerreto	12	19.0	1	29.0	2	14.0	23	29.0	4	47.0	30	21.0	8	14.0	22	19.0	20	39.0	20	58.0	3	38.0	10	58.0
Bismantova	8	8.0	2	38.0	1	14.0	7	19.0	16	15.0	27	16.0	28	5.0	13	31.0	20	17.0	19	20.0	3	33.0	27	7.0
Cavola di Toano	12	11.5	2	62.0	—	—	7	20.0	13	30.0	23	7.0	29	11.0	14	32.0	21	8.0	19	30.0	3	35.0	8	10.0
Sassuolo	13	10.0	3	41.0	24	1.0	6	42.0	12	12.0	26	2.0	8	2.0	22	7.0	20	6.0	21	9.0	1	51.0	22	13.0
Ozola																								
(Destra di Secchia)																								
Ospedaletto	13	10.0	1	80.0	—	—	15	60.0	3	60.0	20	20.0	26	5.0	9	20.0	20	25.0	26	46.0	1	60.0	6	60.0
Piolo	14	15.0	2	40.0	1	7.0	7	25.0	4	19.0	27	12.0	—	—	12	21.0	8	21.0	21	45.0	2	58.0	1	33.0
Cinquecerri	12	25.0	1	50.0	1	0.5	7	25.0	4	22.0	22	15.8	—	—	22	25.5	12	20.0	19	55.0	3	25.5	1	18.0

(Segue) Tab. VIII. — Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.	giorno	mm.
Secchiello (Destra di Secchia)																								
Castione d'Asta	28	11.0	2	43.0	1	5.0	7	26.0	4	34.0	22	73.0	7	29.0	13	28.0	12	50.0	19	90.0	2	46.0	1	42.0
Razzolo	13	12.0	25	55.0	1	4.0	7	25.0	13	22.0	16	55.0	23	20.0	13	63.0	11	65.0	19	60.0	3	43.0	27	22.0
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																								
Radici	12	35.0	2	36.0	1	25.0	16	40.0	29	25.0	28	41.0	1	21.0	12	25.0	21	25.0	20	50.0	3	66.0	1	61.0
Toano	13	15.0	2	70.0	1	10.0	7	45.0	13	21.0	23	18.0	8	8.0	4	35.0	21	11.0	19	64.0	2	44.0	27	40.0
Ceredolo	14	15.0	1	20.0	1	2.0	24	19.0	17	19.0	27	14.0	8	1.0	13	29.0	11	3.0	19	25.0	3	39.0	27	18.0
Rossena (Destra di Secchia)																								
Lama Mocogno	13	15.0	2	55.0	1	5.0	7	38.0	16	17.0	23	10.0	28	21.0	22	31.0	12	22.0	19	20.0	2	37.0	27	13.0
Pavullo	28	15.0	14	22.0	3	2.0	7	33.0	16	32.0	23	7.0	8	4.0	11	24.0	11	23.0	28	28.0	18	60.0	27	17.0
Gombola	28	19.0	2	45.0	1	10.0	7	32.0	16	18.0	22	13.0	8	5.0	22	53.0	12	20.0	19	15.0	19	32.0	27	12.0
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																								
Marola	11	40.0	2	50.0	1	15.0	6	45.0	12	40.0	21	30.0	7	10.0	21	20.0	20	8.0	19	15.0	1	25.0	23	12.5
Bagno	14	34.5	—	40.0	1	11.0	23	35.1	13	50.8	29	19.9	8	3.0	22	10.2	21	7.0	20	20.2	2	30.2	28	29.0
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																								
Campegine	*	*	27	9.0	1	8.0	23	20.0	15	10.0	26	10.0	29	7.5	20	6.0	14	8.0	19	11.0	12	12.0	28	10.0
Capanna	*	*	2	17.0	4	1.0	22	20.0	12	17.0	26	15.0	28	10.0	9	15.0	11	8.0	18	23.0	1	38.0	26	15.0
Bonifica in destra di Parmigiana-Moglia (Sinistra di Secchia)																								
Correggio	13	12.0	27	30.0	23	1.5	6	28.5	15	40.0	28	47.0	8	2.0	21	9.0	20	5.5	19	22.5	2	37.0	23	16.0
Bacino del Panaro Scolterna																								
Boscolungo	13	22.0	4	140.0	—	—	16	42.0	4	75.0	27	30.0	20	26.0	11	20.0	21	129.0	20	76.0	30	84.0	27	131.0
Sestola	28	23.4	1	64.2	1	4.4	6	33.4	3	21.0	27	6.9	28	14.0	3	32.1	20	22.2	19	54.3	1	24.0	27	24.6
Fiumatbo	*	*	1	55.0	24	1.0	5	35.0	4	67.0	*	*	29	7.0	11	15.0	21	37.0	20	43.0	18	42.0	6	40.0
Pievepelago	13	14.0	1	62.0	—	—	*	*	30	27.0	26	36.0	29	24.0	10	37.0	20	46.0	19	53.0	1	62.0	26	49.0

(Segue) Tab. VIII. — Massime precipitazioni giornaliere per ogni mese rilevate in alcune stazioni tipiche.

STAZIONI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.	giorno	max.
Leo																								
Ospitale Fanano	28	27.0	2	63.0	1	13.0	7	40.0	4	55.0	2	23.0	29	19.0	6	37.0	21	52.0	20	50.0	18	49.0	27	52.0
Rocca Corneta	12	27.0	1	64.0	1	18.0	6	34.0	3	20.0	1	73.0	28	16.0	3	33.0	20	3.0	19	39.0	1	41.0	27	25.0
Panaro																								
Montese	13	45.0	1	64.0	1	4.0	10	15.0	27	40.0	16	40.0	28	2.0	12	18.0	14	22.0	19	30.5	3	35.0	23	25.0
Verica	13	15.0	2	80.0	1	3.0	7	65.0	16	34.0	22	26.0	28	2.0	12	20.0	25	5.0	20	25.0	2	40.0	2	2
S. Venanzio	12	12.0	4	31.0	—	—	6	31.0	16	21.0	27	2.0	1	1.5	21	35.0	12	15.0	19	17.0	11	43.0	28	23.0
Finale	2	2	2	16.0	1	2.4	23	16.2	16	40.2	29	8.6	29	20.3	22	16.4	21	2.3	20	14.5	12	31.0	27	7.8

Precipitazioni di notevole intensità e breve durata.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Intensità media oraria mm.	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Intensità media oraria mm.	Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				Ore e minuti	dalle ore	alle ore							Ore e minuti	dalle ore	alle ore			
SCRIVIA	Torriglia	Pr	13 maggio	1.—	18.—	19.—	20.—	20.—	20.—	Rondanina	Pn	16 giugno	1.—	13.—	14.—	20.—	20.—	20.—
	id.	id.	2 giugno	0.20'	11.20	11.40	28.—	84.—	84.—	id.	id.	26 id.	0.30'	11.—	12.30	31.—	20.—	20.—
	id.	id.	21 id.	1.—	13.25	14.25	44.—	44.—	44.—	Pelli	id.	12 maggio	1.—	3.—	4.—	20.—	20.—	20.—
	id.	id.	26 id.	1.—	9.40	10.40	30.—	30.—	30.—	id.	id.	23 id.	2.—	14.—	16.—	40.—	20.—	20.—
	id.	id.	19 luglio	0.30'	11.15	11.45	10.—	20.—	20.—	Montebruno	P	26 giugno	2.—	9.30	11.30	52.—	26.—	26.—
	id.	id.	9 agosto	0.30'	10.—	10.30	10.—	20.—	20.—	Ottone	id.	9 agosto	3.—	24.—	3.—	70.—	24.—	24.—
	id.	id.	9 id.	2.—	23.10	1.10	60.—	30.—	30.—	Losso	Pr	23 maggio	2.—	14.—	16.—	62.—	31.—	31.—
	id.	id.	19 id.	0.20'	16.50	17.10	10.—	30.—	30.—	id.	id.	16 giugno	0.30'	15.15	15.45	10.—	20.—	20.—
	id.	id.	13 settembre	0.30'	17.—	17.30	11.—	22.—	22.—	id.	id.	5 luglio	0.5'	22.25	22.30	20.—	240.—	240.—
	id.	id.	6 ottobre	0.40'	16.10	16.50	19.—	28.—	28.—	id.	id.	9 agosto	0.30'	10.55	11.25	12.—	24.—	24.—
	Frassinello	Pn	21 maggio	1.—	14.—	15.—	31.—	31.—	31.—	Ponte Organasco	P	24 maggio	1.—	16.—	17.—	30.—	30.—	30.—
	id.	id.	19 agosto	0.30'	13.30	12.—	45.—	90.—	90.—	Bobbio	id.	10 agosto	3.—	19.—	22.—	60.—	20.—	20.—
	id.	id.	16 settembre	1.30'	14.—	15.30	37.—	25.—	25.—	Perino	id.	15 maggio	1.—	16.—	17.—	25.—	25.—	25.—
Borbera (Destra di Scrivia)	id.	id.	6 ottobre	1.30'	16.—	17.30	60.—	40.—	40.—	Alpeiana	Pn	14 id.	1.—	1.30	2.30	20.—	20.—	20.—
	id.	id.	12 novembre	0.10'	18.—	18.10	4.—	24.—	24.—	id.	id.	17 giugno	1.—	15.—	16.—	25.—	25.—	25.—
	Scoffera	P	21 maggio	1.—	14.—	15.—	35.—	35.—	35.—	id.	id.	20 id.	0.30'	12.30	13.—	30.—	60.—	60.—
	Montoggio	id.	1 giugno	1.—	12.—	13.—	20.—	20.—	20.—	id.	id.	18 luglio	0.40'	14.30	15.—	35.—	52.—	52.—
	id.	id.	26 id.	1.—	10.—	11.—	30.—	30.—	30.—	id.	id.	12 agosto	0.15'	11.30	11.45	47.—	188.—	188.—
	id.	id.	3 settembre	1.—	13.—	14.—	25.—	25.—	25.—	id.	id.	13 id.	0.45'	11.45	12.30	29.—	38.—	38.—
	id.	id.	6 ottobre	1.—	16.—	17.—	23.—	23.—	23.—	id.	id.	16 settembre	1.—	13.30	14.30	21.—	21.—	21.—
	Novi Piemonte	id.	26 dicembre	0.40'	18.—	18.40	22.—	33.—	33.—	Brugnato	id.	12 agosto	0.30'	13.30	14.—	20.—	40.—	40.—
	Carrega Ligure	Pn	16 giugno	0.45'	13.—	13.45	35.—	47.—	47.—	Prlosa	id.	26 giugno	2.—	10.—	12.—	51.—	25.—	25.—
	id.	id.	6 ottobre	1.—	17.—	18.—	35.—	35.—	35.—	id.	id.	6 ottobre	2.—	17.—	19.—	46.—	23.—	23.—
	Casate Staffora	Pn	9 agosto	2.—	10.30	12.30	85.—	42.—	42.—	id.	id.	1 novembre	1.—	19.—	20.—	30.—	30.—	30.—
	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	Magnasco	id.	12 maggio	1.—	15.—	16.—	20.—	20.—	20.—
	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	Boschi	Pr	25 maggio	0.15'	13.25	13.40	8.—	32.—	32.—
	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	27 id.	0.20'	24.10	24.30	7.—	21.—	21.—
	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	12 giugno	0.30'	13.30	14.—	17.—	34.—	34.—
	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	8 agosto	1.45'	1.30	2.15	67.—	35.—	35.—
STAFFORA	Casate Staffora	Pn	9 agosto	2.—	10.30	12.30	85.—	42.—	42.—	id.	id.	12 maggio	1.—	15.—	16.—	20.—	20.—	20.—
BARDONEZZA	Luzzano	P	9 agosto	1.—	11.—	12.—	24.—	24.—	24.—	id.	id.	27 id.	0.20'	24.10	24.30	7.—	21.—	21.—
TIDONE	Sarmato	P	3 ottobre	1.—	19.—	20.—	27.—	27.—	27.—	id.	id.	8 agosto	1.45'	1.30	2.15	67.—	35.—	35.—

(Segue) Tab. IX. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.	BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				Ore e minuti	dalle ore	alle ore							Ore e minuti	dalle ore	alle ore		
(Segue) Aveio	Boschi	Pr	4 novembre	0.5'	15.35	15.40	12.—	144.—	(Segue) Taro	Strinabecco	Pr	22 giugno	0.20'	12.25	12.45	13.—	39.—
	id.	id.	15 id.	0.5'	14.10	14.15	5.—	60.—		id.	id.	26 id.	0.20'	9.40	10.—	20.—	60.—
	id.	id.	12 giugno	0.35'	13.25	14.0	17.—	29.—		id.	id.	6 luglio	0.10'	22.—	22.10	5.—	30.—
	id.	id.	16 giugno	1.10'	14.30	15.40	24.—	23.—		id.	id.	9 agosto	0.5'	21.25	21.30	4.—	48.—
NURE	Grondone	Pn	31 maggio	0.45'	16.45	17.30	27.—	36.—	Ceno (Sinistra di Taro)	id.	id.	9 id.	2.—	0.30	2.30	84.—	42.—
	id.	id.	9 agosto	3.—	1.—	4.—	99.—	33.—		id.	id.	19 id.	0.40'	17.—	17.40	16.—	24.—
	Mareto	id.	23 maggio	1.—	14.30'	15.30	50.—	50.—		id.	id.	15 settembre	0.5'	14.45	14.50	5.—	60.—
	id.	id.	9 agosto	3.—	2.—	5.—	59.—	20.—		id.	id.	16 id.	0.30'	13.30	14.—	25.—	50.—
	Cassimoreno	P	14 maggio	0.45'	13.45	14.30	20.—	27.—		id.	id.	19 id.	0.20'	8.—	8.20	7.—	21.—
	id.	id.	26 giugno	0.50'	10.10	11.—	26.—	31.—		id.	id.	6 ottobre	0.20'	18.20	18.40	17.—	51.—
	id.	id.	6 luglio	1.—	22.30	23.30	29.—	29.—		id.	id.	18 id.	0.10'	0.10	0.20	8.—	48.—
	id.	id.	20 id.	1.—	13.—	14.—	27.—	27.—		id.	id.	18 id.	0.5'	21.15	21.20	6.—	72.—
	Padri di Bettola	P	2 giugno	0.30'	2.30	3.—	15.—	30.—		S. Maria Valderna	id.	3 gennaio	0.10'	8.20	8.30	5.—	30.—
		id.	16 maggio	0.30'	12.—	12.30	25.—	50.—			id.	3 marzo	0.20'	14.20	14.40	10.—	30.—
ARDA	Castellana	id.	11 settembre	1.—	11.—	12.—	36.—	36.—	Valdena	id.	id.	23 id.	0.40'	14.40	15.20	16.—	24.—
	id.	id.								id.	id.	22 giugno	0.20'	15.—	15.20	15.—	45.—
	Pelizzone	Pn	27 luglio	1.—	14.—	15.—	25.—	25.—		id.	id.	26 id.	0.10'	13.20	13.30	16.—	96.—
	id.	id.	7 dicembre	1.—	10.—	11.—	25.—	25.—		id.	id.	19 agosto	0.15'	17.45	18.—	14.—	56.—
	Morfasso	id.	14 maggio	1.—	15.—	16.—	20.—	20.—		id.	id.	11 settembre	0.20'	10.50	11.10	7.—	21.—
	Vernasca	P	2 giugno	1.—	2.30	3.30	40.—	40.—		id.	Pn	22 giugno	0.15'	13.15	13.30	11.—	44.—
TARO	id.	id.	2 id.	1.—	3.—	4.—	22.—	22.—	Tornolo	id.	id.	19 agosto	0.30'	17.45	18.15	31.—	62.—
	Busseto	id.	21 agosto	1.15'	10.15	11.30	56.—	45.—		id.	id.	22 giugno	1.—	13.—	14.—	42.—	42.—
	Cisa	Pn	19 agosto	1.30'	18.—	19.30	42.—	28.—		id.	id.	19 agosto	1.—	17.—	18.—	28.—	28.—
	Berceto	id.	19 id.	0.30'	18.30	19.30	30.—	60.—		id.	P	27 giugno	0.30'	12.—	12.30	14.—	28.—
	Strinabecco	Pr	9 maggio	0.5'	8.50	8.55	11.—	132.—		id.	P	12 agosto	1.—	24.—	1.—	33.—	33.—
	id.	id.	20 giugno	0.20'	11.—	11.20	7.—	21.—		id.	Pn	22 id.	0.30'	20.—	20.30	12.—	24.—
										id.	id.	11 settembre	2.30'	12.30	15.—	49.—	20.—
										id.	P	28 giugno	1.—	11.30	12.30	22.—	22.—

(Segue) Tab. IX. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.	BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				Ore e minuti	dalla ore	alle ore							Ore e minuti	dalla ore	alle ore		
(Segue) CENO	Nociveglia	Pn	3 settembre	1.30'	12.30	14.—	33.—	21.—	(Segue) CROSTOLO	Roncolo	P	28 giugno	0.30'	12.—	12.30	19.—	38.—
	Varsi	P	15 maggio	1.—	15.30	16.30	20.—	20.—		Boschi di Vezzano	id.	22 aprile	1.—	11.—	12.—	23.—	23.—
	Muslara Superiore	Pn	10 settembre	1.—	12.—	13.—	29.—	29.—		Reggio Emilia	id.	15 maggio	0.40'	9.40	10.20	18.—	27.—
	Bosco di Corniglio (Centrale)	Pr	26 giugno	0.30'	12.30	13.—	10.—	20.—		id.	id.	28 giugno	0.10'	13.30	14.—	5.—	30.—
	id.	id.	19 agosto	0.30'	18.45	19.15	17.—	34.—		id.	id.	7 novembre	0.5'	9.25	9.30	3.—	36.—
	id.	id.	20 settembre	0.10'	7.—	7.10	8.—	48.—									
	Marra (Centrale)	id.	2 maggio	0.20'	21.20	21.40	7.—	21.—		Sparavalle	P	10 agosto	1.—	5.—	6.—	28.—	28.—
	Casaselvatica	Pn	16 giugno	1.—	16.—	17.—	35.—	35.—		Sologno	id.	12 id.	1.—	13.—	14.—	40.—	40.—
	Cassio	id.	22 id.	1.—	16.—	17.—	20.—	20.—		Carpineti	id.	22 id.	1.—	8.—	9.—	20.—	20.—
	Vallerano	P	25 maggio	0.5'	16.—	16.5	5.—	60.—		Baiso	id.	12 maggio	1.—	16.—	17.—	74.—	74.—
ENZA	id.	id.	28 id.	0.5'	11.—	11.5	5.—	60.—	SECCHIA	Cavola di Toano	id.	14 agosto	1.30'	14.—	15.30	32.—	21.—
	id.	id.	29 id.	0.10'	19.—	19.10	20.—	120.—		Ospedaletto	id.	3 settembre	0.30'	12.30	13.—	10.—	20.—
	id.	id.	17 agosto	0.15'	10.—	10.15	17.—	68.—		Ligonchio	Pr	21 giugno	0.10'	23.15	23.25	6.—	36.—
	id.	id.	19 id.	1.—	13.—	14.—	20.—	20.—		id.	id.	11 agosto	0.15'	22.55	23.10	13.—	52.—
	id.	id.	10 settembre	0.10'	12.—	12.10	20.—	120.—		id.	id.	21 id.	0.15'	14.10	14.25	13.—	52.—
CROSTOLO	Lagastrello	Pn	21 giugno	2.—	12.—	14.—	67.—	33.—	SECCHIello (Destra di Secchia)	Castione d'Asta	P	20 giugno	2.10'	12.30	15.40	73.—	34.—
	Succiso	id.	21 id.	1.—	10.—	11.—	38.—	38.—		id.	id.	10 settembre	1.40'	15.40	17.20	50.—	30.—
	Leguigno	P	2 agosto	1.—	14.—	15.—	26.—	26.—		Razzolo	id.	15 giugno	1.—	17.—	18.—	55.—	55.—
	Marano	id.	16 id.	1.30	12.—	13.30	41.—	28.—		id.	id.	22 luglio	1.—	13.—	14.—	20.—	20.—
	Rimagna	id.	20 giugno	2.—	13.—	15.—	40.—	20.—		id.	id.	13 agosto	3.—	13.—	16.—	63.—	21.—
	Isola di Palanzano	Pr	18 ottobre	0.20'	2.—	2.20	7.—	21.—		id.	id.	10 settembre	3.—	15.—	18.—	65.—	22.—
	id.	id.	19 id.	0.10'	21.35	21.45	5.—	30.—		Pollnago	Pn	15 maggio	0.30'	11.30	12.—	16.—	32.—
										id.	id.	12 agosto	1.—	7.—	8.—	20.—	20.—
										id.	id.	11 settembre	1.—	15.—	16.—	50.—	50.—
CROSTOLO	Canossa	P	15 maggio	1.30'	14.—	15.30	51.—	34.—	ROSSENNA (Destra di Secchia)	Prignano	P	20 giugno	0.30'	15.—	15.30	11.—	22.—
	id.	id.	21 giugno	0.15'	21.30	21.45	9.—	36.—		Gombola	id.	12 agosto	1.—	17.—	18.—	20.—	20.—
	Casina	id.	22 agosto	0.20'	7.40	8.—	46.—	138.—		id.	id.	13 id.	1.—	18.—	19.—	23.—	23.—
	Roncolo	id.	15 maggio	1.—	15.—	16.—	34.—	34.—		id.	id.	22 id.	2.—	13.—	15.—	53.—	26.—
										id.	id.	11 settembre	1.—	14.—	15.—	20.—	20.—

(Segue) Tab. IX. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Intensità media oraria mm.	BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	DURATA			Quantità di precipitazione mm.	Intensità media oraria mm.
				Ore e minuti	dalle ore	alle ore						Ore e minuti	dalle ore	alle ore		
Tresinaro (Sinistra di Secchia) Bonif. in destra di Parmigiana Moglia	Ca' de' Caroli	P	12 maggio	0.30'	19.30	20.—	48.—	(Segue) Scoltenna	Strettara	Pr	15 giugno	0.10'	13.25	13.35	11.—	66.—
	Bagno	id.	28 giugno	0.45'	12.—	12.45	27.—		id.	id.	20 id.	0.10'	15.30	15.40	10.—	60.—
	Correggio	id.	12 aprile	1.—	15.—	16.—	27.—		id.	id.	3 agosto	0.20'	15.20	15.40	10.—	30.—
	id.	id.	13 maggio	1.—	15.—	16.—	23.—		id.	id.	11 settembre	0.30'	14.45	15.15	13.—	26.—
	id.	id.	19 id.	1.—	11.—	12.—	23.—	Leo	Fellicarolo	P	28 luglio	1.30'	15.—	16.30	33.—	22.—
	id.	id.	28 giugno	0.30'	13.—	13.30	47.—		id.	id.	12 agosto	1.—	16.—	17.—	30.—	30.—
	S. Martino in Rio	id.	19 maggio	1.—	11.—	12.—	23.—		Rocca Corneta	Pn	1 giugno	2.—	14.—	16.—	73.—	36.—
	Carpi	id.	22 giugno	0.25'	20.15	20.40	12.—	Panaro	Montombraro	P	15 id.	1.—	18.45	19.45	30.—	30.—
	Torrione	id.	12 aprile	0.15'	2.30	2.45	9.—		id.	id.	10 settembre	2.—	17.—	19.—	45.—	22.—
	Ponte Rosso	id.	13 id.	0.30'	13.30	14.—	20.—		Guiglia	id.	10 id.	1.—	16.—	17.—	27.—	27.—
	id.	id.	13 settembre	1.—	15.30	16.30	20.—		Coscogno	id.	12 maggio	1.—	21.—	22.—	25.—	25.—
	Mondine	id.	15 maggio	1.—	15.30	16.30	23.—		Savignano	id.	16 giugno	1.—	19.—	20.—	26.—	26.—
	Botte S. Prospero	id.	11 agosto	0.15'	18.—	18.15	5.—		Spilamberto	id.	25 maggio	0.40'	14.20	15.—	32.—	48.—
	id.	id.	13 settembre	2.—	15.—	17.—	60.—		id.	id.	21 giugno	1.—	21.—	22.—	20.—	20.—
							30.—		S. Felice	id.	12 agosto	1.—	16.—	17.—	20.—	20.—
PANARO Scoltenna	Sestola	Pr	8 aprile	0.10'	15.25	15.35	6.—	Bacino sciolante in Po fra Crostolo Secchia e Panaro	Quistello	P	27 maggio	0.30'	3.—	3.30	12.—	24.—
	id.	id.	28 luglio	0.10'	17.40	17.50	4.—		id.	id.	2 giugno	0.30'	12.30	13.—	16.—	32.—
	id.	id.	3 agosto	0.5'	15.25	15.30	8.—		id.	id.	10 agosto	0.30'	20.—	20.30	15.—	30.—
	id.	id.	10 id.	0.5'	8.40	8.45	11.—		id.	id.	13 settembre	0.30'	16.—	16.30	12.—	24.—
	id.	id.	26 dicembre	0.10'	4.20	4.30	5.—		Sermide	id.	20 agosto	1.15'	13.10	14.25	42.—	33.—
							30.—		id.	id.	10 settembre	1.—	17.—	18.—	50.—	50.—

Tab. X. Precipitazioni nevose - Altezza giornaliera in centimetri.

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	1. ^a Decade										2. ^a Decade										3. ^a Decade										Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo	Numero giorni novosi
			1. ^a Decade										2. ^a Decade										3. ^a Decade											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

SCRIVIA	Torriglia	764	—	60	65	60	55	52	50	48	48	40	35	33	33	30	28	25	20	18	18	16	15	13	10	9	19	20	20	18	15	12	10	4	30
	Castagnola	560	10	35	45	40	25	25	25	25	25	25	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	20	10	10	10	10	4	31	
	S. Agata Fossili	425	—	30	25	25	25	23	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	14	14	14	11	8	23	14	14	12	12	10	10	2	30	
	Variana	300	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	7	—	—	—	—	2	4	
	Stazzano	219	—	34	36	36	36	34	32	32	32	30	25	25	25	25	25	25	25	18	18	18	16	14	10	8	14	12	12	7	5	3	30		
Borbera (Destra di Scrivia)	Carrega Ligure	955	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	28	27	27	27	27	27	27	26	25	25	20	15	14	12	20	22	22	22	21	20	18	3	31
	Zebedessi	492	—	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	15	14	14	10	9	6	5	4	3	—	—	10	11	12	12	10	8	4	28	
CURONE	Montemarzino	468	3	38	34	30	28	25	23	22	20	18	18	17	14	13	13	12	10	10	10	10	9	9	9	8	22	25	24	24	23	20	4	31	
STAFFORA	Pizzocorno	478	70	70	75	60	45	25	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15	15	15	10	10	10	10	10	30	35	28	26	24	23	4	31	
SCUIROPASSO	Montaldo Pavese	466	—	30	25	29	20	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	12	12	12	10	8	7	7	18	28	26	23	20	18	17	3	30
VERSA	Canevino	510	—	28	35	34	34	33	33	32	32	32	31	30	29	29	28	28	27	26	25	25	20	15	15	15	26	25	30	30	28	28	4	30	
TIDONE	Pianello	185	—	50	50	48	49	55	53	50	48	46	40	37	33	30	27	26	20	18	15	10	8	5	5	4	22	29	25	20	15	12	8	5	30
TREBBIA	Rondanina	1000	3	53	56	59	61	61	61	61	61	61	61	61	60	58	59	60	60	60	56	50	46	40	35	35	48	58	58	56	50	45	9	31	
	Pradovera	937	—	36	60	61	55	53	50	47	43	40	40	40	40	40	38	38	36	35	35	34	33	31	30	40	50	62	60	55	49	38	6	30	
	Barchi	800	—	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	47	42	38	37	34	30	28	25	24	23	20	40	38	35	30	28	27	3	30	
	Rovegno	660	4	45	43	44	44	42	40	38	35	31	30	28	26	22	20	19	18	16	15	13	12	10	9	8	20	24	23	22	21	20	5	31	
	Brugnello	468	—	37	43	40	38	38	37	37	35	30	28	25	24	21	14	7	4	4	4	3	3	3	3	3	23	33	30	25	23	20	4	30	
	Statto	174	—	20	17	10	9	9	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	27	29	27	24	21	21	3	30	

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	1. ^a Decade												2. ^a Decade												3. ^a Decade												Numero giorni nevosi	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo
			1. ^a Decade												2. ^a Decade												3. ^a Decade													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Avevo (Destra di Trebbia)	Barbagelata	1122	104	106	106	106	105	95	93	92	88		86	86	83	81	80	75	73	70	65	61	56	55	51	80	79	72		66	63	60	31	3	31					
	Brugnate	903	60	65	70	72	55	40	40	40	38	38	38	37	37	35	35	35	34	34	32	30	30	30	30	35	40	50	45	45	44	44	7	31						
	Magnasco	817	53	65	70	65	60	60	60	60	60	45	40	40	40	40	38	37	37	36	36	36	36	32	30	50	55	52	52	50	48	5	31							
	Grondone	1051	83	70	78	63	55	52	50	50	50	50	50	47	43	43	43	43	43	40	40	39	39	37	37	48	62	74	74	74	72	5	31							
NURE	Cassimirolo	800	62	72	72	77	72	70	65	63	60	59	58	56	55	48	48	47	47	46	46	46	45	44	58	72	79	75	73	66	6	31								
	Rigolo	700	47	55	57	59	57	55	50	49	48	45	41	39	39	39	38	38	37	36	36	28	28	26	47	65	66	65	60	57	7	31								
	Obolo	901	60	65	75	80	80	80	80	77	77	70	70	65	60	60	60	57	55	50	50	50	35	30	50	70	90	88	75	70	7	30								
	Pellizzano	1022	80	75	80	93	80	70	67	65	65	65	60	60	57	57	55	55	54	54	54	54	53	47	60	75	92	86	77	77	6	31								
ARDA	Morfasso	650	61	56	55	60	54	52	50	47	45	43	40	35	33	30	30	30	29	28	28	28	27	26	43	48	61	55	50	47	5	31								
	Villa Alberoni	205	18	15	14	15	12	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	5	5	25	53	50	18	47	4	31								
	Cisa (Roncazz)	970	70	80	80	75	75	75	75	75	72	72	70	70	65	65	63	63	60	58	58	58	55	50	62	70	75	70	70	64	5	31								
	Giarlette	900	40	60	75	75	73	70	70	70	70	70	68	65	64	60	55	53	51	49	46	46	44	39	35	50	55	51	47	44	6	30								
TARO	Berceto	800	40	44	49	50	41	35	30	29	26	26	24	24	20	19	18	18	18	17	17	17	17	11	25	40	47	40	35	34	7	31								
	Valdena	731	52	62	65	60	59	56	55	50	45	45	40	40	30	30	30	30	28	28	28	27	25	25	44	47	50	45	43	41	6	30								
	Boschi di Bardone	608	4	45	40	40	40	40	48	46	42	40	30	30	20	18	15	15	15	15	15	15	12	10	22	44	45	45	43	40</										

(Segue) Tab. X. — Precipitazioni nevose - Altezza giornaliera in centimetri.

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	1. ^a Decade										2. ^a Decade										3. ^a Decade										Numero giorni nevosi	Numero dei giorni di permanenza della neve sul suolo	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31
Leo	Montecreto	868	62	60	58	55	53	49	47	45	38	35	31	28	25	22	20	18	15	13	12	10	8	5	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	26
	Madonna dell' Acero	1180	120	146	143	140	134	126	120	117	113	108	102	95	93	90	85	87	85	82	79	75	70	69	65	62	50	48	46	43	37	30	27	30	
	Ospitale Fanano	936	145	151	150	146	142	140	135	130	122	105	90	85	82	80	79	77	75	73	70	68	66	65	60	54	50	45	40	35	20	10	5	30	
	Rocca Corneta	604	45	50	50	50	45	42	39	35	29	25	20	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
	Coscogno	536	35	34	32	30	29	27	24	20	16	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
PANARO Leo	Madonna dell' Acero	1180	22	19	16	25	20	50	45	41	32	28	20	12	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	Ospitale Fanano	1000	3	3	3	5	7	10	40	30	20	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
SECCHIA Dragone e Dolo (Destra di Secchia)	Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TREBBIA	Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
NURE	Retorto	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Rompeggio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
ARDA	Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TARO Ceno (Sinistra di Taro)	Cisa (Ronazzi)	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
PARMA	Marra	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

Aprile

Ottobre

Novembre

[illegible]

Sezione C) - IDROMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI E ABBREVIAZIONI

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tab. I. — Contiene l'elenco di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, comprese quelle - indicate in *corsivo* - delle quali, negli « Annali idrologici » P. I^a, non sono state pubblicate le osservazioni.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna sono indicate le altezze e le date della massima piena e della massima magra (se tali elementi possono ritenersi sicuramente attendibili); l'ora delle osservazioni; l'ente da cui essa dipende e che provvede al suo funzionamento; il cognome e il nome dell'osservatore.

Tab. II. — Riporta i valori medi mensili ed annuali dell'altezza idrometrica per gli idrometri più caratteristici che abbiano regolarmente funzionato nell'anno. È stampato in **grassetto** il valore medio mensile più elevato, in *corsivo* il più basso.

Tab. III. — Riporta i valori delle frequenze e delle durate delle altezze idrometriche giornaliere osservate durante l'anno a taluni idrometri dei tronchi inferiori dei maggiori corsi d'acqua.

Per il significato di *frequenza* e di *durata*, vedere la Terminologia relativa alla Sezione E - *Portate e bilanci idrologici* - del presente fascicolo.

Tab. IV. — Riporta, per alcune stazioni che sono fornite di idrometrografo o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle tre escursioni più elevate dell'altezza idrometrica, osservate nell'anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive.

Per ogni valore dell'escursione è riportata l'altezza idrometrica all'inizio dell'intervallo cui esso si riferisce, e l'ora e la data di tale inizio.

Tab. I.

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche.*

FIUME	STAZIONE	Anno Inizio osservazioni	Tipo dell'idrometro	CARATTERISTICHE										Ora della osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore	
				Bacino di dominio kmq.	Quota zero idrometrico	Massima piena		Massima magra		Piena ordinaria	Magra ordinaria	Portate medie stagionali ed annue					
						Altezza	Data	Altezza	Data			inverno	primavera	estate	autunno	anno	
(Segue) Serbia	S. Giacomo	1896	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte Bacchello (1)	1897	Ir	1250	21.470	8.58	10-XI-916	0.90	23-IX-915	5.45	1.27	33.3	39.1	4.6	25.0	25.5	Previdi Guido
	S. Martino	1896	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Concordia	1901	Ir	1250	15.750	10.22	11-XI-916	1.15	31-VII-906	6.04	1.90	—	—	—	—	—	Baraldi Antonio
	Bondanello sinistro	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bondanello destro	1851	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Quistello	1860	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Lucia	—	I	—	11.924	8.41	VI-917	—0.44	I-922	—	—	—	—	—	—	—	—
	Borsone	1851	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schiappa	1851	I	—	11.399	8.90	VI-917	—0.60	I-922	—	—	—	—	—	—	—	—
Panaro	Casone di Marano	1928	I	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Benazzati Adelmo
	Navicello	1897	Ir	960	21.02	10.05	22-XI-897	—1.33	31-XII-925	4.80	—0.35	—	—	—	—	—	Pederzoli Umberto
	Bomporto (2)	1903	Ir	960	18.43	8.00	4-XI-920	—1.07	19-IX-913	5.55	—0.33	27.0	35.1	2.4	28.9	23.3	Pignattari Noè
	Stuffione	1815	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Camposanto	1887	Ir	960	14.59	9.95	31-X-889	—1.47	9-VII-922	5.18	—1.00	—	—	—	—	—	Tommasini Giuseppe
	Caselle Bolognesi	1896	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Serraglio	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Botte Barana	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Carmagnola	1909	Ir	3830	227.846	4.75	15-IV-918	0.03	16-VII-922	2.10	0.44	—	—	—	—	—	Bonetto Giuseppe
	Moncalieri	1914	I	4885	215.649	4.90	15-IV-918	—0.43	4-IX-923	2.10	—0.20	—	—	—	—	—	Conti Matteo
Po	Torino	1909	Ir	5210	209.787	4.17	15-IV-918	—0.03	30-VII-922	1.98	0.13	—	—	—	—	—	Personale di Ufficio
	S. Mauro Torinese	1915	I	7408	201.781	3.77	24-IX-920	—0.10	10-IX-919	1.98	0.47	—	—	—	—	—	Bologna Emilio
	Chivasso	1906	I	8970	175.353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marchesi Giovanni
	Crescentino	1909	Ir	13090	146.076	5.79	24-IX-920	0.03	21-VIII-923	2.90	0.37	—	—	—	—	—	Bianco Giuseppe
	Casale Monferrato	1886	I	13940	107.222	5.55	25-IX-901	—1.30	27-VII-922	—	—	—	—	—	—	—	—
	P. Valenza	1884	Ir	17012	84.648	5.94	29-X-886	—0.62	21-IV-896	3.50	0.13	—	—	—	—	—	Giuliano Serafino
	Isola S. Antonio	1901	I	—	70.326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Massima piena assoluta m. 9.48 (23-X-1879)

(2) " " " m. 10.58 (13-XI-1862)

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche.*

FIUME	STAZIONE	Tipo dell'idrometro	Anno inizio osservazioni	CARATTERISTICHE										Ora della osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore		
				Racimo di dominio kmq.	Quota zero idrometrico	Massima piena		Massima magra		Magra ordinaria	Portate medie stagionali ed annue							
						Altezza	Data	Altezza	Data		inverno	primavera	estate	autunno	Anno			
(Segue) Po	P. Gerola	Ir	1928	27630	66.145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	R. U. I. Po	Lampugnani Francesco
	Corona	I	1886	—	62.910	7.98	18-V-926	-1.38	-VIII-922	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Pavia	—
	Ita	I	1886	—	57.541	6.98	18-V-926	-1.10	-VII-919	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Becca	Ir	1851	36770	55.103	7.88	18-V-926	-1.07	18-IV-854	0.15	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	Fortina Luigi
	Strada Nuova Olmetta	I	1890	—	50.663	8.48	18-V-926	-0.67	-IV-893	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Pavia	—
	Pievetta	I	1882	—	50.058	8.80	18-V-926	-0.32	-IX-920	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Piacenza	—
	Osteria Vecchia	I	1868	—	49.718	8.87	18-V-926	-0.97	-IV-896	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Pavia	—
	Reale	I	1886	—	48.212	8.57	18-V-926	-1.42	-IV-893	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Masero	I	»	—	45.792	9.57	18-V-926	-0.45	-IV-884	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Piacenza	—
	Piacenza	Ir	1869	42030	42.160	9.63	18-V-926	-0.65	15-IV-882	0.74	807	1133	919	1247	1020	»	R. U. I. Po	Tonello Sante
	Mortizza	I	1882	—	41.125	9.80	18-V-926	-0.59	-IV-882	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Piacenza	—
	Regona	I	1883	—	40.141	8.76	18-V-926	-0.50	-IV-896	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Milano	—
	Roncarolo	I	1882	—	38.462	9.35	18-V-926	-0.50	-IV-884	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Piacenza	—
	Isola Serafini	I	1900	—	36.132	8.38	18-V-926	-0.22	-IX-903	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Baroli	I	1900	—	34.955	7.94	-X-907	-1.34	-VIII-922	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Tinazzo	I	1882	—	34.609	6.84	-X-907	-1.34	-I-922	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Cremona	Ir	1868	50726	34.341	5.39	6-X-868	-2.45	15-I-922	2.60	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	Delindati Oreste
	Soazza	I	1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Cremona	—
	Polesine	I	1870	—	29.345	7.36	-X-868	-0.34	-V-907	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Parma	—
	Isola Pescaroli	I	1825	—	28.841	5.60	-X-857	-1.06	-IV-874	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Cremona	—
	Sacca	I	1870	—	23.375	7.24	3-VI-917	-0.27	-I-922	—	—	—	—	—	—	—	G. C. Parma	—
	Casalmaggiore	Ir	1850	53460	23.492	6.57	4-XI-928	-0.82	16-I-922	3.90	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	Favagrossa Ippolito
	Viadana	I	1869	—	21.612	6.32	3-VI-917	-0.83	-I-922	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Mantova	—
	Batteria	I	1864	—	19.945	7.72	3-VI-917	0.00	-V-917	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Reggio	—
	Baccanello	I	1864	—	18.155	8.40	3-VI-917	0.00	-V-917	—	—	—	—	—	—	»	idem	—
	Dosolo	I	1889	—	18.810	7.33	3-VI-917	-0.88	-IV-893	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Mantova	—
	Lazzara	I	1882	—	16.792	9.07	3-VI-917	0.00	-V-917	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Reggio	—
	Cizzolo	I	1873	—	16.955	8.45	3-VI-917	-1.48	-IV-893	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Mantova	—
	Torricella Madrone	I	1875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Reggio	—
	Roncocorrente	Ir	1875	62450	15.263	8.89	3-VI-917	-1.50	3-III-922	4.70	1198	1633	1362	1714	1480	»	R. U. I. Po	Benassi Giuseppe

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche.*

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche.*

FIUME	STAZIONE	Tipo dell'idrometro	Anno inizio osservazioni	CARATTERISTICHE											Ora della osservazione	Ente da cui dipende la Stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore		
				Bacino di dominio kmq.	Quota zero idrometrico	Massima piena		Massima magra		Piena ordinaria	Magra ordinaria	Portate medie stagionali ed annue							
						Altezza	Data	Altezza	Data			inverno	primavera	estate				autunno	Anno
(Segue) Po Grande	Moto Farsetti . . .	Ir	127	—	— 0.408	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	R. U. I. Po	—		
	Ca' Tiepolo . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Rovigo	—		
	Ca' Zuliani . . .	I	—	—	— 0.786	3.53	V-926	—	—	—	—	—	—	—	»	idem	—		
	Chiavica Tolle . . .	Ir	127	—	— 0.328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	—		
	Batteria Pila . . .	Ir	127	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	idem	—		
Po di Goro	Ariano Polesine . . .	I	1838	—	— 0.026	6.70	V-926	— 0.20	VII-870	—	—	—	—	—	»	G. C. Rovigo	—		
	Ariano Ferrarese . . .	I	1841	—	3.426	3.24	V-926	— 5.53	V-917	—	—	—	—	—	»	G. C. Ferrara	—		
	Ponte di Ariano . . .	Ir	117	—	3.385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	—		
	Mesola . . .	I	1823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Ferrara	—		
	Goro . . .	I	1873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	idem	—		
Po di Guerra	Goro . . .	Ir	1928	—	0.116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	—		
	Ca' Vendramin . . .	I	1871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	G. C. Rovigo	—		
Po di Tolle	Ca' Lattis . . .	Ir	128	—	— 0.210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	—		
	Giariette . . .	Ir	1928	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	R. U. I. Po	—		
Po di Maestra	Chianica Paja . . .	I	—	—	— 0.369	3.95	V-926	— 0.15	VII-870	—	—	—	—	—	»	G. C. Rovigo	—		

Tab. II.

Medie mensili: medie, massime, e minime annue delle altezze idrometriche.

FIUME	STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Media annua	Medfa del periodo 1901 1929	Scosta-mento dalla media	Valori annuali	
																	massimo	minimo
Trebbia	Valsigara	-0.23	-0.28	-0.13	0.00	0.23	0.21	-0.35	-0.33	-0.42	-0.26	-0.10	0.21	-0.12	0.05	-0.17	1.90	-0.44
	Ponte Lenzino	-0.01	0.17	0.17	0.28	0.35	0.12	-0.18	-0.21	-0.20	0.01	0.15	0.38	0.08	0.14	-0.06	1.80	-0.50
	S. Salvatore	0.20	0.16	0.35	0.48	0.80	0.37	0.20	0.29	0.13	0.32	0.45	0.73	0.37	0.47	-0.10	3.00	0.10
	Ponte Barberino	1.62	1.61	1.75	2.17	2.18	1.64	1.49	1.56	1.40	1.59	1.78	2.14	1.73	1.96	-0.23	5.00	1.36
Taro	Plan di Carniglia	0.39	0.34	0.39	0.41	0.51	0.34	0.29	0.28	0.24	0.30	0.41	0.61	0.37	0.37	0.00	1.40	0.20
	Borgo Val di Taro	0.57	0.51	0.62	0.63	0.66	0.47	0.29	0.33	0.41	0.47	0.62	0.89	0.54	0.35	+0.19	1.60	0.15
	Ostia	0.40	0.33	0.48	0.52	0.63	0.24	0.04	0.04	0.02	0.14	0.40	0.69	0.33	0.37	-0.04	1.50	0.00
	S. Quirico	1.85	1.79	2.03	1.94	2.04	1.37	1.29	1.31	1.30	1.40	1.67	2.13	1.68	1.78	-0.10	5.45	1.27
Parma	Baganzola	0.42	0.34	0.85	0.76	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	0.10	0.42	0.70	0.34	0.51	-0.17	3.50	0.00
	Colorno	0.92	1.01	1.19	1.14	1.11	0.85	0.69	0.61	0.69	0.80	0.98	1.14	0.93	1.24	-0.31	2.04	0.85
Enza	Lentigione	0.10	-0.13	0.68	0.57	0.33	-0.77	-0.93	-0.84	-0.83	-0.43	0.40	0.43	-0.12	0.44	-0.56	4.10	-0.98
	Ponte Portine	0.39	0.29	0.77	0.30	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.36	0.29	0.22	0.38	-0.16	2.24	0.00
Secchia	Castellarano	2.73	2.64	2.86	2.87	2.62	2.45	2.37	2.38	2.22	2.46	2.78	2.75	2.60	2.69	-0.09	3.12	2.26
	P. Bacchello	1.96	1.81	2.26	2.28	1.96	1.38	1.32	1.30	1.29	1.42	2.10	1.72	1.73	1.81	-0.08	3.76	1.27
	Concordia	2.69	2.76	3.23	2.83	2.47	1.81	1.67	1.63	1.60	1.80	2.63	2.40	2.29	2.56	-0.27	4.36	1.56
Pararo	Casone di Marano	0.57	0.42	0.81	0.89	0.83	0.43	0.32	0.29	0.26	0.47	0.91	0.81	0.58	0.45	+0.13	1.80	0.18
	Navicello	0.23	-0.19	0.98	0.73	0.55	-0.75	-1.08	-1.10	-1.06	-0.71	0.76	0.80	-0.07	0.17	-0.24	3.26	-1.18
	Bomporto	1.00	0.70	1.86	1.63	1.46	0.09	-0.18	-0.19	-0.17	0.23	1.44	1.09	0.75	0.57	+0.18	4.74	-0.26
	Camposanto	0.27	-0.11	1.27	0.92	0.70	-0.61	-1.01	-1.03	-0.85	0.31	1.04	0.46	0.11	0.08	+0.03	3.65	-1.10

(Segue) Tab. II. — Medie mensili; medie, massime e minime annue delle altezze idrometriche.

FIUME	STAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	Media annua	Media del periodo 1901-1929	Sosta-mento dalla media	Valori annuali	
																	massimo	minimo
Po	Carmagnola	0.48	0.40	0.54	0.39	0.61	0.56	-0.08	0.22	0.24	0.31	0.33	0.30	0.36	0.72	-0.36	1.30	-0.13
	Moncalieri	-0.16	-0.23	-0.09	-0.26	-0.08	-0.10	-0.42	-0.38	-0.36	-0.36	-0.34	-0.31	-0.26	0.20	-0.46	0.54	-0.50
	Torino	0.36	0.29	0.40	0.24	0.47	0.50	0.10	0.16	0.19	0.32	0.31	0.25	0.31	0.50	-0.19	1.30	0.04
	S. Mauro Torinese	0.33	0.16	0.37	0.21	0.47	0.57	0.04	0.13	0.09	0.23	0.20	0.17	0.25	0.63	-0.38	1.42	0.00
	Ponte Crescentino	0.53	0.47	1.07	0.69	0.95	1.47	0.64	0.76	0.46	0.57	0.88	0.88	0.69	1.00	-0.31	2.90	0.17
	Ponte Valenza	0.26	0.12	0.55	0.35	0.80	0.91	0.27	0.46	0.39	0.54	0.25	0.24	0.43	0.79	-0.36	2.20	-0.10
	Ponte Gerola	-1.06	-1.25	-0.78	-1.15	-0.43	-0.51	-1.57	-1.10	-1.31	-0.84	-1.16	-0.95	-1.01	-0.69	-0.32	0.90	-1.84
	Becca	0.16	0.07	0.47	0.35	1.38	1.18	0.18	0.54	0.19	0.93	0.52	0.60	0.54	1.30	-0.76	2.62	-0.10
	Piacenza	1.01	0.78	1.11	0.86	2.16	1.90	0.85	1.25	0.83	1.63	1.29	1.44	1.25	1.90	-0.65	3.45	0.55
	Cremona	-1.46	-1.78	-1.40	-1.62	-0.46	-0.67	-1.66	-1.12	-1.59	-0.87	-1.08	-0.88	-1.21	-0.34	-0.87	0.50	-1.98
	Casalmaggiore	0.29	-0.10	0.49	0.19	1.35	1.12	0.09	0.73	0.27	1.00	0.80	1.00	0.60	1.22	-0.62	2.29	-0.25
	Roncocorrente	0.37	0.20	0.58	0.25	1.55	1.12	-0.14	0.65	0.09	1.01	0.95	1.18	0.65	1.38	-0.73	2.70	-0.62
	Revere	0.66	0.09	0.79	0.33	1.83	1.34	0.16	0.63	-0.04	1.02	1.02	1.28	0.73	1.72	-0.99	2.96	-0.69
	Pontelagoscuro	-3.58	-3.60	-3.36	-3.81	-2.53	-3.03	-4.47	-3.76	-4.36	-3.41	-3.30	-3.10	-3.53	-2.67	-0.86	-1.35	-4.99

CROSTOLO

Massimi incrementi delle altezze idrometriche.

Tab. IV.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	1 ora										6 ore										12 ore															
		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale		Inizio		Eскурzione		Altezza idrometrica iniziale	
		data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora		
Po	Crescentino . . .	0.26	0.50	6 III	8.30	0.20	1.65	12 VI	18	0.15	0.52	3 V	20	0.60	1.65	12 VI	18	0.50	0.52	3 V	20	—	—	1.40	1.65	12 VI	18	—	—	1.40	1.65	12 VI	18	—	—		
	Valenza . . .	0.48	0.08	30 IV	8	0.10	0.24	6 III	21	0.08	1.62	13 VI	4	0.78	0.08	30 IV	8	0.68	0.62	8 X	2	0.54	0.76	3 V	21	0.92	0.08	30 IV	8	0.84	0.76	3 V	21	0.84	0.62	8 X	2
	Becce . . .	0.14	0.06	10 VIII	8	0.11	1.26	8 X	10	0.11	1.28	4 V	4	0.64	1.26	8 X	10	0.64	0.06	10 VIII	8	0.54	1.28	4 V	4	1.00	0.06	10 VIII	8	0.96	1.28	4 V	4	0.82	1.26	8 VIII	10
	Pianezza . . .	0.10	1.18	14 IV	16	0.07	1.68	3 V	21	0.06	2.20	13 VI	21	0.60	1.18	14 IV	16	0.45	2.20	13 VI	21	0.42	1.68	3 V	21	1.00	2.20	13 VI	21	0.90	2.00	8 X	18	0.80	1.40	10 VIII	22
	Cernaia . . .	0.06	0.46	9 X	5	0.05	1.52	14 V	6	0.04	1.60	4 V	18	0.36	0.46	9 X	5	0.34	1.52	14 V	6	0.24	1.60	4 V	6	0.56	0.46	9 X	5	0.52	1.52	14 V	6	0.50	1.60	4 V	18
	Casalmaggiore . . .	0.07	1.60	5 V	12	0.06	1.30	15 VI	2	0.06	0.44	11 VIII	12	0.38	0.44	11 VIII	12	0.36	1.30	15 VI	2	0.31	0.54	8 X	8	0.80	0.44	11 VIII	12	0.62	1.30	15 VI	2	0.56	0.54	8 X	8
	Roncaferrenta . . .	0.10	0.44	27 XII	18	0.06	1.95	13 VIII	12	0.06	1.46	14 VI	6	0.56	0.44	27 XII	18	0.36	1.95	13 VIII	12	0.36	1.46	14 VI	6	0.96	0.44	27 XII	18	0.70	1.95	13 VIII	12	0.64	1.46	14 VI	6
	Bevere . . .	0.08	0.60	28 XII	0	0.06	0.06	12 VIII	6	0.06	1.60	15 VI	12	0.50	0.60	28 XII	0	0.36	0.06	12 VIII	6	0.36	1.60	15 VI	12	0.90	0.06	12 VIII	6	0.88	0.60	28 XII	0	0.70	1.60	15 VI	12
	Pontelagoscuro . . .	0.06	3.94	13 VIII	0	0.05	3.50	28 XII	12	0.04	3.36	3 XI	0	0.34	3.94	13 VIII	0	0.32	3.50	28 XII	18	0.26	3.36	3 XI	0	0.82	3.94	13 VIII	0	0.54	3.50	28 XII	12	0.48	3.36	3 XI	0
	Ponte Barbosino . . .	0.65	3.14	4 V	14	0.30	2.88	13 IV	14	0.30	1.88	26 XII	20	3.75	3.14	4 V	14	1.60	2.88	13 IV	10	1.20	1.88	26 XII	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taro	S. Quirico . . .	0.73	1.68	27 XII	5	0.50	1.82	6 XII	14	0.39	2.68	4 V	0	4.17	1.68	27 XII	5	2.64	1.82	6 XII	14	2.00	2.68	4 V	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte Barchello . . .	0.30	2.10	2 XI	4	0.27	2.00	18 XI	2	0.18	2.28	4 V	2	1.62	2.10	2 XI	4	1.20	2.00	18 XI	2	0.74	2.28	4 V	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchia	Canardia . . .	0.22	2.58	18 XI	18	0.18	2.35	1 XII	10	0.12	2.38	4 V	2	1.30	2.58	18 XI	18	0.85	2.35	1 XII	10	0.66	2.38	4 V	2	1.72	2.58	18 XI	18	0.85	2.38	4 V	2	—	—	—	—
	Navicello . . .	0.80	1.56	16 V	16	0.67	0.56	27 XII	5	0.60	0.68	18 XI	10	4.00	0.56	27 XII	5	2.22	0.68	18 XI	10	1.80	1.10	19 X	23	5.34	0.56	27 XII	5	4.08	0.68	18 XI	10	—	—	—	—
Panaro	Bomparto . . .	0.70	0.52	27 XII	6	0.50	1.70	16 V	8	0.45	1.54	18 XI	8	3.50	0.52	27 XII	6	2.66	1.54	18 III	8	2.58	1.70	16 V	8	5.70	0.52	27 XII	6	3.86	1.54	18 XI	8	—	—	—	—
	Camposanto . . .	0.60	0.00	27 XII	10	0.40	1.45	18 XI	12	0.40	2.89	16 V	12	4.00	0.00	27 XII	10	2.20	2.89	16 V	12	—	—	—	—	4.64	0.00	27 XII	10	—	—	—	—	—	—	—	—

Sezione D) - FREATIMETRIA

SEGNi CONVENZIONALI E ABBREVIAZIONI

Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tab. I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freaticmetriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, e per le quali negli « Annali idrologici » P. I^a, sono state pubblicate le osservazioni periodiche.

Le stazioni sono ordinate come negli « Annali idrologici » P. I^a. Per ognuna sono indicati: il tipo e la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento, l'anno dell'inizio del funzionamento, il cognome e il nome dell'osservatore.

Tab. II. — Riporta i valori medi mensili ed annuali dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. La media mensile più elevata è stampata in **grassetto**, la più bassa in *corsivo*.

Sono riportati, inoltre, i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione massima, che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

Le altezze freaticmetriche sono riferite al caposaldo posto su ciascun pozzo.

Le osservazioni vengono eseguite nei giorni 2, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 25 e 28 di ogni mese.

Sono contrassegnate con un asterisco le stazioni che si riferiscono a pozzi dai quali, di regola, non si effettua alcun attingimento.

Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche.

Tab. I.

STAZIONI	Anno inizio osserva- zioni	Quota del riferimento	Profondità massima osservata	Data	Profondità minima osservata	Data	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONI	Anno inizio osserva- zioni	Quota del riferimento	Profondità massima osservata	Data	Profondità minima osservata	Data	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Pozzolo Formigaro	1914	165.65	5.55	5-6-917	17.10	2-12-922	Marchetti Carlo	Ramlola	1927	150.34	9.15	8-4-928	11.85	22-11-929	Scagliola Giuseppe
Tortona	1914	114.80	13.25	15-11-926	14.82	17-10-916	Costa Luigi	Pelegara Taro . .	1927	119.12	7.82	12-4-928	11.69	2-11-929	Squeri Giuseppe
Pontecurone . .	1920	101.80	11.34	2-5-927	20.78	5-12-924	Baldi Angiolo	Castelguelfo . . .	1914	63.81	5.15	27-4-917	9.75	8-1-923	Avanzini Romolo
Voghera	1914	93.34	9.77	6-4-917	20.55	(<i>asciutto</i>)	Gilardenghi Attilio	Roccabianca . . .	1914	32.59	1.78	15-12-916	4.94	2-9-922	Pizzuto Antonio
Bressana	1914	66.71	2.52	9-3-915	5.69	5-9-922	Gandini Luigi	S. Secondo Parm.	1914	37.13	2.55	15-12-916	6.45	(<i>asciutto</i>)	Magni Gino
Mezzanino . . .	1914	60.19	0.71	2-12-926	4.00	2-2-922	Domenici Nazzareno	Fornovo	1927	155.23	3.43	2-4-928	4.35	12-10-929	Galbulli Ettore
Stradella	1914	76.55	4.70	9-3-915	9.95	15-7-928	Pini Cesare	Collecchio	1914	110.42	18.47	30-3-917	24.00	15-9-927	Nelli Felice
Calendasco . . .	1914	53.11	1.81	1-6-917	6.22	(<i>asciutto</i>)	Molinari Alberto	S. Quirico	1927	36.09	1.15	2-4-928	6.00	18-10-929	Grossi Maria
Sarmato	1914	68.36	7.37	6-4-917	11.27	2-8-929	Fortunati Cesare	Sala Baganza . . .	1927	176.96	9.60	8-4-928	11.63	15-8-928	Ghirini Narciso
S. Lazzaro Alberoni	1914	56.34	5.12	12-4-928	11.55	2-9-922	Piga Giulio	S. Ruffino	1927	111.90	4.17	5-4-928	10.57	(<i>asciutto</i>)	Molinari D. Giovanni
S. Giorgio Piacent.	1914	104.23	4.00	10-9-916	9.82	(<i>asciutto</i>)	Peroncini Giacomo	Fraore	1927	56.32	6.50	28-4-928	10.14	2-11-929	Passalunghi Mario
Pontenure	1927	66.16	1.92	5-4-928	7.30	2-12-929	Salomoni Oreste	Felino	1927	184.30	3.10	5-4-928	8.90	8-9-929	Zanella Luigi
Sannazzaro . . .	1927	42.34	1.32	2-4-928	5.36	28-7-929	Doneneghetti Archim.	S. Martino Sinzano	1927	118.04	2.65	15-11-928	4.85	18-10-929	Tanzi Luigina
Alseno	1915	72.60	*	—	*	—	Bertoli Massimo	Bivio Cristo . . .	1927	46.42	1.32	8-4-928	2.28	18-10-929	Pastori Achille
Fiorenzuola d'Arda	1914	75.52	*	—	*	—	Chierici Carlo	Colorno	1914	30.57	0.93	23-2-915	8.88	22-9-925	Pavesi Enea
Villanova d'Arda .	1927	41.09	5.70	28-4-928	6.60	5-12-929	Testa Guglielmo	Monticelli Bagni .	1927	127.60	12.93	2-6-929	14.45	5-10-929	Orsini D. Giuseppe
Mezzano Chitanto	1914	41.13	2.70	8-6-917	6.47	15-2-922	Faccioli Primo	S. Lazzaro Parm.	1927	54.00	1.74	25-4-928	7.10	12-10-929	Dazzi Oreste
Busseto	1914	41.80	1.23	12-2-925	7.92	25-9-923	Broccoli Alberto	Montecchio	1927	98.42	4.76	12-4-928	7.36	12-9-928	Martini Antonio
Fidenza	1914	75.12	2.91	30-4-918	8.80	(<i>asciutto</i>)	Amaducci Angelo	S. Ilario d'Enza .	1914	53.61	3.32	26-3-917	9.10	18-1-922	Martelli Terrenzio
Zibello	1914	35.19	2.56	8-12-920	5.65	(<i>asciutto</i>)	Forti Geom. Ettore	Brescello (1) . . .	1914	23.65	+ 0.29	5-6-917	2.86	22-9-923	Zanuzzi Emanuele
Samboseto	1925	32.79	0.71	2-4-928	4.68	2-9-926	Bergamaschi Edoardo	Cavriago	1927	83.29	12.59	18-4-928	12.70	28-8-929	Bozzani D. Giuseppe

(1) Il punto di riferimento è a quota inferiore al massimo livello

(Segue) Tab. I. — *Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche.*

STAZIONI	Anno inizio osserva- zioni	Quota del riferimento	Profondità massima osservata	Data	Profondità minima osservata	Data	COGNOME E NOME dell'Osservatore	STAZIONI	Anno inizio osserva- zioni	Quota del riferimento	Profondità massima osservata	Data	Profondità minima osservata	Data	COGNOME E NOME dell'Osservatore
Villa Cadè	1927	44.22	4.22	25-4-928	7.20	5-9-929	Anteschi Virginio	Carpi	1914	26.53	1.35	5-9-918	5.89	28-2-920	Tavernari Dorina
Montecavolo . . .	1927	135.60	4.90	5-4-928	12.70	18-10-929	Reggiani Danto	S. Benedetto Po . .	1914	18.47	3.10	5-6-917	6.24	(asciutto)	Olivari Romolo
Reggio Emilia . .	1914	52.90	2.01	7-12-917	4.74	25-12-921	Panciroli Renato	Marzaglia	1928	52.29	1.94	2-4-928	6.01	28-10-926	Romiti Rodolfo
Cadelbosco Setto .	1914	27.25	0.72	25-2-923	3.85	5-9-927	Bonini Generoso	Formigine	1928	80.86	23.40	18-11-928	25.43	28-12-929	Grosoli Dante
Qualtieri	1914	22.97	1.00	19-1-917	5.96	28-9-922	Rovesti Peppino	Maranello	1928	129.48	3.10	28-3-928	8.10	18-8-929	Caselli Arrigo
Villa Ospizio . . .	1927	52.75	2.30	2-4-928	4.60	15-9-928	Catellani Ugo	Modena	1928	36.42	0.95	12-11-929	4.20	12-9-929	Bulgarelli Eugenio
Scandiano	1920	70.20	10.82	2-6-929	14.97	28-3-928	Busani Adelco	Concordia	1914	22.88	3.48	15-12-916	6.15	2-10-927	Baraldi Antonio
Pieve Rossa Bagnolo	1914	32.45	1.64	2-5-921	4.53	12-10-929	Mora Giovanni	Poggio Rusco . . .	1914	13.38	1.34	19-1-917	9.28	28-8-921	Borsari Francesco
Novellara	1914	22.15	1.37	12-2-915	10.12	22-9-925	Vezzani Mario	Revere	1914	15.91	3.14	8-6-917	7.32	25-1-922	Zanchi Otello
Castellarano . . .	1928	157.88	4.56	12-4-928	7.55	5-11-929	Munari Luigi	Mirandola	1914	16.38	*	—	*	—	Caleffi Raffaele
Luzzara	1914	18.00	1.18	5-12-920	3.60	28-10-923	Bacchi Guido	Camposanto	1914	20.11	3.70	20-5-917	9.06	28-9-926	Tommasini Giuseppe
Rubiera	1914	50.42	0.95	16-1-917	4.60	8-11-923	Cacciari Celso	Crevalcore	1914	18.24	0.85	8-5-921	6.00	18-8-920	Cattabriga Silverio
Correggio	1914	32.70	1.34	29-6-915	6.34	22-10-923	Menozzi Giuseppe	Sermide	1914	12.98	1.50	5-12-926	6.13	(asciutto)	Cavicchini Vittorio
Rio Saliceto . . .	1915	22.66	1.00	23-2-915	3.94	28-8-926	Bartoli Andrea	Boadeno	1914	10.34	2.05	28-10-928	8.90	28-8-922	Rossi Giuseppe
Gonzaga	1914	19.35	1.70	16-1-917	6.00	25-8-928	Bago Riccardo	Saliceto sul Panaro	1928	34.92	1.46	2-4-928	4.83	12-9-928	Tunini Cleto
Rolo	1914	19.34	0.90	26-1-917	5.85	18-9-926	Razzini Guglielmo	Castelfranco	1914	38.88	0.95	2-5-921	1.98	1-8-916	Dallari Oreste

Tab. II. Medie, massime e minime mensili, stagionali ed annue; escursioni mensili,

BACINI	Stazioni	Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno			Luglio			Agosto		
		media	massima	minima	escursione	media	massima	minima	escursione	media	massima	minima	escursione	media	massima	minima	escursione	media	massima	minima	escursione	media	massima	minima	escursione
Scrivia - Trebbia	Pozzolo Formigaro	7.97	7.90	8.10	0.20	8.23	8.00	8.40	0.40	8.32	8.20	8.63	0.43	8.68	8.65	8.70	0.05	8.97	8.70	9.34	0.64	9.34	9.38	10.35	0.97
	Tortona	14.36	14.35	14.39	0.04	14.35	14.35	14.35	0.00	14.39	14.36	14.40	0.04	14.39	14.38	14.40	0.02	14.33	14.25	14.37	0.12	14.06	13.95	14.20	0.25
	Pontecurone	17.35	17.25	17.42	0.17	17.23	17.20	17.26	0.06	17.15	17.00	17.24	0.24	16.96	16.89	17.06	0.17	16.97	16.84	17.05	0.21	16.93	16.75	17.16	0.41
	Voghera	17.75	17.65	17.90	0.25	17.84	17.65	17.95	0.30	17.25	16.80	17.65	0.85	16.94	16.75	17.10	0.35	16.94	16.90	17.05	0.15	17.28	17.00	17.55	0.55
	Bressana	4.65	4.54	4.77	0.23	4.82	4.78	4.87	0.09	4.73	4.66	4.79	0.13	4.82	4.72	4.90	0.18	4.92	4.87	4.97	0.10	5.08	4.99	5.15	0.16
	Mezzanino	2.04	1.85	2.26	0.41	2.50	2.31	2.64	0.33	2.34	2.25	2.53	0.28	2.44	2.30	2.51	0.21	2.54	2.52	2.59	0.07	2.70	2.67	2.73	0.06
	Stradella	8.72	8.68	8.80	0.12	8.81	8.71	8.87	0.16	8.70	8.62	8.89	0.27	8.77	8.69	8.81	0.12	7.96	7.74	8.66	0.92	7.76	7.74	7.79	0.05
	Calendasco	3.87	3.75	3.99	0.24	4.15	4.05	4.22	0.17	3.99	3.90	4.19	0.29	3.94	3.90	4.00	0.10	3.62	3.45	3.99	0.54	3.44	3.35	3.60	0.25
	Sarmato	9.60	9.52	9.70	0.18	9.75	9.70	9.85	0.15	9.68	9.62	9.80	0.18	9.68	9.64	9.70	0.06	9.59	9.53	9.66	0.13	9.84	9.56	10.12	0.56
Trebbia - Taro	S. Lazzaro Alberoni	10.48	10.38	10.62	0.24	10.82	10.61	10.96	0.35	10.81	10.58	11.09	0.51	10.82	10.54	11.08	0.54	10.95	10.87	11.04	0.17	7.61	7.45	7.84	0.39
	S. Giorgio Piacentino	5.83	5.75	5.92	0.17	5.90	5.80	5.95	0.15	5.64	5.51	5.90	0.39	5.75	5.58	5.85	0.27	5.68	5.57	5.80	0.23	5.66	5.50	5.83	0.33
	Pontenure	5.90	5.70	6.10	0.40	5.64	5.60	5.68	0.08	4.67	4.05	5.65	1.60	4.23	4.10	4.36	0.26	4.60	4.45	4.90	0.45	5.56	5.15	5.90	0.75
	Sannazzaro	4.73	4.45	4.82	0.37	5.05	4.87	5.17	0.30	5.04	4.90	5.18	0.28	4.90	4.53	5.02	0.49	4.34	4.07	4.86	0.79	4.22	4.03	4.40	0.40
	Alseno	10.63	10.40	10.80	0.40	10.56	10.38	10.80	0.42	10.53	10.20	10.81	0.61	10.19	10.15	10.18	0.13	10.23	10.15	10.30	0.15	10.44	10.33	10.60	0.27
	Florenzuola d'Arda	13.07	13.00	13.12	0.12	12.98	12.91	13.02	0.11	13.09	13.02	13.14	0.12	12.32	11.84	12.93	1.09	12.95	11.85	12.18	0.33	12.37	12.20	12.57	0.37
	Villanova d'Arda	6.20	6.18	6.20	0.02	6.20	6.20	6.20	0.00	6.16	6.16	6.20	0.04	6.09	6.08	6.10	0.02	6.11	6.10	6.13	0.03	6.16	6.10	6.25	0.15
	Mezzano Chitanello	5.22	5.08	5.37	0.29	5.55	5.42	5.69	0.27	5.69	5.63	5.74	0.11	5.74	5.68	5.80	0.12	5.65	5.47	5.83	0.36	5.45	5.41	5.48	0.07
	Busseto	5.11	4.90	5.55	0.65	5.41	5.05	5.55	0.50	4.45	4.05	5.00	0.95	4.75	4.60	4.85	0.25	5.08	4.91	5.29	0.38	6.06	5.25	6.73	1.48
	Fidenza	5.36	5.01	5.77	0.76	4.76	4.55	4.96	0.41	4.32	4.25	4.47	0.22	4.73	4.47	5.08	0.61	5.51	5.14	5.86	0.72	6.37	5.97	6.79	0.82
	Zibello	4.80	4.66	4.92	0.26	5.10	4.98	5.18	0.20	4.97	4.83	5.10	0.26	4.92	4.81	5.10	0.24	4.88	4.80	4.96	0.16	5.20	4.99	5.39	0.40
	Samboseto	1.70	1.38	1.88	0.50	1.96	1.67	2.07	0.40	1.11	0.76	1.48	0.72	1.57	1.42	1.72	0.30	1.96	1.77	2.26	0.49	3.19	2.51	3.50	0.99
	Ramola	9.54	9.48	9.60	0.12	9.50	9.42	9.60	0.18	9.45	9.35	9.58	0.23	9.55	9.48	9.60	0.12	9.62	9.55	9.70	0.15	9.77	9.72	9.80	0.08
	Felegara Taro	9.73	9.57	10.00	0.43	9.78	9.63	9.91	0.28	9.46	9.20	9.93	0.73	9.41	9.21	9.60	0.39	9.89	9.65	10.10	0.45	10.27	10.15	10.38	0.23
	Castelguelfo	7.24	7.23	7.28	0.05	7.21	7.20	7.22	0.02	7.27	7.23	7.29	0.06	7.32	7.30	7.34	0.04	7.35	7.34	7.36	0.02	7.42	7.38	7.46	0.08
	Roccabianca	3.45	3.31	3.56	0.25	3.78	3.60	3.90	0.30	3.58	3.30	3.80	0.50	3.52	3.40	3.60	0.20	3.63	3.55	3.70	0.15	3.82	3.70	3.95	0.25

E) - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI


TERMINOLOGIA

1. — *Portata* in una sezione e in un dato istante ($mc/sec.$): volume d'acqua che attraversa la sezione durante la unità di tempo che comprende quell'istante.
2. — *Contributo* (o *portata unitaria*) relativo ad una determinata sezione ed a un dato istante ($l/sec.$, $kmq.$): quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — *Portata media* in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.
4. — *Modulo* in una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.
6. — *Frequenza di una determinata portata Q* (o *di una determinata altezza idrometrica H*) in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui, nella sezione, si è verificata la portata Q (o l'altezza idrometrica H).
7. — *Durata di una determinata portata Q* (o *di una determinata altezza idrometrica H*) in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q (o una altezza idrometrica non inferiore ad H).
8. — *Portata semipermanente* in una sezione ed in dato intervallo di

tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata eguale a metà dell'intervallo).


9. — *Portata semiannuale di un anno determinato*: la portata semi-permanente di quell'anno.
10. — *Deflusso* in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo ($mc.$): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
11. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo ($mm.$): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
12. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno ($mc.$): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
13. — *Deflusso unitario* relativo ad una determinata sezione e in un dato intervallo di tempo ($mm.$): quoziente del deflusso nell'intervallo per l'area del bacino sotteso dalla sezione.
14. — *Perdita apparente* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza tra l'altezza di afflusso e l'altezza di deflusso spettanti all'intervallo.
15. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso spettanti all'intervallo.

TREBBIA a S. SALVATORE



Caratteristiche della stazione:

- Estensione del bacino: Km. q. 619 — Altitudine media m. 956 sul m. m. — Distanza dalla foce in Po: Km. 60 — Aforo nella sezione di misura praticamente stabile con fondo di ghiaia e sponde rocciose.
- Idrometro di riferimento: nella località in sponda destra. — Quota dello zero m. 283.52 sul m. m.



- Stazione di misura: presso l'idrometro di riferimento. — La stazione è attrezzata con teleferica manovrata da sponda per la misura di portata di piena.

Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 31, cioè una in più rispetto a quelle dell'anno precedente; quelle che forniscono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoteie furono 30 cioè 3 in più delle analoghe del 1928. La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 1343, inferiore di mm. 411 rispetto a quella dell'anno precedente.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1914, fu di mm. 1743 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di mm. 400 ossia del 23% al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione per l'anno in esame è superiore di mm. 467 a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pagina 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpì nel 1929 il 38.2% del bacino, contro il 15.5% verificatosi nel 1928 e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpì rispettivamente nei due anni il 57.0% ed il 56.8% del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 1200 e mm. 1400 col 17.3% mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1400 e mm. 1600 col 23.3%; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2200 e mm. 3300.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel maggio con mm. 241 e la minima nel marzo con mm. 3 — detti valori rappresentano rispettivamente il 17.9% ed il 0.2% della precipitazione totale dell'anno.


Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1914-1928.

PRECIPITAZIONI in mm.		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	.	71	21	3	153	241	94	30	132	28	184	171	215
normali	.	122	140	187	157	131	100	69	66	161	217	229	164
sostanziale della normale		— 51 — 119 —	— 184 —	— 4 — 110 —	— 6 — 39 —	— 66 — 133 —	— 33 — 58 —	— 51 —					

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che, mentre nel complesso le precipitazioni furono nel 1929 notevolmente inferiori a quelle dell'anno medio, nel semestre estivo esse rimasero quasi eguali a quelle normali in valore assoluto, e le superarono in quello proporzionale, infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazioni semestre estivo mm.	678	684
Frazione della precipit. annuale	50.5 %	39.3 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi della Trebbia a S. Salvatore nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino, con avvertenza che i valori stessi non corrispondono in tutto a quelli pubblicati nella 1.^a parte degli annali per il 1929 perchè delle misure effettuate successivamente hanno consigliato alcune modificazioni alla scala di portata nel tratto che era desunto per estrapolazione. — I nuovi valori adottati per detta scala appaiono nell'unito disegno.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: maggio, *mc/sec.* 519.000.
deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 144.0.
contributo unitario massimo: maggio, *l/sec. kmq.* 888.4.
portata minima: febbraio, settembre e ottobre, *mc/sec.* 3.270.
deflusso mensile minimo: settembre, con *milioni mc.* 9.4.
contributo unitario minimo: febbraio, settembre e ottobre, con *l/sec. kmq.* 5.3.
portata media annuale (modulo): *mc/sec.* 16.900.
deflusso medio mensile: *milioni mc.* 44.9.
deflusso annuo: *milioni mc.* 538.6.
contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 27.3.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 16.6 ossia del 49.5 %, a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 23.4 %. — Il modulo normale (periodo 1923-1928) è di *mc.* 32.6 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 15.7 ossia del 48.2 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	15.3	49.5
» » » e medio	3.2	3.4
» » » minimo e medio	0.2	0.07
fra contributo unitario massimo e minimo	158.2	481.6
» » » e medio	30.7	28.5
» » » minimo e medio	0.2	0.06

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 0.0 e *mc/sec.* 9.9 con giorni 227.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.65, inferiore a quello verificatosi nel 1928 e inferiore del 30 % a quello medio del periodo 1923-28 che fu di 0.94. Da notare però che quest'ultimo è probabilmente errato in eccesso per minore esattezza della scala di portata precedentemente adottata.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.50, primavera 0.94, estate 0.46, autunno 0.32.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a raffronto col valore medio del periodo 1923-28 e definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
1929	0.30	0.76	14.3	0.63	0.97	0.48	0.70	0.39	0.53	0.27	0.37	1.00	0.05
medio	0.67	1.32	0.83	0.94	1.05	0.33	0.42	0.30	0.33	0.98	2.08	0.70	0.94

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico della Trebbia a S. Salvatore è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 0.37, inferiore di *m.* 0.04 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di 0.41 relativa al periodo 1923-1928.

La massima altezza media mensile si verificò in maggio con *m.* 0.80 la minima in settembre con *m.* 0.13. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1923-1928.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	0.20	0.16	0.35	0.48	0.80	0.37	0.20	0.29	0.13	0.32	0.45	0.73
normali	0.47	0.59	0.61	0.63	0.46	0.30	0.22	0.16	0.24	0.49	0.84	0.50
scostamento dalla normale .	-0.27	-0.43	-0.26	-0.15	+0.34	+0.07	-0.02	+0.13	-0.11	-0.17	-0.39	+0.23

La massima altezza meridiaiana si ebbe il giorno 3 maggio con *m.* 3.00, la minima nei giorni 28 settembre a 4 ottobre con *m.* 0.10. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 2.90 occupando il 64 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 127 nell'intervallo compreso fra *m.* 0.00 e *m.* 0.19.

Torbide. — Attraverso la sezione di S. Salvatore passarono nel 1929 *migliaia mc.* 957.6 di torbide valutate per decantazione che si possono ritenere corrispondenti a *migliaia ton.* 1400 di materia asciutta.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di maggio con *migliaia mc.* 558.0, si ebbe apporto nullo nei mesi gennaio, febbraio, marzo, verificandosi il minimo in settembre con *migliaia mc.* 1.1. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 1547 (circa *ton.* 2300) per *knq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni	da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
0.0	9.9	170	179	227	365	170	179	2	7		
10	19.9	180	189	74	138	180	189	1	5		
20	29.9	190	199	30	64	190	199	—	4		
30	39.9	200	209	12	34	200	209	1	4		
40	49.9	210	219	4	22	210	219	1	3		
50	59.9	220	229	2	18	220	229	—	2		
60	69.9	230	239	4	16	230	239	1	2		
70	79.9	240	249	1	12	240	249	—	2		
80	89.9	250	259	—	11	250	259	—	1		
90	99.9	260	269	2	11	260	269	—	1		
100	109.9	270	279	2	9	270	279	—	1		
110	119.9	280	289	—	7	280	289	—	1		
120	129.9	290	299	—		290	299	—	1		
130	139.9	300	309	—		300	309	—	1		
140	149.9	310	319	—		310	319	—	1		



Tabella riassuntiva del regime del bacino della Trebbia a S. Salvatore e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Kmq.			Deflusso		Torbidità specifica cmc/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media mc/Kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso		
	media	massima	minima	media	massima	minima	medio	massimo	minimo	milioni di mc.	‰	media	massima	minima	migliaia mc.	‰		mm.	‰	mm.	‰			
Dicembre 1928	0.28	0.62	0.18	7.440	20.600	4.410	12.0	33.4	7.1	19.9	—	—	—	—	—	—	—	47	—	32	—	0.53		
Gennaio 1929	0.20	0.28	0.16	4.810	6.840	4.020	8.8	11.0	6.5	12.9	2.4	0	0	0	0	0.0	0.0	71	5.3	21	2.4	0.30		
Febbraio	0.16	0.33	0.10	4.130	8.530	3.270	6.7	13.8	5.3	10.0	1.8	0	0	0	0	0.0	0.0	21	1.6	16	1.8	0.76		
Marzo	0.35	0.56	0.17	9.930	20.300	4.190	16.0	32.8	6.8	26.6	5.0	0	0	0	0	0.0	0.0	3	0.2	43	5.0	14.3		
Aprile	0.48	1.90	0.19	23.300	212.000	4.560	37.6	342.4	7.4	60.3	11.2	307	4200	—	119.0	12.4	192.2	153	11.4	97	11.2	0.63		
Maggio	0.80	3.00	0.40	53.600	519.000	11.400	86.6	838.4	18.4	144.0	26.8	1300	7600	0	558.0	58.3	901.5	241	17.9	233	26.8	0.97		
Giugno	0.37	0.75	0.26	10.700	34.800	6.250	17.3	56.2	10.1	27.7	5.2	360	3000	0	46.6	4.9	75.3	94	7.0	45	5.2	0.48		
Luglio	0.20	0.40	0.14	4.970	11.400	3.720	8.0	18.4	6.0	13.3	2.4	110	2800	0	1.2	0.1	1.9	30	2.2	21	2.4	0.70		
Agosto	0.29	1.50	0.12	11.700	134.000	3.470	18.9	216.5	5.6	31.3	5.9	300	6800	0	20.4	2.1	33.0	132	9.8	51	5.9	0.39		
Settembre	0.13	0.20	0.10	3.640	4.760	3.270	5.9	7.7	5.3	9.4	1.7	100	2600	0	1.1	0.1	1.8	28	2.2	15	1.7	0.53		
Ottobre	0.32	1.10	0.10	11.300	73.100	3.270	18.3	118.0	5.3	30.2	5.7	100	800	0	5.1	0.5	8.2	184	13.7	49	5.7	0.27		
Novembre	0.45	0.76	0.31	15.000	35.700	7.820	24.2	57.7	12.6	38.9	7.3	253	2600	0	12.6	1.3	20.4	171	12.7	63	7.3	0.37		
Dicembre	0.73	2.20	0.32	49.900	282.000	8.170	80.6	455.6	13.2	134.0	24.4	400	3400	0	193.6	20.3	312.7	215	16.0	216	24.4	1.00		
Inverno	0.21	0.62	0.10	5.460	20.600	3.270	8.8	33.4	5.3	42.8	10.1	—	—	0	—	—	—	139	11.0	69	10.1	0.50		
Primavera	0.54	3.00	0.17	28.900	519.000	4.190	46.6	838.4	6.8	230.9	54.4	538	7600	0	677.0	—	1093.7	397	33.8	373	54.4	0.94		
Estate	0.29	1.50	0.12	9.120	124.000	3.470	14.7	216.5	5.6	72.3	17.0	257	6800	0	68.2	—	110.2	256	21.8	117	17.0	0.46		
Autunno	0.30	1.10	0.10	9.980	73.100	3.270	16.1	118.0	5.3	78.5	18.5	151	2600	0	18.8	—	30.4	383	32.6	127	18.5	0.52		

Deflusso $\frac{\text{migliaia di mc.}}{\text{migliaia di mc.}} = 538.6$
 Torbidità integrale $\frac{\text{migliaia di mc.}}{\text{migliaia di mc.}} = 870$
 Degradazione media $\frac{\text{migliaia di mc.}}{\text{migliaia di mc.}} = 1343$
 Elementi caratteristici per l'anno solare
 Altezza idrometrica media m. 0.37
 Portata media (modulo) mc/sec. 16.980 = l/sec. kmq. 27.3
 di giorni 91
 Perdita apparente 182
 Coefficiente di deflusso 274
 0.65

FIUME TREBBIA A S. SALVATORE PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




ANNO 1929

(4-1-31) Ufficio Cartografico dell'Istituto Nazionale di Geografia - Roma.

TARO a S. QUIRICO

Caratteristiche della stazione:



a) — Estensione del bacino: Km. 1476.

Altitudine media m. 630 sul m. m. —

Distanza dalla foce in Po della sezione

di chiusura Km. 30. — Alveo nella sta-

zione di misura praticamente stabile

con fondo di sabbia e sponde di terra.

b) — Idrometro di riferimento: a lettura di-

retta in corrispondenza della sezione

di misura, circa m. 200 a valle del

ponte di S. Quirico (S. Secondo), quota


zero m. 26,25 sul m. m. — Registratore

alla pila destra del ponte citato, quota

zero m. 26,25 sul m. m.

c) — Stazione di misura: m. 200 circa a

valle del ponte di S. Quirico.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti

furono 43 cioè quante quelle dell'anno precedente; quelle che fornirono regolarmente i dati, così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoiete, furono 41 cioè 2 in più delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 829, inferiore di mm. 462 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti a partire dal 1914 fu di mm. 1350, e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 521, ossia del 38.6 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione del bacino del Tarso è superiore di mm. 415 a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (Vedi tabella a pag. 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpì nel 1929 l'89.0 % del bacino, contro il 58.0 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpì rispettivamente nei due anni l'11.0 % ed il 36.0 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 27.9 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1000 e mm. 1200 col 42.1 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 1600 e mm. 2500.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel dicembre con mm. 155, e la minima nel marzo con mm. 3, — detti valori rappresentativi rispettivamente il 18.7 % e il 0.4 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelli normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo. 1914 - 1928.


Altezza idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
dell'anno	84	26	3	62	115	44	14	62	19	116	129	155
normali	109	111	149	127	92	79	46	48	125	159	171	134
variazioni dalla normale .	- 25	- 85	- 146	- 65	+ 23	- 35	- 32	+ 14	- 106	- 43	- 42	+ 21

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni si nota che le precipitazioni nel 1929 furono inferiori a quelle

normali, sia in valore assoluto che in quello proporzionale, anche nel periodo estivo, infatti per il semestre aprile - settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo <i>mm.</i>	316	517
Frazione della precipitaz. annuale	38.1 %	38.2 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Taro a S. Quirico nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: dicembre, *mc/sec.* 260.000.
- deflusso mensile massimo: dicembre, *milioni mc.* 111.0.
- contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 176.2.
- portata minima: luglio, *mc/sec.* 1.580.
- deflusso mensile minimo: luglio, con *milioni mc.* 5.4.
- contributo unitario minimo: luglio, *l/sec. kmq.* 1.1.

- portata media annuale: (modulo) *mc/sec.* 17.500.
- deflusso medio mensile: *milioni mc.* 46.1.
- deflusso annuo: *milioni mc.* 552.7.
- contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 11.9.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 16.9 ossia del 49.2%, a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 35.8%. — Il modulo normale (periodo 1923-1928) è di *mc/sec.* 43.8 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 26.3 ossia del 60.0%.

Si ricavano poi dai dati suesposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo:	20.6	44.2
» » » medio:	2.4	2.7
» » » minimo e medio:	0.12	0.06
fra contributo unitario massimo e minimo:	160.1	293.9
» » » medio:	14.8	10.0
» » » minimo e medio:	0.09	0.04

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 0.00 e *mc/sec.* 9.9 con giorni 161.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.45, inferiore a quello verificatosi nel 1928 e inferiore del 28% a quello medio del periodo 1923-28 che fu di 0.73.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928 - novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.65, primavera 0.95, estate 0.12, autunno 0.15.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1923-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.48	1.23	19.7	0.79	0.55	0.16	0.29	0.06	0.21	0.09	0.19	0.49	0.45
medio	0.71	0.98	0.90	0.79	0.80	0.28	0.22	0.12	0.11	0.46	1.44	0.87	0.73

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Taro a S. Quirico è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 1.68, inferiore di *m.* 0.29 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di *m.* 1.79 relativa al periodo 1920-1928. — La massima altezza media mensile si verificò in dicembre con *m.* 2.13 e la minima in luglio con *m.* 1.27. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1920-1928.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dall'anno	1.85	1.79	2.03	1.94	2.04	1.37	1.29	1.31	1.30	1.40	1.67	2.13
normali	1.90	2.01	2.21	2.20	1.79	1.43	1.27	1.24	1.39	1.91	2.27	2.07
sostamento dalla normale	-0.05	-0.22	-0.18	-0.26	+0.25	-0.06	+0.02	+0.07	-0.09	-0.51	-0.60	+0.06

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 27 dicembre con *m.* 5.45 la minima nei giorni 1, 2 3 luglio con *m.* 1.27. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 4.18 occupando il 55.6 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima altezza conosciute, ed il 103 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 140 nell'intervallo compreso fra *m.* 1.20 e *m.* 1.39.

Torbide. — Attraverso la sezione di S. Quirico passarono nel 1929 *migliaia mc.* 654.9 di torbide valutate per decantazione contro un valore di *migliaia mc.* 4263.8 riscontrato nel precedente anno 1928, che si possono ritenere corrispondenti, in cifra tonda, rispettivamente a *migliaia ton.* 982 e 6400 di materia asciutta.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di dicembre con *migliaia mc.* 233.4, si ebbe apporto nullo nei mesi di giugno a settembre verificandosi il minimo in ottobre con *migliaia mc.* 20.2. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 543.7 (pari a *ton.* 815 circa) per *kmq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.
0	9.9	0	9.9	161	365	90	99.9	1	99.9	4	99.9
10	19.9	10	19.9	78	204	100	109	1	109	3	109
20	29.9	20	29.9	69	126	110	110	—	110	—	110
30	39.9	30	39.9	27	57	169	169	—	169	—	169
40	49.9	40	49.9	8	30	179	179	1	179	2	179
50	59.9	50	59.9	9	22	180	180	—	180	—	180
60	69.9	60	69.9	6	13	259	259	—	259	—	259
70	79.9	70	79.9	1	7	269	269	1	269	1	269
80	89.9	80	89.9	2	6	—	—	—	—	—	—

Tabella riassuntiva del regime del bacino del Taro a S. Quirico e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. kmq.			Deflusso		Torbidità specifica cmc/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media mc/kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso	
	media	massima	minima	media	massima	minima	medio	massimo	minimo	milioni di mc.	v' u	media	massima	minima	migliaia mc.	‰	mc/kmq.	mm.	‰	mm.	‰		
Dicembre 1928	1.77	2.90	1.54	19.780	89.300	9.040	13.1	60.5	6.1	52.8	—	450	7000	0	90.7	—	61.0	57	—	36	—	0.63	
Gennaio 1929	1.85	2.10	1.70	22.300	36.000	15.100	15.1	24.4	10.2	59.7	10.7	390	5000	0	25.9	4.0	17.5	84	10.1	40	10.7	0.48	
Febbraio »	1.79	2.25	1.70	19.600	45.700	15.100	13.3	31.0	10.2	47.4	8.5	410	5000	0	38.3	5.9	25.9	26	3.2	32	8.5	1.23	
Marzo »	2.03	2.50	1.80	32.700	62.500	19.600	22.1	42.3	13.3	87.6	15.8	1270	5000	0	150.0	22.9	102.0	3	0.4	59	15.8	19.7	
Aprile »	1.94	2.94	1.62	28.100	92.000	11.900	19.0	62.3	8.1	72.8	13.1	553	7000	0	42.8	6.5	29.0	62	7.5	49	13.1	0.79	
Maggio »	2.04	4.20	1.54	34.400	176.000	9.040	23.3	119.2	6.1	92.1	16.8	340	4300	0	69.0	10.5	46.7	115	13.8	63	16.8	0.55	
Giugno »	1.37	1.56	1.28	4.210	9.740	1.780	2.8	6.6	1.2	10.9	1.9	0	0	0	0.0	—	0	44	5.3	7	1.9	0.16	
Luglio »	1.29	1.32	1.27	2.030	2.700	1.580	4.4	1.8	1.1	5.4	1.1	0	0	0	0.0	—	0	14	1.7	4	1.1	0.29	
Agosto »	1.31	1.34	1.30	2.400	3.220	2.180	1.6	2.2	1.5	6.4	1.1	0	0	0	0.0	—	0	62	7.5	4	1.1	0.06	
Settembre »	1.30	1.32	1.30	2.200	2.700	2.180	1.5	1.8	1.5	5.7	1.1	0	0	0	0.0	—	0	19	2.3	4	1.1	0.21	
Ottobre »	1.40	2.42	1.30	6.000	57.100	2.180	4.1	38.7	1.5	16.1	2.9	458	13000	0	20.2	3.1	13.7	116	14.0	11	2.9	0.09	
Novembre »	1.67	2.00	1.40	14.500	30.000	4.770	9.8	20.3	3.2	37.6	6.7	1790	26000	0	75.3	11.5	51.0	129	15.5	25	6.7	0.19	
Dicembre »	2.13	5.45	1.50	41.300	260.000	7.650	28.0	176.2	5.2	111.0	20.3	1550	18000	0	233.4	35.6	158.0	155	18.7	76	20.3	0.49	
Inverno	1.80	2.90	1.54	20.500	89.300	9.040	13.9	60.5	6.1	159.9	32.4	420	7000	0	154.9	30.2	104.4	167	22.9	108	32.4	0.65	
Primavera	2.00	4.20	1.54	31.700	176.000	9.040	21.5	119.2	6.1	252.5	31.2	721	7000	0	261.8	51.1	177.7	180	24.6	171	51.1	0.95	
Estate	1.32	1.56	1.27	2.880	9.740	1.580	1.9	6.6	1.1	22.7	4.5	0	0	0	0.0	0.0	0.0	120	16.4	15	4.5	0.12	
Autunno	1.46	2.42	1.30	7.570	57.100	2.180	5.1	38.7	1.5	59.4	11.9	749	26000	0	95.5	18.7	64.7	264	36.1	40	11.9	0.15	

Deflusso milioni di mc. 552.7

Torbidità integrale

migliaia di mc. 654.9

Elementi caratteristici

Altezza idrometrica media m. 1.68

migliaia di mc. 552.7

Degradazione media

mc/kmq. 543.7

per l'anno solare

Portata media (modulo) mc/sec. 17.500 = l/sec. kmq. 11.9

mm. 374

» di giorni 91 » 25.000 = » 17.0

» » afflusso » 829


» » 182 » 12.800 = » 8.7

» » Perdita apparente » 455

» » 274 » 5.000 = » 3.4

» » Coefficiente di deflusso » 0.45

FIUME TARO A S. QUIRICO PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI



N. B. - Quando il volume era già ultimato si è riscontrato che la linea delle altezze idrometriche giornaliere e quella delle medie altezze mensili sono errate nel mese di dicembre; la correzione può effettuarsi coi dati della Parte I.^a degli Annuari. - Le altre linee sono regolari.

PARMA a BAGANZOLA



Caratteristiche della stazione:

- a) — Estensione del bacino: Km. 604. - Altitudine media m. 671 sul m. m. - Distanza dalla foce in Po della sezione di chiusura (Via Emilia) Km. 35. - Alveo nella stazione di misura praticamente stabile con fondo di ghiaia e sponde di terra.
- b) — Idrometro di riferimento: a lettura diretta in località Baganzola, sulla sponda sinistra. - quota zero m. 33.35 sul m. m.
- c) — Stazione di misura: in località Baganzola, Km. 8 a valle della sezione di chiusura del Ponto della via Emilia. - Nell'intervallo non vi sono immissioni o estrazioni di qualche valore. - La stazione è attrezzata con teleferica manovrata da sponda per misura di portata di piena.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 23, cioè due in più di quelle dell'anno precedente; quelle che forniscono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isotele furono 20 cioè quante le analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 744, inferiore di mm. 513 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1914, fu di mm. 1200 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 456 ossia del 38.0 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione del bacino del Parma è inferiore di mm. 132 a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pag. 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpì nel 1929 il 95.4 % del bacino contro il 57.3 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpì rispettivamente nei due anni il 4.6 % ed il 42.7 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 38.7 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1000 e mm. 1200 col 37.7 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 1600 e mm. 2000.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel novembre con mm. 139, la minima nel marzo con mm. 4 — detti valori rappresentano rispettivamente il 18.7 % ed il 0.5 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1914-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	Anni											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
dell'anno	88	29	4	74	93	34	9	69	16	99	139	90
normali	92	85	124	122	95	80	46	47	124	137	145	103
scostamento dalla normale .	— 4	— 56	— 120	— 48	— 2	— 46	— 37	— 22	— 108	— 38	— 6	— 13

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che le precipitazioni nel 1929 furono inferiori a quelle

normali, sia nel valore assoluto che in quello proporzionale anche nel periodo estivo, infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo mm.	295	514
Frazione della precipitazione annuale	39.6 %	42.8 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Parma a Baganzola nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari riferiti per Km^q. di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: dicembre, mc/sec. 122.000.
- deflusso mensile massimo: marzo, milioni mc. 43.4.
- contributo unitario massimo: l/sec. kmq. 202.0.
- portata minima: giugno a ottobre mc/sec. zero (portata nulla).
- deflusso mensile minimo: luglio, agosto e settembre con milioni mc. zero (deflusso nullo).
- contributo unitario minimo: l/sec. kmq. zero.

- portata media annuale: (modulo): mc/sec. 5.020.
- deflusso medio mensile: milioni mc. 13.7.
- deflusso annuo: milioni mc. 164.5.
- contributo unitario medio: l/sec. kmq. 8.3.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di mc/sec. 13.0, ossia del 72 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 41 %. Il modulo normale (periodo 1923-28) è di mc. 12.6 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di mc/sec 7.6 ossia del 60.5 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	—	—
» » » e medio	3.2	2.9
» » » minimo e medio	—	—
fra contributo unitario massimo e minimo	—	—
» » » e medio	24.3	14.4
» » » minimo e medio	—	—

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra mc/sec. 0.0 e mc/sec. 9.9 con giorni 314.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.37 inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 32.8 % a quello medio del periodo 1923-928 che fu di 0.55.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.30, primavera 0.92, estate 0.02, autunno 0.09.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1923-1928 definitivo come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.20	0.38	18.00	0.81	0.27	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	0.14	0.67	0.37
medio	0.48	0.73	0.81	0.72	0.51	0.12	0.09	0.02	0.11	0.42	1.03	0.73	0.55

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Parma a Baganzola è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici,

La media altezza idrometrica fu di *m.* 0.34, inferiore di *m.* 0.26 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di *m.* 0.53 relativa al periodo 1920-1928. La massima altezza media mensile si verificò in marzo con *m.* 0.85 e la minima in luglio, agosto e settembre con *m.* 0.00 (letto asciutto). — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1920-28.

Altezza idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	0.42	0.34	0.85	0.76	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	0.10	0.42	0.70
mensili	0.61	0.66	0.88	0.93	0.60	0.26	0.10	0.04	0.23	0.50	0.88	0.69
scostamento dalla normale .	-0.19	-0.32	-0.03	-0.17	-0.15	-0.19	-0.10	-0.04	-0.23	-0.40	-0.46	+0.01

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 27 dicembre con *m.* 3.50 la minima nei giorni dal 16 giugno al 19 ottobre, e nei giorni 25-26 ottobre con *m.* 0.00 (letto asciutto). — L'escursione annua fu dunque di *m.* 3.50 occupando il 33.6% del campo di escursione compreso fra la

massima e la minima altezza conosciute, ed il 79,5% di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 141 nell'intervallo compreso fra *m.* 0.00 e *m.* 0.19.

Torbide. — Attraverso la sezione di Baganzola passarono nel 1929 *migliaia mc.* 308.4 di torbide valutate per decantazione contro un valore *migliaia mc.* 1611.6 riscontrato nel precedente anno 1928 e che si possono ritenere corrispondenti, in cifra tonda, rispettivamente a *migliaia di ton.* 464 e 2420 di materia asciutta.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di dicembre con *migliaia mc.* 80.0, si ebbe apporto nullo nei mesi di febbraio, giugno, luglio, agosto e settembre verificandosi il minimo in gennaio con *migliaia mc.* 0.1. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 511 (pari a *ton.* 760 circa) per *Kmq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni	da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
0	9.9		70	314	365	70	79.9		79.9	—	1
10	19.9		80	26	51	80	89.9		89.9	—	1
20	29.9		90	17	25	90	99.9		99.9	—	1
30	39.9		100	3	8	100	109		109	—	1
40	49.9		110	2	5	110	119		119	—	1
50	59.9		120	1	3	120	129		129	1	1
60	69.9			1	2						

Tabella riassuntiva del regime del bacino del Parma a Baganzola e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Km ² .			Deflusso		Torbidità specifica cmc/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media mc/Km ² .	Altezza afflusso		Altezza deflusso		coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massimo	minimo	milioni di mc.	o/o	media	massima	minima	migliaia mc.	o/o	mm.	o/o	mm.		o/o				
Dicembre 1928	0.38	1.40	0.16	4.790	42.100	6.398	7.9	69.7	0.7	12.8	—	32	8000	0	8.5	—	6	51	—	22	—	0.43
Gennaio 1929	0.42	0.50	0.26	4.240	5.660	1.800	7.0	9.4	3.0	11.4	6.6	6	200	0	0.1	0.0	0	88	11.8	18	6.6	0.20
Febbraio	0.34	0.38	0.30	2.830	3.480	2.260	4.7	5.8	3.7	6.8	4.0	0	0	0	0.0	0.0	0	29	3.9	11	4.0	0.38
Marzo	0.85	1.22	0.45	16.200	30.000	4.720	26.8	49.7	7.8	43.4	26.5	1140	6200	0	75.8	24.6	125	4	0.5	72	26.5	18.00
Aprile	0.76	2.00	0.40	13.900	61.600	3.780	23.0	102.0	6.3	36.0	22.1	726	6200	0	54.1	17.6	90	74	10.0	60	22.1	0.81
Maggio	0.45	1.80	0.25	5.770	53.500	1.690	9.6	88.6	2.8	15.4	9.2	294	6300	0	33.1	10.7	55	93	12.5	25	9.2	0.27
Giugno	0.07	0.25	0.00	0.375	1.690	0.000	0.6	2.8	0.0	1.0	0.7	0	0	0	0.0	0.0	0	34	4.6	2	0.7	0.06
Luglio	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	9	1.2	0	0.0	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	69	9.3	0	0.0	0.00
Settembre	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	16	2.1	0	0.0	0.00
Ottobre	0.10	0.60	0.00	0.933	8.000	0.000	1.5	13.2	0.0	2.5	1.5	206	2400	0	3.9	1.1	6	99	13.3	4	1.5	0.04
Novembre	0.42	0.80	0.30	4.550	13.800	2.260	7.5	22.8	3.7	11.8	7.3	1870	40000	0	61.4	20.0	102	139	18.7	20	7.3	0.14
Dicembre	0.70	3.50	0.40	13.500	122.000	3.780	22.4	202.0	6.3	36.2	22.1	990	6200	0	80.0	26.0	132	90	12.1	60	22.1	0.67
Inverno	0.38	1.40	0.16	3.950	42.100	0.398	6.5	69.7	0.7	31.0	21.8	2630	8000	0	3.6	1.6	6	168	23.8	51	21.8	0.30
Primavera	0.69	2.00	0.25	12.000	61.600	1.698	19.9	102.0	2.8	94.8	67.1	720	6300	0	163.0	70.3	270	171	24.3	157	67.1	0.92
Estate	0.02	0.25	0.00	0.125	1.630	0.000	0.2	2.8	0.0	1.0	0.9	0	0	0	0.0	0.0	0	112	15.9	2	0.9	0.02
Autunno	0.17	0.80	0.00	1.830	13.800	0.000	3.0	22.8	0.0	14.3	10.2	692	40000	0	65.3	28.1	108	254	36.0	24	10.2	0.09


Elementi caratteristici per l'anno solare	Altezza idrometrica media m.	0.34	Deflusso	milioni di mc.	164.5	Torbidità integrale	migliaia di mc.	508.4
	Portata media (modulo) mc/sec.	5.020	Altezza di deflusso	mm.	272	Degradazione media	mc/Km ² .	511
	di giorni	91	» afflusso	»	744			
	»	182	» perdita apparente	»	472			
	»	274	» Coefficiente di deflusso	»	0.37			

FIUME PARMA A BAGANZOLA

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Scala delle altezze idrometriche in m.



Scala delle portate in m³/sec.


Scala delle piogge in mm



(14-21) Ufficio Idrometrico dell'Istituto Idraulico e Idrografico di Bologna

ANNO 1929

ENZA a LENTIGIONE




Caratteristiche della stazione:

- a) — Estensione del bacino: Km. 644 — Altitudine media m. 628 sul m. m. — Distanza dalla foce in Po della sezione di chiusura (Via Emilia): Km. 25 — Alveo nella stazione di misura sufficientemente stabile con fondo di sabbia e sponde di terra.

- b) — Idrometro di riferimento: a lettura diretta in corrispondenza della sezione di misura, di fronte all'abitato di Lentigione — Quota zero m. 23.03 sul m. m.

- c) — Stazione di misura: circa Km. 11 a valle della sezione di chiusura del ponte della Via Emilia. — Nell'intervallo non vi sono estrazioni e immissioni di qualche valore. — La stazione è però influenzata in acque alte dal rigurgito del Po.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 19, cioè quante quelle dell'anno precedente; quelle che fornirono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoiete furono 17 cioè una in più delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 837, inferiore di mm. 542 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1914, fu di mm. 1289 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 452 ossia del 35 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione del bacino dell'Enza è di poco inferiore a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pagina 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpi nel 1929 l' 86.1 % del bacino, contro il 54.3 % verificatosi nel 1928 e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpi rispettivamente nei due anni l' 11.7 % ed il 33.7 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 47.0 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1000 e mm. 1200 col 47.7 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2200 e mm. 2700.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel novembre con mm. 142 e la minima nel marzo con mm. 5 — detti valori rappresentano rispettivamente il 17.0 % ed il 0.6 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1914-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	PRECIPITAZIONI											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	81	25	5	83	101	50	13	63	41	124	142	109
normali	94	87	136	137	103	82	48	53	119	143	168	125
scostamento dalla normale	-13	-62	-131	-48	-2	-32	-35	+10	-78	-19	-26	-16

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che le precipitazioni nel 1929 furono inferiori a quelle nor-

mali nei valori assoluti anche nel periodo estivo, infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazioni semestre estivo mm.	351	536
Frazione della precipit. annuale	42.0 %	41.5 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi dell'Enza a Lentigione nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per Kmq. di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: dicembre, mc/sec. 139.000.
deflusso mensile massimo: dicembre, milioni mc. 38.3.
contributo unitario massimo: l/sec. kmq. 216.0.

portata minima: mesi di giugno a ottobre, mc/sec. 0.0 (portata nulla).
deflusso mensile minimo: luglio, con milioni mc. zero (deflusso nullo).
contributo unitario minimo: l/sec. kmq. zero.

portata media annuale (modulo): mc/sec. 6.3.
deflusso medio mensile: milioni mc. 16.6.
deflusso annuo: milioni mc. 199.7.
contributo unitario medio: l/sec. kmq. 9.8.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di mc/sec. 16.0 ossia del 71.7 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 39.2 %. — Il modulo normale (periodo 1923-1928) è di mc. 13.4 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di mc/sec. 7.1 ossia del 53.0 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	—	—
» » » e medio	2.3	3.2
» » » minimo e medio	—	—
fra contributo unitario massimo e minimo	—	—
» » » e medio	22.1	22
» » » minimo e medio	—	—

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra mc/sec. 0.0 e mc/sec. 9.9 con giorni 298.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegato tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.37, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 26 % a quello medio del periodo 1923-28 che fu di 0.50.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.42, primavera 0.82, estate 0.02, autunno 0.18.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a confronto col valore medio del periodo 1923 - 1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.32	0.56	1.18	0.61	0.45	0.02	0.00	0.02	0.05	0.08	0.30	0.54	0.37
medio	0.47	0.64	0.68	0.64	0.53	0.27	0.15	0.06	0.30	0.30	0.79	0.60	0.50

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico dell'Enza a Lentigione è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di — *m.* 0.12, inferiore di *m.* 0.65 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di 0.47 relativa al periodo 1901-1928. — La massima altezza media mensile si verificò in marzo con *m.* 0.68 e la minima in luglio con — *m.* 0.93. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-1928.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	0.10	0.13	0.68	0.57	0.33	0.77	0.93	0.84	0.83	0.43	0.40	0.43
normali	0.43	0.60	0.86	0.89	0.58	0.36	0.17	0.25	0.12	0.61	0.83	0.69
scostamento dalla normale .	—0.33	—0.73	—0.18	—0.32	—0.25	—1.13	—0.82	—0.59	—0.95	—1.04	—0.43	—0.26

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 27 dicembre con *m.* 4.10, la minima il giorno 3 agosto con — *m.* 0.98. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 5.08 occupando il 46.2 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 107 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 113 nell'intervallo compreso fra — *m.* 1.00 e — *m.* 0.81.

Torbide. — Attraverso la sezione di Lentigione passarono nel 1928 *migliaia mc.* 1350 di torbide valutate per decantazione contro un valore *migliaia mc.* 8118 riscontrato nel precedente anno 1928 e che si possono ritenere corrispondenti, in cifra tonda, rispettivamente a *migliaia ton.* 2025 e 12177 di materia asciutta.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di dicembre con *migliaia mc.* 619, si ebbe apporto nullo nei mesi di gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto, verificandosi il minimo in ottobre con *migliaia mc.* 14.1.

La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 2096 (pari a *ton.* 3150 circa) per *kmq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze giorni	durate giorni	Intervalli		frequenze giorni	durate giorni
da mc/sec.	a mc/sec.			da mc/sec.	a mc/sec.		
0.0	9.9	298	365	70	79.9	—	1
10	19.9	46	67	80	89.9	—	1
20	29.9	11	21	90	99.9	—	1
30	39.9	4	10	100	109	—	1
40	49.9	4	6	110	119	—	1
50	59.9	1	2	120	129	—	1
60	69.9	—	1	130	139	1	1


Tabella riassuntiva del regime del bacino dell'Enza a Lentigione e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Km ² .			Deflusso		Torbidià specifica cmc/mc.			Torbidià integrale		Degradazione media mc/Kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massimo	minimo	milioni di mc.	%	media	massima	minima	migliata mc.	%	mm.	%	mm.		%				
Dicembre 1928	0.16	2.20	— 0.36	7.960	42.300	1.950	12.4	65.7	3.0	21.3	—	1190	19000	0	124.0	—	192	66	—	33	—	0.50
Gennaio 1929	0.10	0.74	— 0.30	6.190	14.000	2.400	9.6	21.7	3.7	16.6	8.4	0	0	0	0.0	0.0	0	81	9.7	26	8.4	0.32
Febbraio »	— 0.13	0.40	— 0.28	3.890	9.400	2.560	6.0	14.6	4.0	9.4	4.5	0	0	0	0.0	0.0	0	25	3.0	14	4.5	0.56
Marzo »	0.68	1.90	— 0.06	14.100	35.300	4.400	21.9	54.8	6.9	37.8	19.1	1480	7000	0	92.1	6.8	143	5	0.6	59	19.1	11.8
Aprile »	0.57	2.00	— 0.14	12.600	37.600	3.720	19.6	58.4	5.8	32.6	16.5	640	4600	0	36.7	2.7	57	83	9.9	51	16.5	0.61
Maggio »	0.33	2.80	— 0.60	10.900	58.100	0.389	16.9	90.2	0.6	29.2	14.5	3060	50000	0	414.0	30.7	643	101	12.0	45	14.5	0.45
Giugno »	— 0.77	— 0.20	— 0.90	0.180	3.200	0.000	0.3	5.0	0.0	0.5	0.3	0	0	0	0.0	0.0	0	50	6.0	1	0.3	0.02
Luglio »	— 0.93	— 0.82	— 0.96	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	13	1.6	0	0.0	0.00
Agosto »	— 0.84	— 0.30	— 0.98	0.199	2.400	0.000	0.3	3.7	0.0	0.5	0.3	0	0	0	0.0	0.0	0	63	7.5	1	0.3	0.02
Settembre »	— 0.83	0.50	— 0.94	0.410	10.700	0.000	0.6	16.6	0.0	1.1	0.6	920	27000	0	25.0	1.9	39	41	4.9	2	0.6	0.05
Ottobre »	— 0.43	1.50	— 0.92	2.330	27.000	0.000	3.6	41.9	0.0	6.2	3.2	329	6000	0	14.1	1.0	22	124	14.8	10	3.2	0.08
Novembre »	0.40	2.50	— 0.30	10.600	49.900	2.400	16.5	77.5	3.7	27.5	13.5	1390	27000	0	149.0	11.0	231	142	17.0	42	13.5	0.30
Dicembre »	0.43	4.10	— 0.50	14.300	139.000	0.992	22.2	216.0	1.5	38.3	19.1	1560	43000	0	619.0	45.9	961	109	13.0	59	19.1	0.54
Inverno	0.04	2.20	— 0.36	6.010	42.300	1.950	9.3	65.7	3.0	47.3	25.7	397	19000	0	124.0	14.5	192	172	21.6	73	25.7	0.42
Primavera	0.53	2.80	— 0.60	12.500	58.100	0.389	19.4	90.2	0.6	99.6	54.6	1730	50000	0	542.8	63.5	843	189	23.8	155	54.6	0.82
Estate	— 0.85	— 0.20	— 0.98	0.126	3.200	0.000	0.2	5.0	0.0	1.0	0.7	0	0	0	0.0	0.0	0	126	15.9	2	0.7	0.02
Autunno	— 0.29	2.50	— 0.94	4.450	49.900	0.000	6.9	77.5	0.0	34.8	19.0	880	27000	0	188.1	22.0	292	307	38.7	54	19.0	0.18

Elementi caratteristici per l'anno solare	Altezza idrometrica media — m.	0.12	Deflusso	milioni di mc.	199.7	Torbidià integrale	migliata di mc.	1350
	Portata media (modulo) mc/sec.	6.310 = l/sec. kmq.	9.8	Altezza di deflusso	mm.	Degradazione media	mc/kmq.	2096
	» di giorni	91	»	» afflusso	»	»	»	»
	»	182	»	» perdita apparente	»	»	»	»
	»	274	»	» Coefficiente di deflusso	»	»	»	»


FIUME ENZA A LENTIGIONE

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI




ANNO 1929

SECCHIA a PONTE BACCHELLO



Caratteristiche della stazione:

- a) — Estensione del bacino: Km. 1250. — Distanza dalla foce in Po della sezione di chiusura (Via Emilia) Km. 85. — Alveo nella stazione di misura praticamente stabile con fondo di sabbia e sponde di terra.
- b) — Idrometro di riferimento: registratore sulla riva sinistra del ponte Baccello, circa Km. 2 a monte della stazione di misura - quota zero m. 21.47 sul m. m.
- c) — Stazione di misura: Km. 2 circa a valle del Ponte Baccello e Km. 26 circa a valle del ponte della via Emilia. (sezione di chiusura). — Nell'intervallo non vi sono immissioni o estrazioni di qualche valore. — La stazione è attrezzata con teleferica manovrata da sponda per misura di portata di piena.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 63, cioè 2 in più dell'anno precedente; quelle che fornirono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoiete furono 63 cioè 7 più delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 900, inferiore di mm. 531 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1914, fu di mm. 1459 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 559 ossia del 38.4 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione del bacino della Secchia è di poco superiore a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pag. 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpì nel 1929 l'82.3 % del bacino, contro il 49.4 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra mm. 1200 e mm. 2000 colpì rispettivamente nei due anni il 16.8 % ed il 34.6 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 30.2 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1000 e mm. 1200 col 33.3 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 3000 e mm. 3100.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel novembre con mm. 178 la minima nel marzo con mm. 6 — detti valori rappresentano rispettivamente il 19.8 % ed il 0.7 %, della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1914-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	99	41	6	93	84	48	10	71	41	131	178	98
normali	112	95	143	151	120	113	60	59	128	157	182	139
scostamento dalla normale .	- 13	- 54	- 137	- 58	- 36	- 65	- 50	+ 12	- 87	- 26	- 4	- 41

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che le precipitazioni nel 1929 furono inferiori al normale

sia nel valore assoluto che in quello proporzionale anche nel periodo estivo, infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo mm.	547	631
Frazione della precipitazione annuale	38.6 %	43.2 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Secchia a Ponte Bacchello nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per Km² di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: novembre, mc/sec. 128.000.
- deflusso mensile massimo: marzo, milioni mc. 99.6.
- contributo unitario massimo: l/sec. kmq. 102.4.
- portata minima: agosto e ottobre, mc/sec. 1.490.
- deflusso mensile minimo: settembre, milioni mc. 4.8.
- contributo unitario minimo: l/sec. kmq. 1.2.

- portata media annuale: (modulo): mc/sec. 16.5.
- deflusso medio mensile: milioni mc. 43.4.
- deflusso annuo: milioni mc. 520.6.
- contributo unitario medio: l/sec. kmq. 13.2.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di mc/sec. 17.6, ossia del 51.6 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 37.0 %. Il modulo normale (periodo 1923-28) è di mc/sec. 25.5 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di mc/sec 9.0 ossia del 35.2 %

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	20.7	52.2
» » » e medio	2.3	2.0
» » » minimo e medio	0.1	0.04
fra contributo unitario massimo e minimo	85.3	1040
» » » e medio	7.8	11.4
» » » minimo e medio	0.09	0.02

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra mc/sec. 0.0 e mc/sec. 9.9 con giorni 182.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.46 inferiore a quello verificatosi nel 1928 e superiore del 4.5 % a quello medio del periodo 1923-928 che fu di 0.44.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.71, primavera 1.14, estate 0.13, autunno 0.23.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1923-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.48	0.78	1.33	0.85	0.60	0.17	0.50	0.06	0.10	0.09	0.36	0.31	0.46
medio	0.78	0.56	0.63	0.64	0.50	0.16	0.12	0.07	0.14	0.24	0.55	0.49	0.44

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Secchia a Ponte Bacchello è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 1.73, inferiore di *m.* 0.32 a quella del 1928 ed inferiore a quella di *m.* 1.82 relativa al periodo 1901-1928. La massima altezza media mensile si verificò in aprile con *m.* 2.28 e la minima in settembre con *m.* 1.29. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-28.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	1.96	1.81	2.26	2.28	1.96	1.38	1.32	1.30	1.29	1.42	2.10	1.72
normali	1.73	1.89	2.29	2.41	2.10	1.70	1.35	1.26	1.33	1.65	2.10	1.99
scostamento dalla normale .	+0.23	-0.08	-0.03	-0.13	-0.14	-0.32	-0.03	+0.04	-0.04	-0.23	0	-0.27

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 3 novembre con *m.* 3.76 la minima nei giorni 21 agosto e 2 ottobre con *m.* 1.27 — L'escur-sione annua fu dunque di *m.* 2.49 occupando il 32.5 % del campo di escur-sione compreso fra la massima e la minima altezza conosciute, ed il 59,7 %

di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La mas-sima frequenza idrometrica fu di giorni 135 nell'intervallo compreso fra *m.* 1.20 e *m.* 1.39.

Torbide. — Attraverso la sezione di P. Bacchello passarono nel 1929 *migliaia mc.* 2626.5 di torbide valutate per decantazione contro un valore *migliaia mc.* 11836.6 riscontrato nel precedente anno 1928, e che si possono ritenere corrispondenti, in cifra tonda, a *migliaia di ton.* 3940 e 16750 di materia asciutta.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di novembre con *migliaia mc.* 1150, si ebbe apporto nullo nei mesi di luglio a settembre, ve-rificandosi il minimo in febbraio con *migliaia mc.* 23.1. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 2100 (pari a *ton.* 3150 circa) per *Kmq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli			frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	mc/sec.	a	mc/sec.	giorni	giorni	giorni	da	mc/sec.	a	mc/sec.	giorni	giorni
0	9.9	9.9	79.9	182	365	8	70	79.9	6	79.9	8	8
10	19.9	19.9	89.9	65	183	2	80	89.9	1	89.9	2	2
20	29.9	29.9	99.9	64	118	1	90	99.9	—	99.9	1	1
30	39.9	39.9	109	21	54	1	100	109	—	109	1	1
40	49.9	49.9	119	16	33	1	110	119	—	119	1	1
50	59.9	59.9	129	4	17	1	120	129	1	129	1	1
60	69.9	69.9	—	5	13	—	—	—	—	—	—	—

Tabella riassuntiva del regime del bacino della Secchia a Ponte Bacchello e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Kmq.			Deflusso		Torbidità specifica cmc/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media mc/Kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massima	minima	medio	massimo	minimo	milioni di mc.	‰	media	massima	minima	migliaia mc.	‰		mm.	‰	mm.	‰	
Dicembre 1928	1.89	3.38	1.53	22.100	102.000	7.390	16.8	81.6	5.9	92.2	—	0	0	0	0.0	—	0	77	—	74	—	0.96
Gennaio 1929	1.96	2.12	1.71	22.500	29.400	13.100	18.4	23.5	10.5	60.3	11.5	716	3200	0	50.9	1.9	41	99	11.0	48	11.5	0.48
Febbraio »	1.81	2.16	1.70	16.700	31.200	12.700	13.4	25.0	10.3	40.4	7.7	0	0	0	23.1	0.9	48	41	4.6	32	7.7	0.78
Marzo »	2.26	2.90	1.73	37.200	70.800	13.700	29.8	56.6	10.9	99.6	19.2	2030	7600	0	265.0	10.1	212	6	0.7	80	19.2	13.33
Aprile »	2.28	3.02	1.86	38.000	78.100	18.500	30.4	62.5	14.8	98.5	19.0	4590	22800	0	592.0	22.5	474	93	10.3	79	19.0	0.85
Maggio »	1.96	3.05	1.58	23.600	80.000	8.860	18.9	64.0	7.1	63.2	12.0	3320	15800	0	318.0	12.1	254	84	9.3	50	12.0	0.60
Giugno »	1.38	1.63	1.32	3.840	10.400	2.370	3.1	8.3	1.9	10.0	1.9	14	400	0	0.4	0.0	0	48	5.8	8	1.9	0.17
Luglio »	1.32	1.36	1.29	2.490	3.250	1.790	2.0	2.6	1.4	6.7	1.2	0	0	0	0.0	0.0	0	10	1.1	5	1.2	0.50
Agosto »	1.30	1.40	1.27	1.920	4.120	1.490	1.5	3.3	1.2	5.1	1.0	0	0	0	0.0	0.0	0	71	7.9	4	1.0	0.06
Settembre »	1.29	1.30	1.23	1.860	1.940	1.640	1.5	1.6	1.3	4.8	1.0	0	0	0	0.0	0.0	0	41	4.6	4	1.0	0.10
Ottobre »	1.42	1.94	1.27	5.460	21.600	1.490	4.4	17.3	1.2	14.6	2.9	2130	13200	0	89.1	3.4	71	131	14.5	12	2.9	0.09
Novembre »	2.10	3.76	1.50	30.700	128.000	6.510	24.5	102.4	5.2	79.6	15.4	9380	27600	0	1150.0	43.8	920	178	19.8	64	15.4	0.36
Dicembre »	1.72	2.36	1.48	14.100	40.800	6.010	11.3	32.6	4.8	37.8	7.2	2250	11200	0	138.0	5.3	110	98	10.9	30	7.2	0.31
Inverno	1.89	3.38	1.53	20.400	102.000	7.390	16.3	81.6	5.9	192.9	33.4	239	3200	0	74.0	3.0	59	217	24.7	154	33.4	0.71
Primavera	2.17	3.05	1.58	32.900	80.000	8.860	26.3	64.0	7.1	261.3	45.5	3310	22800	0	1175.0	47.3	940	183	20.8	209	45.5	1.14
Estate	1.33	1.63	1.27	2.750	10.400	1.490	2.2	8.3	1.2	21.8	3.7	5	400	0	0.4	0.0	0	129	14.7	17	3.7	0.13
Autunno	1.60	3.76	1.27	12.700	128.000	1.490	10.3	102.4	1.2	99.0	17.4	5090	27600	0	1239.1	49.8	991	350	39.8	80	17.4	0.23

Deflusso milioni di mc. 520.6 Torbidità integrale migliaia di mc. 2626.5
 Altezza di deflusso mm. 416 Degradazione media mc/kmq. 2100
 » , afflusso » 900
 Perdita apparente » 471
 Coefficiente di deflusso » 0.46


Altezza idrometrica media m. 1.73
 Portata media (modulo) mc/sec. 16.500 = l/sec. kmq. 13.2
 » di giorni 91 » 24.200 = » 19.4
 » » 182 » 10.000 = » 8.0
 » » 274 » 5.000 = » 4.0

Elementi caratteristici
 per l'anno solare


FIUME SECCHIA A PONTE BACCHELLO PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Scala delle altezze idrometriche in m.




Scala delle piogge in mm.



(L. 531/1903) Cartografia dell'Istituto Idrografico e Mareografico - Roma


ANNO 1929

PANARO a BOMPORTO



Caratteristiche della stazione:

- a) — Estensione del bacino: Km. 960. — Distanza dalla foce in Po della sezione di chiusura (Via Emilia) Km. 64. — Alveo nella stazione di misura sufficientemente stabile con fondo di sabbia e sponde di terra.
- b) — Idrometro di riferimento: Registratore sulla pila sinistra del ponte di Bomporto, circa Km. 1.200 a valle della stazione di misura. — Quota zero m. 18.43 sul m. m.
- c) — Stazione di misura: Km. 1.200 circa a valle monte del ponte di Bomporto e Km. 19 a valle della sezione di chiusura al ponte della Via Emilia. — Nell'intervallo non vi sono immissioni od estrazioni di qualche valore. — La stazione è attrezzata con teleferica manovrata da sponda per misura di portata di piena.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 34 cioè quante quelle dell'anno precedente; quelle che forniscono regolarmente i dati, così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoiete, furono 31 cioè una in meno delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo tetografico, è risultata di mm. 844, inferiore di mm. 610 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti a partire dal 1914 fu di

mm. 1098, e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di mm. 254, ossia del 23.1 % al valore medio su indicato, appare scarsa.

La media precipitazione del bacino del Panaro è di poco inferiore a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (Vedi tabella a pag. 75) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpi nel 1929 l'79.4 % del bacino, contro il 49.4 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpi rispettivamente nei due anni il 19.9 % ed il 33.7 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 400 e mm. 600 col 41.0 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 1000 e mm. 1200 col 48.9 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2800 e mm. 3100.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nel novembre con mm. 161, e la minima nel marzo con mm. 7, detti valori rappresentano rispettivamente il 19.1 % ed il 0.8 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1914-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
dell'anno	108	46	7	78	77	39	17	47	45	124	161	95
normali	92	69	103	110	85	75	43	43	99	130	148	101
sostanziale della normale .	+ 16	- 23	- 96	- 32	- 8	- 36	- 26	+ 4	- 54	- 6	+ 13	- 6

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni si nota che le precipitazioni nel 1929 furono inferiori al nor-

male, sia in valore assoluto che in quello proporzionale, anche nel periodo estivo, infatti per il semestre aprile - settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo <i>mm.</i>	303	455
Frazione della precipitaz. annuale	36.0 %	41.4 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Panaro a Bomporto nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: dicembre, *mc/sec.* 192.000.
 deflusso mensile massimo: marzo, *milioni mc.* 138.0.
 contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 200.
 portata minima: agosto e settembre *mc/sec.* 0.639.
 deflusso mensile minimo: agosto, con *milioni mc.* 3.0.
 contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 0.7.

portata media annuale: (modulo) *mc/sec.* 20.3.
 deflusso medio mensile: *milioni mc.* 53.6.
 deflusso annuo: *milioni mc.* 643.0.
 contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 21.1.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 18.3 ossia del 47.5 %, a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori del 42.0 %. — Il modulo normale (periodo 1923-1928) è di *mc/sec.* 23.3 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 3.0 ossia del 12.9 %.

Si ricavano poi dai dati suesposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno 1928.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo:	46.0	274.0
» » » medio:	2.6	2.5
» » » minimo e medio:	0.06	0.01
fra contributo unitario massimo e minimo:	286.0	—
» » » medio:	9.4	9.2
» » » minimo e medio:	0.03	—

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 0.00 e *mc/sec.* 9.9 con giorni 182.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.79, inferiore a quello verificatosi nel 1928 e superiore dell'1 % a quello medio del periodo 1923-28 che fu di 0.78.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 0.77, primavera 2.25, estate 0.16, autunno 0.38.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1923-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.56	0.63	20.6	1.49	1.36	0.27	0.23	0.06	0.07	0.17	0.62	0.74	0.79
medio	1.57	0.93	0.97	1.06	0.85	0.19	0.14	0.05	0.32	0.40	1.00	0.98	0.78

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Panaro a Bomporto è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 0.75, inferiore di *m.* 0.43 a quella del 1928 e superiore a quella di *m.* 0.54 relativa al periodo 1901-1928. — La massima altezza media mensile si verificò in marzo con *m.* 1.86 e la minima in agosto con — *m.* 0.19. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-1928.

Altezza idrometrica	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dall'anno	1.00	0.70	1.86	1.63	1.46	0.09	-0.18	-0.19	-0.17	0.23	1.44	1.09
normali	0.59	0.73	1.06	1.30	0.99	0.35	-0.20	-0.33	-0.07	0.38	1.04	0.90
scostamento dalle normali .	+0.41	-0.03	+0.80	+0.33	+0.47	-0.26	+0.02	+0.14	-0.10	-0.15	+0.40	+0.19

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 27 dicembre con *m.* 4.74 la minima nei giorni 18 agosto e 1° settembre con — *m.* 0.26. L'escursione annua fu dunque di *m.* 5.00 occupando il 55.0 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima altezza conosciuta, e l'85.0 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 91 nell'intervallo compreso fra — *m.* 0.20 e — *m.* 0.01.

Torbide. — Attraverso la sezione di Bomporto passarono nel 1929 *migliaia mc.* 2156.8 di torbide valutate per decantazione contro un valore *migliaia di mc.* 6717.5 riscontrato nel precedente anno 1928, che si possono ritenere corrispondenti, in cifra tonda, a *migliaia ton.* 3230 e 10100 di materia asciutta.


Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di marzo con *migliaia mc.* 644, il minimo in luglio con *migliaia mc.* 0.7. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *mc.* 2247 (pari a circa *ton.* 3370) per *kmq.* di bacino.

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli			frequenze		durate		frequenze giorni	durate giorni
da mc/sec.	a mc/sec.	mc/sec.	giorni	mc/sec.	giorni	mc/sec.		
0.0	9.9	100	182	109	305	109	3	8
10	19.9	110	60	119	183	119	2	5
20	29.9	120	35	129	123	129	—	3
30	39.9	130	32	139	88	139	1	3
40	49.9	140	12	149	56	149	—	2
50	59.9	150	12	159	41	159	1	2
60	69.9	160	8	169	32	169	—	1
70	79.9	170	3	179	24	179	—	1
80	89.9	180	8	189	21	189	—	1
90	99.9	190	5	199	13	199	1	1

FIUME PANARO A BOMPORTO


PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI



assoluto a quelle medie nel periodo estivo, ne rimasero però superiori come valore proporzionale; infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo mm.	440	469
Frazione della precipitazione annuale	65.5 %	46.5 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Moncalieri nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per Kmq. di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: maggio, *mc/sec.* 175.0.
deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 203.0.
contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 35.8.

portata minima: agosto, *mc/sec.* 9.0.
deflusso mensile minimo: luglio, *milioni mc.* 55.2.
contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 1.8.

portata media annuale: (modulo): *mc/sec.* 48.0.
deflusso medio mensile: *milioni mc.* 126.
deflusso annuo: *milioni mc.* 1512.
contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 9.8.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 60.5, ossia del 55.7 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 36.1 %. Il modulo medio del periodo 1927-28 è di *mc.* 92.1 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore a quello medio di *mc/sec* 44.1 ossia del 48 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	3.7	7.2
» » » e medio	1.6	2.1
» » » minimo e medio	0.4	0.3
fra contributo unitario massimo e minimo	19.9	22.8
» » » e medio	3.7	5.2
» » » minimo e medio	0.2	0.2

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 40 e *mc/sec.* 59.9 con giorni 143.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.46 inferiore a quello verificatosi nel 1929 e inferiore del 15.4 % a quello medio del periodo 1927-28 che fu di 0.59.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.18, primavera 0.56, estate 0.33, autunno 0.32.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1927-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.54	4.33	2.28	0.44	0.35	0.52	0.38	0.17	0.25	0.27	0.38	0.48	0.46
medio	1.88	1.97	0.46	0.59	0.76	1.28	0.83	0.47	0.22	0.31	0.41	0.49	0.59

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Po a Moncalieri è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di — *m.* 0.26, inferiore di *m.* 0.38 a quella del 1928 ed inferiore a quella di *m.* 23 relativa al periodo 1914-28. La massima altezza media mensile si verificò in maggio con — *m.* 0.08 e la minima in luglio con — *m.* 0.43. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-28.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	—0.16	—0.23	—0.09	—0.26	—0.08	—0.10	—0.43	—0.38	—0.36	—0.36	—0.34	—0.31
normali	0.07	0.02	0.17	0.39	0.74	0.57	0.05	—0.14	—0.08	0.20	0.28	0.15
scostamento dalla normale .	—0.23	—0.25	—0.26	—0.65	—0.82	—0.67	—0.48	—0.24	—0.28	—0.56	—0.62	—0.46

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 28 maggio con *m.* 0.54 la minima nel giorno 8 agosto con — *m.* 0.50 — L'escursione annua fu dunque di *m.* 1.04 occupando il 19.5 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 45,2 % di quello compreso fra

i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 169 nell'intervallo compreso fra — *m.* 0.40 e — *m.* 0.21.

Per quanto si è detto più sopra circa le condizioni dell'idrometro di riferimento, i valori idrometrici non hanno un significato assoluto.

Temperatura delle acque. — Nel seguente prospetto si riportano i valori medi della temperatura delle acque del Po a Moncalieri messi a raffronto con gli analoghi dati sulla temperatura dell'aria, il tutto espresso in gradi centigradi.

Temperatura media	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
Acqua	3.7	3.8	8.9	12.6	15.2	18.7	21.3	19.9	17.8	13.1	9.0	6.0	12.5
Aria	—3.4	—3.2	7.9	11.4	23.1	22.4	24.6	22.5	20.4	12.6	7.1	3.4	12.4
Scostamento	+7.1	+7.0	+1.0	+1.2	—7.9	—3.7	—3.3	—2.6	—2.6	+0.5	+2.1	+2.6	+0.1

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni	da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
0	9.9	9.9	100	365	34	100	119	119	11	18	18
20	39.9	39.9	120	331	84	120	139	139	3	7	7
40	59.9	59.9	140	247	143	140	159	159	2	4	4
60	79.9	79.9	160	104	78	160	179	179	2	2	2
80	99.9	99.9		26	8						

FIUME PO A MONCALIERI

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Scala delle altezze idrometriche in m.


Scala delle piogge in mm.



ANNO 1929


(144-151) Ufficio Cartografico dell'Istituto Nazionale di Geografia e Storia

PO a PIACENZA



Caratteristiche della stazione:

- Estensione del bacino: *Kauy.* 42030.
Distanza dalla foce *Km.* 385.
- Idrometro di riferimento: a lettura diretta in sponda destra immediatamente a monte del ponte ferroviario di Piacenza, quota zero *m.* 42.16 sul *m. m.*; registratore sulla 6.^a pila a sinistra del ponte stesso, con zero pure a quota 42.16 sul *m. m.*
- Stazione di misura: circa *m.* 50 a valle del ponte ferroviario. — In tempo di magra l'acqua si divide in due rami. — Il fondo è costituito da sabbia e ghiaia ed è mobile, le sponde sono fisse.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 567 cioè 14 in più di quelle dell'anno precedente; quelle che forniscono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isiete furono 516 cioè 22 meno delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di *mm.* 878 inferiore di *mm.* 311 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1920, fu di *mm.* 1091 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 213 ossia del 19.5 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione per l'anno in esame è pressoché eguale a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero *mm.* 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pagina 76) si osserva che la precipitazione fino a *mm.* 1200 colpi nel 1929 l'81.7 % del bacino, contro il 62.0 % verificatosi nel 1928 e che quella compresa fra i *mm.* 1200 e *mm.* 2000 colpi rispettivamente nei due anni il 16.8 % ed il 28.7 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra *mm.* 600 e *mm.* 800 col 20.7 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra *mm.* 800 e *mm.* 1000 col 21.2 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni *mm.* 2500 e *mm.* 3200.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nell'ottobre con *mm.* 144 e la minima nel febbraio con *mm.* 8 — detti valori rappresentano rispettivamente il 16.4 % ed il 0.9 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1920-1928.


PRECIPITAZIONI in <i>mm.</i>	PREP. ANNUALI											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	48	8	11	119	127	75	47	118	37	144	67	77
normali	47	58	102	121	115	80	72	74	100	117	133	72
scostamento dalla normale	+ 1	- 50	- 91	- 2	+ 12	- 5	- 25	+ 44	- 63	+ 27	- 66	+ 5

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che nel 1929 le precipitazioni, se furono inferiori in valore

assoluto a quelle normali, nel periodo estivo ne rimasero però superiori come valore proporzionale: infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazioni semestre estivo mm.	523	562
Frazione della precipit. annuale	59.5 %	51.5 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Piacenza nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per Kmq. di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: giugno, mc/sec. 1840.
- deflusso mensile massimo: maggio, milioni mc. 2810.
- contributo unitario massimo: l/sec. kmq. 43.8.
- portata minima: agosto, mc/sec. 380.
- deflusso mensile minimo: febbraio, con milioni mc. 1050.
- contributo unitario minimo: l/sec. kmq. 9.0.

portata media annuale (modulo): mc/sec. 643.
deflusso medio mensile: milioni mc. 1690.
deflusso annuo: milioni mc. 20300.
contributo unitario medio: l/sec. kmq. 15.3.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di mc/sec. 517 ossia del 44.5 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 26.2 %. — Il modulo normale (periodo 1924-1928) è di mc/sec. 1070 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di mc/sec. 427 ossia del 40.0 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	2.7	6.8
» » » e medio	1.7	2.5
» » » minimo e medio	0.6	0.4
fra contributo unitario massimo e minimo	4.9	24.8
» » » e medio	2.9	8.0
» » » minimo e medio	0.6	0.3

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra mc/sec. 400 e mc/sec. 449 con giorni 74.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.55, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 16.6 % a quello medio del periodo 1924-28 che fu di 0.66.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.28, primavera 0.52, estate 0.53, autunno 0.48.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a raffronto col valore medio del periodo 1924 - 1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.69	3.12	3.27	0.25	0.53	0.76	0.64	0.35	0.78	0.35	0.58	0.58	0.55
medio	0.98	0.59	0.53	0.54	0.71	1.06	0.68	0.56	0.52	0.48	0.72	0.65	0.66

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Po a Piacenza è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. — Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 1.25, inferiore di *m.* 0.84 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di *m.* 1.93 relativa al periodo 1901 - 1928. — La massima altezza media mensile si verificò in maggio con *m.* 2.16 e la minima in febbraio con *m.* 0.73. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901 - 1928.

Altezza idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	1.01	0.73	1.11	0.86	2.16	1.90	0.83	1.25	0.83	1.63	1.29	1.44
normali	1.38	1.23	1.91	2.02	2.62	2.88	1.84	1.27	1.65	2.17	2.40	1.76
scostamento dalla normale .	-0.37	-0.50	-0.80	-1.16	-0.46	-0.98	-1.01	-0.02	-0.82	-0.54	-1.11	-0.32

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 14 giugno con *m.* 3.45, la minima nel giorno 1 agosto con *m.* 0.55. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 2.90 occupando il 28.2 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 65.8 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 86 nell'intervallo compreso fra *m.* 0.60 e *m.* 0.79.

Torbide. — Attraverso la sezione di Piacenza passarono nel 1929 *migliaia* di *ton.* 3733 di torbide valutate come materia asciutta contro un valore di *migliaia* di *ton.* 12876 riscontrato nel precedente anno 1928 ed uno medio di *migliaia* di *ton.* 13090 pel periodo 1924-28.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di ottobre con *migliaia* di *ton.* 744, il minimo in gennaio con *migliaia* di *ton.* 75. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *ton.* 105.4 per *kmq.* di bacino direttamente contribuente al Po (*Kmq.* 35430 depurati dalla parte che contribuisce attraverso i grandi laghi alpini).

Il valore medio della degradazione ottenuto per gli anni precedenti (1924 - 1928) risulta di *ton.* 389.8 per *kmq.* e quindi quello riscontrato per il periodo in esame appare molto scarso.

Temperatura delle acque. — Nel seguente prospetto si riportano i valori medi della temperatura delle acque del Po a Piacenza messi a raffronto con gli analoghi dati sulla temperatura dell'aria, il tutto espresso in gradi centigradi.

Temperatura media	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
Acqua	4.7	4.2	10.3	12.2	15.6	20.4	23.0	21.0	19.3	14.1	9.7	7.8	13.5
Aria	-2.3	-5.9	6.6	10.1	17.4	21.9	24.2	22.7	20.3	12.7	7.2	3.9	11.6
Scostamento	+7.0	+10.1	+3.7	+2.1	-1.8	-1.5	-1.2	-1.7	-1.0	+1.4	+2.5	+3.9	+1.9

Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate		Intervalli		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni	da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
350	399	399	399	12	365	900	949	949	949	8	55
400	449	449	449	74	353	950	999	999	999	6	47
450	499	499	499	53	279	1000	1099	1099	1099	18	41
500	549	549	549	46	226	1100	1199	1199	1199	8	23
550	599	599	599	31	180	1200	1299	1299	1299	6	15
600	649	649	649	23	149	1300	1399	1399	1399	4	9
650	699	699	699	13	126	1400	1499	1499	1499	1	5
700	749	749	749	20	113	1500	1599	1599	1599	1	4
750	799	799	799	8	93	1600	1699	1699	1699	—	3
800	849	849	849	16	85	1700	1799	1799	1799	1	3
850	899	899	899	14	69	1800	1899	1899	1899	2	2


Tabella riassuntiva del regime del bacino del Po a Piacenza e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Km ² .			Deflusso		Torbidità specifica gr/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media ton/Km ² .	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massima	minima	medio	massimo	minimo	milioni di mc.	‰	media	massima	minima	migliaia ton.	‰	ton/Km ² .	mm.	‰	mm.	‰	
Dicembre 1928	1.40	1.96	1.04	682	930	537	16.2	22.1	12.8	1830	—	98	440	0	172	—	4.8	23	—	43	—	1.87
Gennaio 1929	1.01	1.47	1.77	528	705	447	12.6	16.8	10.6	1400	6.8	»	»	»	[75]	2.0	2.2	48	5.5	33	6.8	0.69
Febbraio »	0.73	0.81	0.67	435	459	416	10.3	10.9	9.9	1050	5.2	»	»	»	[85]	2.3	2.4	8	0.9	25	5.2	3.12
Marzo »	1.11	1.62	0.84	569	770	468	13.5	18.3	11.1	1520	7.4	121	295	10	189	5.1	5.3	11	1.3	36	7.4	3.27
Aprile »	0.86	1.57	0.58	481	748	389	11.4	17.8	9.3	1250	6.2	126	269	63	163	4.4	4.6	119	13.5	30	6.2	0.25
Maggio »	2.16	3.42	0.93	1050	1820	499	25.0	43.3	11.9	2810	13.9	156	717	56	489	13.1	13.8	127	14.5	67	13.9	0.53
Giugno »	1.90	3.45	1.10	924	1840	559	22.0	43.8	13.3	2400	11.8	196	673	47	523	14.0	14.8	75	8.5	57	11.8	0.76
Luglio »	0.83	1.25	0.57	470	615	386	11.2	14.6	9.2	1260	6.2	160	687	45	208	5.6	5.9	47	5.4	30	6.2	0.64
Agosto »	1.25	2.82	0.55	643	1410	380	15.3	33.5	9.0	1720	8.5	229	1170	2	488	13.1	13.7	118	13.4	41	8.5	0.35
Settembre »	0.83	1.09	0.60	466	555	395	11.1	13.2	9.4	1200	6.0	126	213	48	155	4.0	4.4	37	4.2	29	6.0	0.78
Ottobre »	1.63	3.02	0.69	800	1540	422	19.0	36.6	10.0	2140	10.6	290	2090	30	744	19.9	21.0	144	16.4	51	10.6	0.35
Novembre »	1.29	1.82	0.85	637	862	461	15.1	20.5	11.0	1650	8.1	112	183	40	186	5.0	5.2	67	7.6	39	8.1	0.58
Dicembre »	1.44	2.75	0.87	710	1370	478	16.9	32.6	11.4	1900	9.3	191	1260	37	428	11.5	12.1	77	8.8	45	9.3	0.58
Inverno	1.05	1.96	0.67	548	930	416	13.0	22.1	9.9	4280	21.2	»	»	»	332	9.6	9.4	79	9.6	101	21.0	1.28
Primavera	1.38	3.42	0.58	700	1820	389	16.6	43.3	9.3	5580	27.6	134	717	10	841	24.2	23.7	257	31.2	133	27.7	0.52
Estate	1.33	3.45	0.55	679	1840	380	16.2	43.8	9.0	5380	26.6	135	1170	2	1219	35.0	34.4	240	29.2	128	26.5	0.53
Autunno	1.25	3.02	0.60	634	1540	395	15.1	36.6	9.4	4990	24.6	176	2090	30	1085	31.2	30.6	248	30.0	119	24.8	0.48

Elementi caratteristici per l'anno solare	Altezza idrometrica media m.	1.25	Deflusso	milioni di mc.	20300	Torbidità integrale	migliaia di ton.	3733
	Portata media (modulo) mc/sec.	643	Altezza di deflusso	mm.	483	Degradazione media	ton/kmq.	1054
	» di giorni 91	762	» afflusso	»	878			
	» 182	548	Perdita apparente	»	395			
	» 274	455	Coefficiente di deflusso	»	0.55			

FIUME PO A PIACENZA


PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI



ANNO 1929

(4-5) Ufficio Cartografico dell'Istituto Italiano di Geografia, Bologna.

PO a CASALMAGGIORE




Caratteristiche della stazione:

a) — Estensione del bacino: Km. 53450. — Distanza dalla foce: Km. 232.

b) — Idrometro di riferimento: a lettura diretta, in sponda sinistra contro l'abitato di Casalmaggiore, — quota zero m. 23.49 sul m. m. — Registratore sulla 2.^a pila sinistra del ponte ferroviario della linea Parma-Brescia, quota zero m. 23.45 sul m. m.

c) — Stazione di misura: in corrispondenza dell'abitato di Saccà (circa Km. 4 a monte della sezione di chiusura) fino ad altezze prossime alla piena ordinaria, per altezze superiori presso il ponte di Casalmaggiore. — Fondo di sabbia molle, sponde fisse.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 775, cioè 19 in più di quelle dell'anno precedente; quelle che furono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isiete furono 686 cioè 39 in meno delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 897, inferiore di mm. 299 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1920, fu di mm. 1121 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 224 ossia del 20.0 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione per l'anno in esame è di poco superiore a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pag. 76) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpi nel 1929 il 79.5 % del bacino, contro il 59.9 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpi rispettivamente nei due anni il 19.4 % ed il 31.6 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 20.7 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 800 e mm. 1000 col 20.5 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2600 e mm. 4000.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nell'ottobre con mm. 143 e la minima nel marzo con mm. 9 — detti valori rappresentano rispettivamente il 15.9 % ed l'1.0 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1920-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	48	10	9	114	129	77	50	124	33	143	76	84
normali	52	60	104	122	114	86	75	79	108	117	132	72
scostamento dalla media .	— 4	— 50	— 95	— 8	+ 15	— 9	+ 25	+ 45	— 75	+ 26	— 56	+ 12

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che nel 1929 le precipitazioni, se furono inferiori in valore

assoluto a quelle normali del periodo estivo, ne rimasero però superiori come valore proporzionale; infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo <i>mm.</i>	527	584
Frazione della precipitazione annuale	58.7 %	52.0 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Casalmaggiore nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: maggio, *mc/sec.* 2030.
- deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 3430.
- contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 38.0.
- portata minima: luglio, *mc/sec.* 380.
- deflusso mensile minimo: febbraio, *milioni mc.* 1060.
- contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 7.1.

- portata media annuale: (modulo): *mc/sec.* 823.
- deflusso medio mensile: *milioni mc.* 2170.
- deflusso annuo: *milioni mc.* 26040.
- contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 15.4.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 607, ossia del 42.5 % a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 25.0 %. Il modulo normale (periodo 1924-28) è di *mc/sec.* 1330 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 507 ossia del 38.2 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	3.2	7.4
» » » e medio	1.6	2.4
» » » minimo e medio	0.5	0.3
fra contributo unitario massimo e minimo	5.4	28.1
» » » e medio	2.5	6.9
» » » minimo e medio	0.5	0.3

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 400 e *mc/sec.* 449 con giorni 41.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.54, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 14.3 % a quello medio del periodo 1924-28 che fu di 0.63.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.03, primavera 0.51, estate 0.50, autunno 0.50.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a


Tabella riassuntiva del regime del bacino del Po a Casalmaggiore e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Kmq.			Deflusso		Torbidità specifica gr/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media ton./Kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massimo	minimo	milioni di mc.	o/o	media	massima	minima	migliaia ton.	o/o	mm.	o/o	ton./Kmq.	mm.	o/o	mm.	o/o		
Dicembre 1928	0.67	1.13	0.26	895	1120	610	15.6	21.0	11.4	2240	—	185	425	51	424	—	10.0	83	—	42	—	1.27
Gennaio 1929	0.29	0.81	—0.04	630	914	468	11.8	17.1	8.8	1690	6.6	134	690	15	238	3.5	5.6	48	5.3	32	6.6	0.67
Febbraio	—0.10	0.10	—0.18	438	532	409	8.2	9.9	7.6	1060	4.1	230	1100	38	248	3.6	5.8	10	1.1	20	4.1	2.00
Marzo	0.49	1.02	0.13	738	1050	546	13.8	19.6	10.2	1980	7.6	169	250	45	398	5.8	9.4	9	1.0	37	7.6	4.11
Aprile	0.19	1.08	—0.22	584	1080	392	10.9	20.2	7.3	1510	5.8	212	548	105	342	5.0	8.0	114	12.7	28	5.8	0.25
Maggio	1.35	2.29	0.00	1280	2030	486	23.9	38.0	9.1	3430	13.1	252	1100	65	921	13.4	21.6	129	14.4	64	13.1	0.50
Giugno	1.12	2.20	0.51	1120	1950	740	21.0	36.5	13.8	2900	11.1	305	1740	73	1010	14.7	23.8	77	8.6	54	11.1	0.70
Luglio	0.09	0.60	—0.25	534	790	380	10.0	14.8	7.1	1430	5.5	91	147	58	249	3.6	5.8	50	5.6	27	5.5	0.54
Agosto	0.73	2.00	—0.20	905	1780	400	16.9	33.3	7.5	2420	9.2	343	2370	77	982	14.2	23.1	124	13.8	45	9.2	0.36
Settembre	0.27	0.52	0.02	618	745	495	11.6	13.9	9.2	1600	6.2	170	586	8	270	3.9	6.3	33	3.7	30	6.2	0.91
Ottobre	1.00	2.14	0.15	1060	1900	555	19.8	35.5	10.4	2840	10.9	265	1710	87	841	12.3	19.8	143	15.9	53	10.9	0.37
Novembre	0.80	1.25	0.34	914	1200	650	17.1	22.4	12.1	2370	9.0	145	325	38	341	5.0	8.0	76	8.5	44	9.0	0.58
Dicembre	1.00	2.15	0.40	1050	1900	682	19.6	35.5	12.8	2810	10.9	309	1500	67	1030	15.0	26.2	84	9.4	53	10.9	0.63
Inverno	0.29	1.13	—0.18	634	1120	409	11.9	21.0	7.6	4990	19.7	183	1100	15	910	14.5	21.4	91	10.7	94	19.8	1.03
Primavera	0.68	2.29	—0.22	867	2030	392	16.2	38.0	7.3	6920	27.1	211	1100	45	1661	26.5	39.0	252	29.8	129	27.2	0.51
Estate	0.65	2.20	—0.25	853	1950	380	16.0	36.5	7.1	6750	26.5	246	2370	58	2241	35.8	52.7	251	29.7	126	26.6	0.50
Autunno	0.69	2.14	0.02	864	1900	495	16.2	35.5	9.2	6810	26.8	193	1710	8	1452	23.2	34.1	252	29.8	127	26.8	0.50

Elementi caratteristici per l'anno solare	Altezza idrometrica media	m.	0.60	Deflusso	milioni di mc.	26040	Torbidità integrale	migliaia di ton.	6870	
	Portata media (modulo) mc/sec.		823	$\equiv$ l/sec. kmq.	15.4	Altezza di deflusso	mm.	Degradazione media	ton/kmq.	161.4
	» di giorni	91		»	19.8	» afflusso	»			
	»	182		»	13.7	Perdita apparente	»			
	»	274		»	10.3	Coefficiente di deflusso	»			


FIUME PO A CASALMAGGIORE

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI




ANNO 1929

PO a RONCOCORRENTE



Caratteristiche della stazione:

- Estensione del bacino: Km². 62453. — Distanza dalla foce: Km. 185.
- Idrometro di riferimento: a lettura diretta sul muro d'ala in destra verso Po dalla chiavica di Roncocorrente, quota zero m. 15.26 sul m. m. — Registratore sulla 2.^a pile destra del ponte ferroviario sulla linea Modena-Mantova, Km. 25 a valle del precedente, con zero a quota m. 14.60 sul m. m. (1)
- Stazione di misura: circa m. 100 a valle della chiavica di Roncocorrente per misure fino all'altezza di piena ordinaria, e in corrispondenza del ponte ferroviario per altezze superiori. — Il fondo, mobile, è costituito da sabbia sottile, le sponde sono fisse.



(1) modificato nel 1931.

Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 895, cioè 22 in più di quelle dell'anno precedente; quelle che furono regolarmente i dati, così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isotele furono 790 cioè 53 in meno delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 891, inferiore di mm. 292 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti a partire dal 1920, fu di

mm. 1094, e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di mm. 203, ossia del 22.2 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione per l'anno in esame è di poco superiore a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (Vedi tabella a pag. 76) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpì nel 1929 l'80.4 % del bacino, contro il 60.5 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpì rispettivamente nei due anni il 18.6 % ed il 31.9 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 20.8 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 800 e mm. 1000 col 19.6 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2600 e mm. 4000.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nell'ottobre con mm. 142, e la minima nel marzo con mm. 9, detti valori rappresentano rispettivamente il 16.0 % ed il 1.0 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1920-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	46	11	9	110	123	76	48	124	33	142	79	85
normali	51	57	101	120	111	83	72	77	107	117	129	69
scostamento dalla normale .	- 5	- 46	- 92	- 10	+ 17	- 7	+ 24	+ 47	- 74	+ 25	- 50	+ 16

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni si nota che nel 1929 le precipitazioni mentre furono inferiori in

valore assoluto a quelle normali del periodo estivo, ne rimasero però superiori come valore proporzionale: infatti per il semestre aprile - settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo <i>mm.</i>	519	570
Frazione della precipitaz. annuale	58.2 %	52.0 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Roncòcorrente nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: dicembre, *mc/sec.* 1960.
 deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 3540.
 contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 31.4.
 portata minima: luglio, *mc/sec.* 341.
 deflusso mensile minimo: luglio, con *milioni mc.* 1450.
 contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 5.5.

portata media annuale: (modulo) *mc/sec.* 888.
 deflusso medio mensile: *milioni mc.* 2340.
 deflusso annuo: *milioni mc.* 28090.
 contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 14.2.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 662 ossia del 42.7 %, a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 27.4 %. — Il modulo normale (periodo 1924-1928) è di *mc.* 1480 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 592 ossia del 39.3 %.

Si ricavano poi dai dati suesposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno 1928.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo:	2.4	8.6
» » » medio:	1.5	2.6
» » » minimo e medio:	0.6	0.3
fra contributo unitario massimo e minimo:	5.7	27.6
» » » medio:	2.2	6.3
» » » minimo e medio:	0.4	0.2

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 600 e *mc/sec.* 649 con giorni 48.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.51, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 19.1 % a quello medio del periodo 1924-28 che fu di 0.63.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928 - novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.19, primavera 0.49, estate 0.43, autunno 0.44.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a

raffronto col valore medio del periodo 1924-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.72	2.36	4.00	0.26	0.45	0.59	0.48	0.31	0.79	0.32	0.53	0.58	0.51
medio	0.91	0.56	0.53	0.58	0.63	0.93	0.64	0.53	0.42	0.44	0.67	0.94	0.63

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Po a Roncocrete è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 0.65, inferiore di *m.* 1.04 a quella del 1928 ed inferiore anche a quella di *m.* 1.40 relativa al periodo 1901-1928. — La massima altezza media mensile si verificò in maggio con *m.* 1.55, la minima in luglio con -- *m.* 0.14. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-1928.

Altezza idrometrica	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dall'anno	0.37	0.20	0.58	0.25	1.55	1.12	-0.14	0.65	0.09	1.01	0.95	1.18
normale	0.67	0.64	1.47	1.66	2.10	2.51	1.24	0.72	0.92	1.63	2.10	1.29
scostamento dalle normale .	-0.30	-0.44	-0.89	-1.41	-0.55	-1.39	-1.38	-0.07	-0.83	-0.62	-1.15	-0.11

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 9 dicembre con *m.* 2.70 la minima nel giorno 27 luglio con -- *m.* 0.62. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 3.32 occupando il 32.0 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 68.5 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 68 nell'intervallo compreso fra *m.* 0.00 e *m.* 0.19.

Torbide. — Attraverso la sezione di Roncocrete passarono nel 1929 *migliaia* di *ton.* 974 di torbide valutate come materia asciutta contro un valore di *migliaia* di *ton.* 2716 riscontrato nel precedente anno 1928, ed uno medio di *migliaia* di *ton.* 3930 per il periodo 1924-28.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di dicembre con *migliaia* di *ton.* 297, il minimo in luglio con *migliaia* di *ton.* 4. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *ton.* 19.8 per *kmq.* di bacino direttamente contribuente al Po (*kmq.* 49.220 depurati dalla parte che contribuisce attraverso i grandi laghi alpini).

Il valore medio della degradazione ottenuto per gli anni precedenti (1924-28) risulta di *ton.* 79.8 per *kmq.* e quindi quello riscontrato per il periodo in esame appare molto scarso.

Temperatura delle acque. — Nel seguente prospetto si riportano i valori medi della temperatura delle acque del Po a Roncocrete mossi a raffronto con gli analoghi dati sulla temperatura dell'aria, il tutto espresso in gradi centigradi.

Temperatura media	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
Acqua	3.0	1.2	9.0	12.9	18.0	22.0	24.3	23.0	21.6	15.9	10.5	7.2	14.0
Aria	-1.2	-5.1	7.6	11.1	19.2	23.4	25.4	24.7	22.0	14.7	8.7	4.6	12.9
Scostamento	+4.2	+6.3	+1.4	+1.8	-1.2	-1.4	-1.1	-1.7	-0.4	+1.2	+1.8	+2.6	+1.1

Frequenze e durate delle portate.

Intervallo		frequenze		durate		Intervallo		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni	da	a	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
300	349	349	349	2	365	900	949	949	949	13	147
350	399	399	399	9	363	950	999	999	999	12	134
400	449	449	449	7	354	1000	1099	1099	1099	28	120
450	499	499	499	6	347	1100	1199	1199	1199	26	94
500	549	549	549	10	341	1200	1299	1299	1299	26	68
550	599	599	599	7	331	1300	1399	1399	1399	12	42
600	649	649	649	48	324	1400	1499	1499	1499	11	30
650	699	699	699	45	276	1500	1599	1599	1599	8	19
700	749	749	749	29	231	1600	1699	1699	1699	4	11
750	799	799	799	25	202	1700	1799	1799	1799	2	7
800	849	849	849	11	177	1800	1899	1899	1899	1	5
850	899	899	899	19	166	1900	1999	1999	1999	4	4

Tabella riassuntiva del regime del bacino del Po a Roncorrente e relativo bilancio (Anno 1929)

MESI	Altezza idrometrica m.			Portata mc/sec.			Contributo l/sec. Km ² .			Deflusso		Torbidità specifica gr/mc.			Torbidità integrale		Degradazione media ton/Kmq.	Altezza afflusso		Altezza deflusso		Coefficiente di deflusso
	media	massima	minima	media	massimo	minimo	milioni di mc.	‰	media	massima	minima	migliaia ton.	‰	mm.	‰	mm.		‰				
Dicembre 1928	0.85	1.52	0.30	968	1290	721	15.5	20.7	11.5	2590	—	14	88	1	27	—	0.6	27	—	41	—	1.52
Gennaio 1929	0.37	1.10	—0.10	754	1080	560	12.1	17.3	9.0	2020	7.3	14	33	7	28	2.9	0.6	45	5.2	33	7.3	0.72
Febbraio »	0.20	0.30	0.08	678	721	631	10.9	11.5	10.1	1640	5.8	8	20	2	14	1.4	0.3	11	1.2	26	5.8	2.36
Marzo »	0.58	1.28	0.12	846	1170	647	13.5	18.7	10.4	2270	8.0	19	123	2	47	4.8	0.9	9	1.0	36	8.0	4.00
Aprile »	0.25	1.28	0.02	705	1170	608	11.3	18.7	9.7	1830	6.4	8	60	2	18	1.8	0.4	110	12.3	29	6.4	0.26
Maggio »	1.55	2.60	0.08	1320	1900	631	22.1	30.4	10.1	3540	12.7	32	225	2	128	13.1	2.6	128	14.4	57	12.7	0.45
Giugno »	1.12	2.16	0.46	1090	1640	789	17.5	26.3	12.6	2830	10.0	22	345	2	84	8.6	1.7	76	8.6	45	10.0	0.59
Luglio »	—0.14	0.52	—0.62	541	815	341	8.7	13.0	5.5	1450	5.1	2	8	4	4	0.4	0.1	48	5.4	23	5.1	0.48
Agosto »	0.65	2.65	—0.58	899	1930	359	14.4	30.9	5.7	2410	8.7	33	530	4	131	13.9	2.6	124	13.9	39	8.7	0.31
Settembre »	0.09	0.36	—0.22	636	746	512	10.2	11.9	8.2	1650	5.8	4	8	4	7	0.7	0.1	33	3.7	26	5.8	0.79
Ottobre »	1.01	2.30	0.02	1040	1720	608	16.6	27.5	9.7	2780	10.0	56	447	2	186	19.1	3.8	142	16.0	45	10.0	0.32
Novembre »	0.95	1.60	0.36	1010	1330	746	16.2	21.3	11.9	2620	9.3	12	26	5	30	3.1	0.6	79	8.9	42	9.3	0.53
Dicembre »	1.18	2.70	0.36	1140	1960	746	17.8	31.4	11.9	3050	10.9	79	918	7	297	30.6	6.1	85	9.5	49	10.9	0.58
Inverno	0.47	1.52	—0.10	800	1290	560	12.8	20.7	9.0	6250	22.6	12	88	1	69	9.8	1.4	84	10.0	100	22.6	1.19
Primavera	0.79	2.60	0.02	957	1900	608	15.3	30.4	9.7	7640	27.6	20	225	2	193	27.4	3.9	247	29.7	122	27.6	0.49
Estate	0.54	2.65	—0.62	843	1930	341	13.5	30.9	5.5	6690	24.2	19	530	1	219	31.1	4.5	248	29.8	107	24.2	0.43
Autunno	0.68	2.30	—0.22	895	1720	512	14.3	27.5	8.2	7050	26.6	24	447	1	223	31.7	4.7	254	30.5	113	25.6	0.44


Deflusso milioni di mc. 28090 Torbidity integrale migliaia di ton. mc. 974
 Altezza di deflusso mm. 450 Degradazione media ton/kmq. 19.8
 » afflusso » 891
 Perdita apparente » 441
 Coefficiente di deflusso » 0.51

Altezza idrometrica media m. 0.65
 Portata media (modulo) mc/sec. 888 = l/sec. kmq. 14.2
 » di giorni 91 » 17.8
 » 182 » 12.6
 » 274 » 10.4

Elementi caratteristici
 per l'anno solare


FIUME PO A RONCOCORRENTE

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI




ANNO 1929

PO a REVERE



Caratteristiche della stazione:

- a) — — — — — Ingresso del bacino: Km. 67900.
Distanza dalla foce Km. 150.
- b) — — — — — Idrometro. Si riferimento: a lettura diretta in spdm. a destra in corrispondenza dell'abitato di Revere, quota zero m. 9.59 sul m. m. - Regia. Atore sulla 2^a pila destra del ponte ferroviario della linea Bologna - Verona, con quota pure a m. 9.59 sul m. m.
- c) — — — — — Stazione di misura: in corrispondenza della stazione idrometrica. — — — — — costituito da sabbie sottili, molle sponde fisse.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 991 cioè 10 in più di quelle dell'anno precedente; quelle che forniscono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoteie furono 889 cioè 58 in meno delle analoghe del 1928.

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo ietografico, è risultata di mm. 882, inferiore di mm. 298 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1920, fu di mm. 1092 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di

mm. 210 ossia del 23.0 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

La media precipitazione per l'anno in esame è pressoché eguale a quella dell'intero bacino chiuso a Pontelagoscuro, per il quale si ebbero mm. 876.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pagina 76) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpi nel 1929 l'81.2 % del bacino, contro il 60.5 % verificatosi nel 1928 e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpi rispettivamente nei due anni il 17.6 % ed il 32.2 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 21.2 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 800 e mm. 1000 col 19.5 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2600 e mm. 4000.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nell'ottobre con mm. 138 e la minima nel marzo con mm. 9 — detti valori rappresentano rispettivamente il 15.6 % e l'1.1 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1920-1928.


P. precipitazioni in mm.	PRECIPITAZIONI											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	50	14	9	109	122	73	47	118	32	138	85	85
normali	51	57	101	119	110	83	72	76	108	116	120	79
costante del mese	—	1	43	97	10	12	10	25	42	76	22	44
												15

Nei rigua, specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota nel 1929 le precipitazioni, mentre furono inferiori in

valore assoluto a quelle normali, nel periodo estivo ne rimasero però superiori come valore proporzionale: infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazioni semestre estivo <i>mm.</i>	501	568
Frazione della precipit. annuale	56.8 %	51.8 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Revere nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *Kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

portata massima: maggio, *mc/sec.* 1960.
 deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 3940.
 contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 28.9.
 portata minima: luglio, *mc/sec.* 413.
 deflusso mensile minimo: luglio, con *milioni mc.* 1690.
 contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 6.1.

portata media annuale (modulo): *mc/sec.* 1010.
 deflusso medio mensile: *milioni mc.* 2640.
 deflusso annuo: *milioni mc.* 31900.
 contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 14.9.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 660 ossia del 39.6 %, a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 25.2 %. — Il modulo normale (periodo 1924-1928) è di *mc.* 1570 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 560 ossia del 35.6 %.

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	2.3	5.8
» » » e medio	1.5	2.4
» » » minimo e medio	0.6	0.4
fra contributo unitario massimo e minimo	4.7	15.1
» » » e medio	1.9	5.2
» » » minimo e medio	0.4	0.3

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 800 e *mc/sec.* 849 con giorni 25.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.53, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 13.1 % a quello medio del periodo 1924-28 che fu di 0.61.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.20, primavera 0.55, estate 0.47, autunno 0.45.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a confronto col valore medio del periodo 1924-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.76	1.85	4.56	0.29	0.47	0.66	0.53	0.33	0.81	0.33	0.51	0.58	0.53
medio	0.58	0.61	0.53	0.58	0.58	0.84	0.64	0.54	0.44	0.43	0.62	0.90	0.61

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Po a Revere è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. — Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di *m.* 0.73, inferiore di *m.* 1.30 a quella del 1928 ed inferiore a quella di *m.* 1.76 relativa al periodo 1901-1928. — La massima altezza media mensile si verificò in maggio con *m.* 1.83 e la minima in luglio con — *m.* 0.69. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-1928.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	0.66	0.09	0.79	0.33	1.83	1.34	-0.16	0.63	-0.04	1.02	1.02	1.28
normali	1.00	0.98	1.83	2.06	2.52	2.07	1.61	0.87	1.23	1.07	2.42	1.68
scostamento dalla normale	-0.34	-0.89	-1.04	-1.73	-0.69	-1.63	-1.77	-0.24	-1.27	-0.95	-1.40	-0.40

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 7 maggio con *m.* 2.96, la minima nel giorno 27 luglio con — *m.* 0.69. — L'escursione annua fu dunque di *m.* 3.65 occupando il 33.0 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 64.8 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 41 nell'intervallo compreso fra *m.* 0.00 e *m.* 0.19.

Torbide. — Attraverso la sezione di Revere passarono nel 1929 *migliaia* di *ton.* 5763 di torbide valutate come materia asciutta contro un valore di *migliaia* di *ton.* 15964 riscontrato nel precedente anno 1928.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di maggio con *migliaia* di *ton.* 1270, il minimo in luglio con *migliaia* di *ton.* 84. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *ton.* 109.5 per *kmq.* di bacino direttamente contribuente al Po (*Kmq.* 52610 depurati dalla parte che contribuisce attraverso i grandi laghi alpini).

Temperatura delle acque. — Nel seguente prospetto si riportano i valori medii della temperatura delle acque del Po a Revere messi a raffronto con gli analoghi dati sulla temperatura dell'aria, il tutto espresso in gradi centigradi.


Temperatura media	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
Acqua	3.0	1.5	8.9	14.6	17.8	23.5	25.7	25.1	23.3	16.5	12.0	7.9	15.0
Aria	-0.6	-4.1	6.9	11.9	20.8	23.4	25.1	24.2	21.1	15.0	10.6	7.0	13.5
Scostamento	+3.6	+5.6	+2.0	+2.7	-3.0	+0.1	+0.6	+0.9	+2.2	+0.6	+1.4	+0.9	+1.5

Frequenze e durate delle portate.


Intervallo		frequenze		durate	
da	a	mc/sec.	giorni	da	a
mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	giorni	mc/sec.	mc/sec.
400	449	449	7	365	999
450	499	499	9	358	1099
500	549	549	10	349	1199
550	599	599	9	339	1299
600	649	649	15	330	1399
650	699	699	21	315	1499
700	749	749	20	294	1599
750	799	799	23	274	1699
800	849	849	25	251	1799
850	899	899	22	226	1899
900	949	949	22	204	1999

FIUME PO A REVERE

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI




PO a PONTELAGOSCURO



Caratteristiche della stazione:

- Estensione del bacino: Km. 70091.
Distanza dalla foce: Km. 96.
- Idrometro di riferimento: a lettura diretta in sponda destra a valle del ponte strada Ferrara - Rovigo, quota zero m. 8.51 sul m. m. — Registratore alla 2^a pila in destra del ponte ferroviario sulla linea Ferrara-Rovigo, con zero a quota 8.50 sul m. m.
- Stazione di misura: m. 180 a valle del ponte della strada Ferrara - Rovigo, in corrispondenza della sezione di chiusura. — Fondo costituito da sabbia sottile, mobile, sponde fisse.



Precipitazioni. — Nell'anno 1929 le stazioni pluviometriche esistenti furono 1064, con un aumento di 40 rispetto a quelle dell'anno precedente; quelle che fornirono regolarmente i dati così da poter essere utilizzate per la carta annuale delle isoiete furono 937 cioè 42 meno delle analoghe del 1928.

Lo specchio seguente indica la distribuzione altimetrica delle stazioni che hanno regolarmente funzionato nei due periodi considerati:

STAZIONI	fino m. 500		da m. 500 a m. 1000		da m. 1000 a m. 1500		da m. 1500 a m. 2000		oltre m. 2000	
	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.	s. m.
Anno 1929 . .	59	89	215	352	132	50	40			
* 1928 . .	58	87	234	364	139	57	40			
Variazioni . .	+ 1	+ 2	- 19	- 12	- 7	- 7	-			

La media precipitazione annuale, calcolata col metodo isografico, è risultata di mm. 876, inferiore di mm. 295 rispetto a quella dell'anno 1928.

La media precipitazione degli anni precedenti, a partire dal 1920, fu di mm. 1119 e quindi la precipitazione dell'anno in esame, inferiore di mm. 243 ossia del 20.4 % al valore medio su indicato, appare notevolmente scarsa.

Nei riguardi della distribuzione altimetrica delle precipitazioni (vedi tabella a pag. 76) si osserva che la precipitazione fino a mm. 1200 colpi nel 1929 l'81.5 % del bacino, contro il 61.0 % verificatosi nel 1928, e che quella compresa fra i mm. 1200 e mm. 2000 colpi rispettivamente nei due anni il 17.3 % ed il 32.0 % del bacino stesso.

Dal confronto fra i due anni emerge pure che nel 1929 la aliquota maggiore delle precipitazioni fu compresa fra mm. 600 e mm. 800 col 21.1 % mentre nel 1928 essa cadde nell'intervallo fra mm. 800 e mm. 1000 col 20.1 %; e che il valore massimo della precipitazione fu rispettivamente nei due anni mm. 2600 e mm. 4000.

La massima precipitazione media mensile si ebbe nell'ottobre con mm. 138 e la minima nel marzo con mm. 8 — detti valori rappresentano rispettivamente il 15.8 % ed il 0.9 % della precipitazione totale dell'anno.

Nel seguente prospetto sono messe a raffronto le precipitazioni medie mensili dell'anno in esame con quelle normali ricavate dagli stessi elementi per il periodo 1920-1928.


PRECIPITAZIONI in mm.											
Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
dell'anno	52	14	8	106	122	71	45	115	31	138	86
normali	55	58	104	124	111	85	73	111	119	128	73
scostamento dalla media . .	- 3	- 44	- 96	- 18	+ 11	- 14	+ 28	+ 37	- 80	+ 19	+ 13

Nei riguardi specialmente del regime dei deflussi e delle relative utilizzazioni, si nota che nel 1929 le precipitazioni, mentre furono inferiori in

valore assoluto a quelle normali del periodo estivo, ne rimasero però superiori come valore proporzionale; infatti per il semestre aprile-settembre si hanno i seguenti dati:

	Anno 1929	Anno medio
Precipitazione semestre estivo <i>mm.</i>	490	582
Frazione della precipitazione annuale	55.9 %	49.0 %

Deflussi. — Nelle tabelle annesse sono esposte le portate medie ed i deflussi del Po a Pontelagoscuro nei loro valori mensili, stagionali ed annui, nonché i relativi contributi unitari per *kmq.* di bacino.



Da tali tabelle si ricavano i seguenti dati caratteristici:

- portata massima: maggio, *mc/sec.* 2220.
- deflusso mensile massimo: maggio, *milioni mc.* 4260.
- contributo unitario massimo: *l/sec. kmq.* 31.7.
- portata minima: luglio, *mc/sec.* 428.
- deflusso mensile minimo: luglio, *milioni mc.* 1750.
- contributo unitario minimo: *l/sec. kmq.* 6.1.
- portata media annuale: (modulo): *mc/sec.* 1090.
- deflusso medio mensile: *milioni mc.* 2870.
- deflusso annuo: *milioni mc.* 34470.
- contributo unitario medio: *l/sec. kmq.* 15.5.

Il modulo per l'anno 1929 risulta inferiore di *mc/sec.* 710, ossia del 45.0% a quello del 1928 mentre le precipitazioni ne furono inferiori soltanto del 25.2%. Il modulo normale (periodo 1920-28) è di *mc/sec.* 1600 e quindi nell'anno in esame il valore del modulo fu inferiore al normale di *mc/sec.* 510 ossia del 38.2 %

Si ricavano poi dai dati su esposti i seguenti rapporti che sono qui messi a raffronto con quelli analoghi verificatisi nel precedente anno.

	Anno 1929	Anno 1928
fra deflusso mensile massimo e minimo	2.4	6.5
» » » e medio	1.5	2.3
» » » minimo e medio	0.6	0.4
fra contributo unitario massimo e minimo	5.2	15.9
» » » e medio	2.0	4.8
» » » minimo e medio	0.4	0.3

Infine dalla tabella delle frequenze e durate delle portate e dai grafici relativi si ricava che la maggior frequenza si ebbe nell'intervallo fra *mc/sec.* 850 e *mc/sec.* 899 con giorni 28.

Coefficienti di deflusso. — Dalle allegate tabelle si ricava che per l'anno 1929 il coefficiente di deflusso risultò di 0.56, inferiore a quello verificatosi nel 1928 ed inferiore del 12.5 % a quello medio del periodo 1920-28 che fu di 0.64.

I coefficienti stagionali per l'anno idrologico dicembre 1928-novembre 1929 risultano come segue: inverno 1.31, primavera 0.59, estate 0.49, autunno 0.44.

Nel prospetto che segue i coefficienti di deflusso mensili sono messi a raffronto col valore medio del periodo 1920-1928 definito come il rapporto tra il valore medio dei deflussi e quello degli afflussi.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
1929	0.77	2.50	5.50	0.33	0.50	0.69	0.56	0.33	0.84	0.32	0.50	0.58	0.56
medio	0.89	0.76	0.56	0.56	0.68	0.85	0.71	0.49	0.42	0.55	0.66	0.85	0.64

Stato idrometrico. — Lo stato idrometrico del Po a Pontelagoscuro è messo in evidenza, oltre che nelle tabelle, anche nel diagramma allegato. Si riportano qui alcuni dati caratteristici.

La media altezza idrometrica fu di — *m.* 3.53, inferiore di *m.* 1.09 a quella del 1928 ed inferiore a quella di — *m.* 2.64 relativa al periodo 1901-28. — La massima altezza media mensile si verificò in maggio con — *m.* 2.51, la minima in luglio con — *m.* 4.47. — Nel seguente prospetto sono messi a raffronto i valori idrometrici medi mensili del 1929 con quelli del periodo 1901-28.

Altezze idrometriche	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
dell'anno	3.58	3.69	3.36	3.81	2.51	3.03	4.47	3.76	4.36	3.39	3.30	3.10
normali	3.33	3.34	2.68	2.31	1.91	1.50	2.83	3.55	3.23	2.47	1.90	2.67
scostamento dalla normale	0.25	0.35	0.68	1.50	0.60	1.53	1.64	0.21	1.13	0.92	1.40	0.43

La massima altezza meridiana si ebbe il giorno 7 maggio con — *m.* 1.35 la minima nel giorno 28 luglio con — *m.* 4.99 — L'escursione annua fu dunque di *m.* 3.64 occupando il 38.6 % del campo di escursione compreso fra la massima e la minima conosciuta, ed il 72.2 % di quello compreso fra i limiti di piena e di magra ordinaria. — La massima frequenza idrometrica fu di giorni 44 nell'intervallo compreso fra — *m.* 4.00 e — *m.* 3.81.

Torbide. — Attraverso la sezione di Pontelagoscuro passarono nel 1929 *migliaia* di *ton.* 4927 di torbide valutate come materia asciutta contro un valore di *migliaia* di *ton.* 20281 riscontrato nel precedente anno 1928 ed uno medio di *migliaia* di *ton.* 15027 nel periodo 1924-28.

Il massimo apporto mensile si verificò nel mese di maggio con *migliaia ton.* 782, il minimo in settembre con *migliaia ton.* 49. — La torbida integrale corrisponde ad una degradazione di *ton.* 89.9 per *Kmq.* di bacino direttamente contribuente al Po (*Kmq.* 54800 depurati dalla parte che contribuisce attraverso i grandi laghi alpini).

Il valore medio della degradazione ottenuto per gli anni precedenti (1924-28) risulta di *ton.* 334 per *kmq.* e quindi quello riscontrato per il periodo in esame appare molto scarso.

Temperatura delle acque. — Nel seguente prospetto si riportano i valori medi della temperatura delle acque del Po a Pontelagoscuro messi a raffronto con gli analoghi dati sulla temperatura dell'aria, il tutto espresso in gradi centigradi.

Temperatura media	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	ANNO
Acqua	2.2	0.0	8.2	12.8	18.6	23.8	25.6	24.5	22.7	15.9	10.4	6.6	14.3
Aria	0.5	4.0	8.0	12.5	20.2	25.3	24.7	24.0	21.1	14.6	8.5	4.4	13.3
Scostamento	+ 2.7	+ 4.0	+ 0.2	+ 0.3	— 1.6	— 1.5	+ 0.9	+ 0.5	+ 1.6	+ 1.3	+ 1.9	+ 2.2	+ 1.0

I valori stagionali e annuali della temperatura dell'acqua pel 1929 sono messi a raffronto con quelli normali, ricavati dal periodo 1924-28 nel seguente prospetto:

	Temperatura dell'anno	Temperatura normale	Scostamento
Inverno	2.9	5.1	— 2.2
Primavera	13.2	14.0	— 0.8
Estate	24.6	23.2	+ 1.4
Autunno	16.3	14.9	+ 1.4
Anno	14.3	14.3	—



Frequenze e durate delle portate.

Intervalli		frequenze		durate	
da	a	da	a	da	a
mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	mc/sec.	giorni	giorni
400	449	3	365	3	365
450	499	11	362	11	362
500	549	7	351	7	351
550	599	11	344	11	344
600	649	10	333	10	333
650	699	9	323	9	323
700	749	13	314	13	314
750	799	20	301	20	301
800	849	20	281	20	281
850	899	28	261	28	261
900	949	20	233	20	233
950	999	23	213	23	213
1000	1099	28	190	28	190

8

FIUME PO A PONTELAGOSCURO

PIOGGIE MEDIE MENSILI SUL BACINO E DIAGRAMMI IDROMETRICI



ANNO 1929

(14-5) Ufficio Geografico del Istituto Nazionale di Statistica - Roma

F) - Caratteristiche generali e particolarità idrologiche per l'anno 1929.

Tab. I. Stazioni di osservazione nel bacino del Po per 1929.

SEZIONI	PLUVIOMETRICHE					IDROMETRICHE				FREATTOMETRICHE		MISURE TORBIDE		MISURE DI PORTATA			
	Pluvio- metri	Pluvio- grafi	Pluvioni- vometri	Totaliz- zatori	Totale	Variazioni rispetto al 1928	a lettura diretta	registra- tori	Totale	Variazioni rispetto al 1928	Pozzi	Variazioni rispetto al 1928	Stazioni	Variazioni rispetto al 1928	misure effettuate	Variazioni rispetto al 1928	
Sezione di Milano . . .	245	7	117	21	390	+ 11	75	19	94	—	66	— 1	10	— 1	30	47	— 87
Sezione di Torino . . .	136	19	173	33	361	+ 14	33	13	46	— 2	14	—	14	—	21	118	+ 37
Sezione di Parma . . .	197	13	96	7	313	+ 15	94	28	122	—	72	— 14	33	—	32	150	— 3
Totale	578	39	386	61	1064	+ 40	202	60	262	— 2	152	— 15	57	— 1	83	315	— 53

TABELLA RIASSUNTIVA

delle caratteristiche idrologiche del Fiume Po per l'anno 1929

Tab. II.

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE ALLE STAZIONI DI	Moncalieri	Piacenza	Casalmaggiore	Roncorrente	Revere	Pontelagoscuro
Estensione del bacino { complessiva Kmq. per il calcolo della torbida }	4885	42030	53460	62450	67900	70091
Precipitazione media nell'anno mm. » nel semestre estivo (aprile-settembre)	672	878	897	891	882	876
Modulo mc/sec.	440	523	527	519	501	490
Modulo del semestre estivo (aprile-settembre)	48	643	823	888	1010	1090
Deflusso nell'anno milioni mc.	47	672	840	865	977	1035
Contributo medio per kmq. l/sec.	1512	20300	26040	28090	31900	34440
Coefficiente di deflusso	9.8	15.3	15.4	14.2	14.9	15.5
Altezza idrometrica media m.	0.46	0.55	0.54	0.51	0.53	0.56
» riferita al medio mare m.	— 0.26	1.25	0.60	0.65	0.73	— 3.53
Torbidità specifica media gr/mc.	215.39	43.31	24.09	15.91	10.31	4.98
Torbida integrale migliaia ton.	»	»	219	24	145	118
Degradazione media ton/Kmq.	»	[3733]	6870	974	5763	4927
Temperatura media dell'acqua centigradi	»	105.4	161.4	19.8	109.5	89.9
» dell'aria	12.5	13.5	14.6	14.0	15.0	14.3
»	12.4	11.6	12.1	12.9	13.5	13.3

PRECIPITAZIONI

a) **Valle padana.** — Come si è già detto parlando del bilancio idrologico del Po a Pontelagoscuro, la media precipitazione sull'intero bacino del Po fu nel 1929 di *mm.* 876, notevolmente inferiore, e cioè di *mm.* 243, a quella media del periodo 1920-1928 che risulta di *mm.* 1119. La media del totale periodo 1873-1928 a cui si può con deduzione abbastanza sicura fare riferimento risulta di *mm.* 1224, e rispetto a questa la precipitazione del 1929 risultò inferiore di *mm.* 248, o del 20%.

Escludendo i casi singoli eccezionali, e riferendosi a quanto risulta dalla carta delle isoiete, si ha che le precipitazioni di maggiore entità, oltre i 2000 *mm.*, si ebbero per la regione alpina in destra del Lago Maggiore e nell'alta valle del Serio e per la regione appenninica nell'alta valle della Stura, al confine col versante ligure; i *mm.* 2000 vennero altresì raggiunti nelle alte valli del Brembo, della Trebbia e dell'Enza. Le precipitazioni di minore entità, inferiori ai 400 *mm.*, si ebbero in genere nella pianura adiacente al corso del Po, con particolare accentuazione nella zona del Monferrato e nella regione tra Mirandola e Serride in destra del fiume; un centro di scarsa precipitazione si ebbe anche nella Valle d'Aosta.

Nei riguardi della distribuzione mensile, si deve rilevare che furono deficientissimi due mesi, il marzo ed il settembre, che normalmente si presentano con precipitazioni notevoli: meno grave fu la deficienza nei mesi estivi. Caratteristiche furono le condizioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo: infatti in tutto il trimestre le precipitazioni furono deficientissime, e quelle del gennaio e febbraio furono costituite esclusivamente da nevi, anche nella pianura, essendosi in tale periodo la temperatura media mantenuta sempre inferiore allo zero.

b) **Regione emiliana.** — I caratteri sopra accennati per l'intera valle padana si riscontrano anche più accentuati quando si consideri la sola regione emiliana: nei vari bacini che la costituiscono la precipitazione annua

risultò inferiore al valore normale dal 23 al 38.6%, con una media del 33% circa. Soltanto i mesi di maggio e di agosto ebbero precipitazioni in media superiori al normale, e ciò fu assai utile per l'agricoltura. Caratteristica la deficienza fortissima del primo quadrimestre, accentuata dal fatto che le precipitazioni del gennaio e febbraio si verificarono sotto forma di neve. La temperatura media dei mesi di gennaio e febbraio e della prima decade di marzo fu assai bassa, così, contrariamente a quanto si verificava da parecchi anni, anche nell'alta pianura la neve si mantenne lungamente sul suolo. Lo strato nevoso assunse la sua massima potenza nella seconda decade del mese di gennaio e scomparve soltanto fra la prima e la seconda decade del mese di marzo. Quest'ultimo mese fu poi caratterizzato da una quasi assoluta assenza di precipitazioni: si ebbero infatti in media sulla regione *mm.* 4 di pioggia con un sol giorno piovoso.

Pur essendo ovunque deficienti, le precipitazioni furono tuttavia relativamente più abbondanti nella parte occidentale della regione ed infatti si nota che le precipitazioni annue inferiori ai 1000 *mm.* colpirono rispettivamente il 23.8% il 74.4%, l'88.6%, l'82.7%, il 74.2% il 74.3% dei bacini della Trebbia, del Taro, del Parma, dell'Enza, della Secchia, del Panaro, e quelle superiori a 1000 *mm.* si estesero invece al 76.2% al 25.6%, al 21.4%, al 17.3%, al 25.8% ed al 25.7% degli stessi bacini.

PIENE E MAGRE NOTEVOLI

In relazione a quanto si è detto per le precipitazioni, l'anno 1929 non segnò piene di particolare importanza: nel fiume Po il massimo livello raggiunto nell'anno rimase di molto inferiore al livello di piena ordinaria, come appare dal seguente prospetto:

LOCALITÀ	Piacenza	Cassiniggione	Rancocorrente	Revere	Pontelagoscuro
max altezza idrometrica dell'anno 1929	3.45	2.29	2.70	2.96	1.35
livello idrometrico di piena ordinaria	5.15	3.90	4.70	5.03	0.70
scostamento	— 1.70	— 1.61	— 2.00	— 2.07	— 2.05

Negli affluenti emiliani si ebbe qualche piena abbastanza notevole, sebbene in genere inferiore al livello di magra ordinaria, e se ne riportano in appresso gli elementi principali.

Trebbia a San Salvatore. - Bacino Km^q. 619 -- Si ebbe una sola piena notevole, nell'aprile-maggio, di cui si espongono qui di seguito gli elementi caratteristici:

DATA	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Precipit. ragguagliata mm.	14	20	19	27	37	31	0	0	3	3	7	1	0
Afflusso corrispondente migliaia mc.	8666	17061	11761	10713	22903	13189	0	0	1357	1357	4339	310	0
Portata media mc./sec.	8.5	212	68	127	549	181	07	51	38	30	27	23	20
Deflusso migliaia mc.	734	18317	5875	10973	41842	15638	5789	4406	8838	3528	2833	1937	1728

Afflussi migliaia mc. 105 849.
Deflussi » » » 118 497.

Deflussi depurati dalla magra preesistente:

$118497 - 734 \times 13 = migliaia\ mc.\ 108\ 955.$

Coefficiente medio di deflusso $= \frac{108\ 955}{105\ 849} = 1.03.$

Ritroviamo, come sempre sinora, un risultato poco attendibile e siccome non risulta che alla piena abbia contribuito lo sciogliersi di nevi preesistenti, almeno in misura sensibile, e d'altronde la scala delle portate è stata di recente corretta a seguito di nuove misure, il risultato stesso non può per momento attribuirsi se non, forse, a inesatta conoscenza delle precipitazioni nella zona più alta. Comunque, il fatto è degno di studio, e però l'Ufficio provvederà in seguito agli opportuni accertamenti.

Premessa tale riserva, si ricavano i seguenti altri valori della piena:
deflusso (depurato dalla magra) al colmo della piena (3 maggio) ==
 = migliaia mc. 77071 = aliquota deflusso totale 0.71
portata di piena al colmo = mc/sec. 519 — 8.5 = 510.5

coefficiente di piena al colmo $= \frac{510.500}{77.071.000} = 0.000\ 066$

portata media meteorica durante la piena ==

$= 113.6 - 8.5 = mc./sec.\ 105.100$

portata di piena al colmo $= \frac{519.5}{105.1} = 4.86$
portata media di piena

contributo di piena al colmo $= \frac{510 \times 500}{619} = l/sec.\ 825\ per\ Km^q.$

contributo medio di piena $= \frac{105\ 100}{619} l/sec.\ 170\ per\ Km^q.$

Taro a S. Quirico. — Bacino km^q. 1476. — Unica piena notevole si ebbe nel dicembre, e di essa di espongono di seguito gli elementi caratteristici:

DATA	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
Precipitazione ragguagliata . . mm.	2	12	30	3	0	0	0	0	0	0	0
Afflusso corrispondente migliaia mc.	2952	17713	44380	4438	0	0	0	0	0	0	0
Portata media mc/sec.	7.65	9.04	200.1	42.5	55.8	58.1	55.8	49.1	30.0	30.0	30.0
Deflusso . . . migliaia mc.	601	781	22300	1400	4920	5110	4820	4242	2562	2592	2592

afflussi migliaia mc. 69372
deflussi » » 52110
deflussi depurati della magra preesistente (mc./sec. 7.65) migliaia mc. 48839
coefficiente medio di deflusso $= \frac{48839}{69372} = 0.70.$

Si ricavano poi i seguenti altri valori della piena:
deflusso (rettificato come sopra) al colmo di piena (27 dicembre)
 = migliaia mc. 21959 = aliquota deflusso totale 0.45

portata di piena al colmo: $mc/sec. 260.1 - 7.65 = mc/sec. 252.450$
 coefficiente di piena al colmo $= \frac{252.450}{21959000} = 0.000 115$
 portata media meteorica durante la piena =
 $= 59.010 - 7.650 = mc/sec. 52.360$
 $\frac{\text{portata di piena al colmo}}{\text{portata media di piena}} = \frac{252.450}{52.360} = 4.82$
 contributo di piena al colmo $= \frac{252.450}{1476} = l/sec. 171 \text{ per } Kmq.$
 contributo medio di piena $= \frac{52.360}{1476} = l/sec. 35.5 \text{ per } Kmq.$

Parma a Baganzola. — Bacino $Kmq. 604$. — Si ebbe una sola piena di qualche entità, nel dicembre, inferiore però al livello di piena ordinaria. Le relative caratteristiche sono esposte qui appresso.

DATA	25	26	27	28	29	30	31	1
Precipitazione raggiunta <i>mm.</i>	2	5	17	4	0	0	0	0
Afflusso corrispondente <i>migliaia mc.</i>	1208	3020	10268	2416	0	0	0	0
Portata media <i>mc/sec.</i>	3.78	3.78	192.4	30.0	23.1	13.8	8.0	3.78
Deflusso <i>migliaia mc.</i>	320	336	10600	2590	1990	1190	691	326

afflussi *migliaia mc. 16912*
 deflussi » 18039
 deflussi depurati dalla magra preesistente ($mc/sec. 3.78$) = *migl. mc. 15431*
 coefficiente medio di deflusso $= \frac{15431}{16912} = 0.91$

Tale valore è un po' alto, ma concorda con quello trovato per le piene dell'anno precedente. Si ricavano poi i seguenti altri valori della piena: deflusso (rettificato come sopra) al colmo di piena (27 dicembre) =
 $= \text{migliaia mc. } 10274 = \text{aliquota deflusso totale } 0.67.$

portata di piena al colmo: $mc/sec. 122.4 - 3.78 = mc/sec. 118.62$
 coefficiente di piena al colmo $= \frac{118.620}{10 274 000} = 0.000 115$
 portata media meteorica durante la piena: $29.266 - 3.780 = mc/sec. 25.486$
 $\frac{\text{portata di piena al colmo}}{\text{portata media di piena}} = \frac{118.620}{25.486} = 4.66$
 contributo di piena al colmo: $\frac{118.620}{604} = l/sec. 196 \text{ per } Kmq.$
 contributo medio di piena: $\frac{25.486}{604} = l/sec. 42 \text{ per } Kmq.$

Enza a Lentigione. — Bacino $Kmq. 644$. — Si ebbe una sola piena di qualche entità, nel dicembre, inferiore però al livello di piena ordinaria. Le relative caratteristiche sono esposte qui appresso:

DATA	26	27	28	29	30	31	1
Precipitazione raggiunta <i>mm.</i>	13	23	1	1	0	0	0
Afflusso corrispondente <i>migliaia mc.</i>	8372	14812	644	644	0	0	0
Portata media <i>mc/sec.</i>	0.992	139.0	31.0	12.0	10.7	7.97	6.0
Deflusso <i>migliaia mc.</i>	86	12000	2680	1040	924	687	518

Afflussi *migliaia mc. 24472*
 Deflussi » 17935
 Deflussi depurati dalla magra preesistente ($mc/sec. 0.992$) = *migliaia mc. 17333*
 Coefficiente medio di deflusso $= \frac{17333}{24472} = 0.71.$

Si ricavano poi i seguenti altri valori della piena: Deflusso (rettificato come sopra) al colmo di piena (27 dicembre) =
 $= \text{migliaia mc. } 11914 = \text{aliquota del deflusso totale } 0.69.$

Portata di piena al colmo: $mc/sec.$ 139.0 — 0.992 = $mc/sec.$ 138.008.

Coefficiente di piena al colmo = $\frac{138.008}{11914000} = 0.000.116$

Portata media meteorica durante la piena: $mc/sec.$ 29.666.

portata di piena al colmo $\frac{138.008}{29.666} = 4.65$
portata media di piena

Contributo di piena al colmo = $\frac{138008}{644} = l/sec.$ 214 per $Kmq.$

Contributo medio di piena = $\frac{29.666}{644} = l/sec.$ 46 per $Kmq.$

Secchia a Ponte Bacchello. — Bacino $Kmq.$ 1250. — Una piena di qualche entità, ma però di molto inferiore al livello di piena ordinaria, si ebbe nel novembre. — Le relative caratteristiche sono esposte qui appresso:

DATA	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Precipitazione raggiunta . $mm.$	6	14	33	26	4	1	3	0	6	3	3
Afflusso corrispondente $migl. mc.$	6250	17600	41950	33500	5000	1250	3750	0	7500	3750	3750
Portata media . . . $mc/sec.$	7.63	6.51	55.7	135.0	46.2	34.0	23.2	24.0	22.4	17.0	13.4
Deflusso . . . $migliaia mc.$	661	562	4810	11000	4150	2340	3000	2070	1980	1470	1100

Afflussi $migliaia mc.$ 122 500

Deflussi » 32 766

Deflussi depurati dalla magra preesistente ($mc/sec.$ 6.51) = $migl. mc.$ 26 584

Appare che le piogge dei giorni 8-9-10 non ebbero influenza sulle piogge in esame, e però gli afflussi da prendere in considerazione ascendono a $migliaia mc.$ 122 500 — 15 000 = 107 500.

Coefficiente medio di deflusso = $\frac{26584}{107500} = 0.25.$

Questo valore, assai deficiente, deve probabilmente attribuire, in poca parte ai serbatoi esistenti nell'alto bacino del Secchia, e pel resto al fatto

che parte delle precipitazioni ebbe forma di neve e defui più tardi. Per quanto i valori esposti non siano, per le ragioni dette, completamente attendibili, si ricavano tuttavia i seguenti altri elementi della piena:

Deflusso (rettificato come sopra) al colmo di piena (3 novembre)

= $migliaia mc.$ 14788 = $aliquota$ del deflusso totale 0.56

Portata di piena al colmo: $mc/sec.$ 128.000 — 6.510 = $mc/sec.$ 121.490.

Coefficiente di piena al colmo = $\frac{121.490}{14788000} = 0.000.082$

Portata media meteorica durante la piena = $mc/sec.$ 34.555.

portata di piena al colmo $\frac{121.490}{34.555} = 3.51$

portata media di piena

Contributo di piena al colmo = $\frac{121490}{1250} l/sec.$ 97 per $Kmq.$

Contributo medio di piena = $\frac{34555}{1250} l/sec.$ 28 per $Kmq.$

Panaro a Bomporto - Bacino $Kmq.$ 960. — Una piena di qualche entità si ebbe nel dicembre, senza raggiungere però il livello di piena ordinaria.

Le relative caratteristiche sono esposte qui in appresso:

DATA	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Precipitazione raggiunta . $mm.$	4	20	2	0	1	1	0	0	2
Afflusso corrispondente $migliaia mc.$	3840	19200	1920	0	960	960	0	0	1920
Portata media . $mc/sec.$	4.48	192.0	190.0	47.7	26.7	16.4	15.9	10.7	6.52
Deflusso . $migliaia mc.$	387	16600	9420	4120	2220	1420	1374	924	563

Afflussi $migliaia mc.$ 28 880

Deflussi » 37 028

Deflussi depurati dalla magra preesistente ($mc/sec.$ 4.48) =
= $migliaia mc.$ 33 545

Coefficiente di deflusso = $\frac{33545}{28800} = 1.16.$

Detto valore, data la natura del bacino e date le condizioni in cui si è svolta la piena, non è attendibile: probabilmente sono avvenute variazioni nell'alveo del fiume per cui la scala di portata non risulta attendibile, per il che sono in corso accertamenti che, a cagione delle persistenti condizioni di magra, non hanno dato ancora risultati sufficienti. Per tale motivo si omette di calcolare gli altri elementi della piena.

**

La magra estiva, per quanto si è detto circa la distribuzione delle precipitazioni, non ebbe carattere di eccezione: nel Po i livelli minimi raggiunti nell'annata furono di poco inferiori al livello di magra ordinaria, come appare dal seguente prospetto:

LOCALITÀ	Piacenza	Casalmaggiore	Soncogiarre	Revere	Pontelagoscuro
Minima altezza idrometrica anno 1929 . .	0.55	— 0.25	— 0.62	— 0.69	— 4.99
Livello idrometrico di magra ordinaria . .	0.74	0.09	— 0.16	— 0.07	— 4.35
Scostamento	— 0.19	— 0.34	— 0.46	— 0.62	— 0.64

Interessante fu il comportamento del Po nel primo bimestre dell'anno poichè vi si verificò in misura eccezionale il fenomeno dei ghiacci, che ha ivi ben pochi precedenti storici, alterando i deflussi e conseguentemente i livelli idrometrici. Su tale argomento è stato pubblicato negli « Annali dei Lavori Pubblici » Anno 1929, fasc. 9°, uno studio esauriente dell'Ispettore Superiore del Circolo del Po Comm. Prof. Giandotti, e però ad esso si fa completo riferimento.

Negli affluenti emiliani la magra estiva si presentò coi consueti caratteri per cui la portata risultò per lunghi periodi nulla o tale da essere completamente esaurita nelle scarse irrigazioni esistenti.

Qualche interesse presenta la magra invernale poichè, contrariamente al normale, le precipitazioni del periodo gennaio-febbraio furono composte quasi esclusivamente di neve e la temperatura di tutto quel periodo fu assai bassa così che gli afflussi meteorici furono scarsissimi, accrescendosi invece nel marzo del contributo della fusione delle nevi. Nel prospetto che segue sono raccolte per ciascuno dei principali affluenti le portate medie decadiche del trimestre gennaio-marzo espresse in mc/sec. ed in aliquote della portata media della prima decade di gennaio.

CORSO D'ACQUA	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Trebbia a S. Salvatore	5.000	4.770	4.470	4.000	3.740	4.780	6.040	14.900	10.090
	1.00	0.95	0.89	0.80	0.75	0.96	1.21	2.98	2.02
Taro a S. Quirico	25.910	22.400	18.900	17.600	15.290	27.340	32.520	43.950	22.580
	1.00	0.86	0.73	0.68	0.58	1.06	1.26	1.70	0.87
Parna a Baganzola	5.290	3.930	3.640	3.390	2.710	2.260	21.310	18.630	9.390
	1.00	0.74	0.69	0.64	0.51	0.43	4.03	3.52	1.77
Enza a Lentigione	8.810	5.090	4.820	4.040	3.620	4.040	9.400	23.560	9.810
	1.00	0.58	0.55	0.46	0.41	0.46	1.07	2.67	1.11
Secchia a Ponte Bacchello	26.020	23.640	18.400	fiume ghiacciato dal 5 al 24			24.500	55.630	31.940
	1.00	0.91	0.71				0.94	2.14	1.23
Panaro a Bomporto	40.510	13.500	10.800	10.260	9.960	16.010	41.780	76.050	37.690
	1.00	0.33	0.27	0.25	0.25	0.40	1.03	1.87	0.93

I dati della suesposta tabella mettono in evidenza come la influenza della temperatura invernale sul regime dei corsi d'acqua della regione, nel senso di trattenere le precipitazioni del periodo sotto forma di neve provocando così l'esaurimento dei deflussi dei corsi d'acqua, si sia svolta in misura maggiore da occidente verso oriente: mentre infatti la portata minima nel periodo è per la Trebbia pari a 0.75 della portata iniziale, l'analoga aliquota risulta di 0.58 pel Tarò, di 0.43 pel Parma, di 0.41 per l'Enza e di 0.15 pel Panaro. Ciò è in perfetta relazione con l'andamento delle temperature nella regione emiliana nel primo bimestre del 1929. È da rilevare tuttavia che, nonostante le bassissime temperature, qualche contributo ai corsi d'acqua dovette pervenire da parziale fusione delle nevi perché la magra, pur molto accentuata, non raggiunse però valori estremi.

ACQUE FREATICHE

a) **Valle Padana** - Nel complesso, il livello delle acque freatiche fu nel 1929 poco discosto dal valore normale, con tendenza a scendere sotto di esso, specialmente negli ultimi mesi, in maggiore misura nella regione tra Oglio e Mincio, in quella di Alessandria e nella parte occidentale dell'Emilia. In genere si ebbe nell'annata uno svaso della falda, chiudendosi con quote di livello alquanto inferiori a quelle con cui l'anno si era iniziato.

b) **Regione Emiliana** - Si riportano anche per 1929 le caratteristiche dell'andamento dei 10 pozzi già prescelti per rappresentare la falda freatica della regione: da esse, come anche da tutti gli altri dati raccolti, appare che il livello freatico fu in genere, specialmente nella seconda metà

dell'anno, piuttosto inferiore al valore normale indicando, nei valori finali, uno svaso della falda nel ciclo annuale. In relazione probabilmente alla distribuzione delle precipitazioni che, come si è visto, diede per la stagione estiva una percentuale maggiore del normale, l'escursione nell'anno dei livelli freatici risultò in genere assai minore, non solo di quella definita dai livelli estremi assoluti, ma anche di quella del precedente anno 1928, mentre la soggiacenza media del livelló freatico al terreno risulta in genere superiore a quella del 1928, in relazione evidentemente alla scarsità assoluta delle precipitazioni.

LOCALITÀ	ANNO 1929 Quota sul medio mare del livelló freatico			Soggiacenza al terreno del livelló medio	ESCURSIONE	
	massimo m.	medio m.	minimo m.		nell'anno 1929 m.	fra i livelli estremi assoluti m.
1 Pozzolo Formigaro . . .	158.05	156.42	154.70	8.23	3.35	11.55
2 Stradella	68.81	68.03	67.66	7.72	1.15	5.25
3 San Giorgio Piacentino . .	98.73	97.54	94.61	5.66	4.12	5.22
4 Busseto	36.90	35.54	33.90	5.26	3.00	6.69
5 Fidenza	70.87	68.63	66.41	4.97	4.46	5.89
6 S. Secondo Parmense . .	32.24	31.40	30.92	4.10	1.32	3.90
7 Collecchio	88.42	87.63	87.22	21.97	1.20	5.53
8 Pieve Rossa di Bagnolo . .	30.25	29.25	27.92	2.55	2.33	2.81
9 Concordia	18.42	17.74	17.03	4.44	1.39	2.67
10 Correggio	31.00	29.08	26.75	2.82	4.25	5.00

Anche l'andamento dei massimi annuali quale appare dal relativo grafico conferma la tendenza allo svaso della falda freatica nell'anno in esame.

Andamento del massimo livelli freatici annuali

